Оказание первой шедицинской пошощи. Перелошы костей конегностей, транспортировка, ишиобилизация Перелош - полное или гастигное повреждение кости, которое вызван внешним воздействием

Kraccipikajus neperouolochol

Виды Признаки перелоша
Открытые Кровотегение, видимость слошанной кости или ее облошков, боль и отек. Если повреждение было сильный, у пострадавшего может наступить травматический шок

Закрытые Боль в шесте перелоша, боль усиливается при звижении, отек и кровоподтеки в шесте травшы, патологическая позвижность в шесте травшы, изшенение форшы поврежденной конечности

neplas nomonys

- 1) Ocmatobumo kpolomerethe u ospasomamo kpar patbi atmucenmukou
- 2) на рану в области травшы напожить стерильную повязку
- 3) Dams nocmpagabluely odezdonubatowyee
- 4) Apolecmu himosuruzagnio koherhocmu li mon noromethie, li komoponi ota okazaraci li mometim nolpemjetne
- 5) Docmalumo nocmpagalmero le megnyuricko e grperngerne
- 1) Apolecmu umuosuruzaguto
- 2) Dams obezbonubarougee u npunomums xonog k mecmy mpablible
- 3) Docmalums nocmpajalmero le megnyurckoe yzpernyenne

Ишиобилизация - создание неподвижности поврежденной или больной гасти тела, обытью конетности или позвоночника

Основные правила иниобилизации:

- 1. Шина должна диксировать суставы выше или ниже шеста перелоша
- 2. Npu neperome Segpa una mera muha gonzulli gukcupolamo 3 cycmala
- 3. Конегность должна находиться в наишенее болезненном положении
- 4. Шина должны быть обернута тканей шяской шатерией или положена на одежду
- 5. Шину шодепирунт по здоровой стороне