

1	2	3	4 a	4 <u>b</u>	5	6 a	6 <u>b</u>	6 B	7	8

Определение 4. Говорят, что подмножество M упорядоченного поля F ограничено сверху, если существует такой элемент C , что для всех $x \in M$ выполняется неравенство $x \leq C$. Число C в этом случае называется *верхней гранью* множества M .

Формально: $\exists C \in F \quad \forall x \in M : \quad x \leq C.$

Аналогично определяется *ограниченность снизу* и *нижняя грань* множества.

Задача 9. Верно ли, что множество положительных чисел P ограничено сверху? А снизу?

Определение 5. Говорят, что подмножество M упорядоченного поля F *ограничено*, если оно ограничено сверху и снизу одновременно.

Определение 6. Модулем (абсолютной величиной) элемента a упорядоченного поля F называется элемент $|a| = \begin{cases} a, & \text{если } a \geq 0 \\ -a, & \text{если } a < 0. \end{cases}$

Определение 7. Элемент C упорядоченного поля F называется *точной верхней гранью* множества M , если выполняются следующие два условия:

- $$\begin{aligned} 1) \quad & \forall x \in M: \quad x \leq C; \\ 2) \quad & \forall C_1 < C \quad \exists x \in M: \quad x > C_1. \end{aligned}$$

Условие 2) иногда записывают в следующей форме: 2') $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists x \in M : \quad x > C - \varepsilon$.

Обозначение: $C = \sup M$ (читается: *супрémум*).

Определение 8. Элемент C упорядоченного поля F называется *точной верхней гранью* множества M , если C есть наименьшая из всех верхних граней множества M .

Задача 10. Докажите эквивалентность определений 7 и 8.

Определение 9. Аналогично определяется *точная нижняя грань* множества.

Обозначение: $\inf M$ (читается: *инфимум*).

Задача 11. Может ли у множества быть более одной точной верхней (нижней) грани?

Задача 12. Найдите точные нижнюю и верхнюю грани множества M , если:

а) $M = \{\frac{1}{a} \mid a > 2\}$; **б)** $M = \{a + b \mid -5 < a \leq 3, |b| < 1\}$; **в)** $M = \{ab \mid -5 < a \leq 3, |b| < 1\}$.

Задача 13°. (аксиома о точной верхней грани) Докажите, что всякое непустое ограниченное сверху подмножество поля \mathbb{R} имеет в \mathbb{R} точную верхнюю грань.

Задача 14°. Пусть множества $A, B \subset \mathbb{R}$ ограничены и непусты. Докажите, что:

a) $\sup\{a + b \mid a \in A, b \in B\} = \sup A + \sup B$; **6)** $\sup(A \cup B) = \max(\sup A, \sup B)$.

Задача 15°. Докажите, что в упорядоченном поле F полнота эквивалентна

- аксиоме о разделяющем числе;
- аксиоме о точной верхней грани.

Задача 16*. Докажите, что поле действительных чисел континуально.

Задача 17*. Докажите, что поле действительных чисел не более, чем единственно.

Задача 18*. а) Докажите, что $\{a \in \mathbb{R} \mid a \geq 0\} = \{b^2 \mid b \in \mathbb{R}\}$.

б) Докажите, что поле \mathbb{R} нельзя упорядочить двумя разными способами.

[illegible]

```
<?xml version='1.0'?>
<listok number = '17' description='Поле действительных чисел' type='1' date='11.2013'>
  <problem group='1' type='0'>1</problem>
  <problem group='2' type='3'>2</problem>
  <problem group='3' type='0'>3</problem>
  <problem group='4' type='0'>4a</problem>
  <problem group='4' type='0'>4б</problem>
  <problem group='5' type='1'>5</problem>
  <problem group='6' type='0'>6a</problem>
  <problem group='6' type='0'>6б</problem>
  <problem group='6' type='3'>6в</problem>
  <problem group='7' type='0'>7</problem>
  <problem group='8' type='3'>8</problem>
  <problem group='9' type='0'>9</problem>
  <problem group='10' type='0'>10</problem>
  <problem group='11' type='0'>11</problem>
  <problem group='12' type='0'>12a</problem>
  <problem group='12' type='0'>12б</problem>
  <problem group='12' type='0'>12в</problem>
  <problem group='13' type='3'>13</problem>
  <problem group='14' type='3'>14a</problem>
  <problem group='14' type='3'>14б</problem>
  <problem group='15' type='3'>15a</problem>
  <problem group='15' type='3'>15б</problem>
  <problem group='16' type='1'>16</problem>
  <problem group='17' type='1'>17</problem>
  <problem group='18' type='1'>18a</problem>
  <problem group='18' type='1'>18б</problem>
</listok>
```