

Problem C. Unbalanced ABC Substrings

Time Limit 2000 ms

题目描述

给你一个长度为 N 的字符串 S ，它只包含字符 **A**、**B** 和 **C**。
字符串 S 一共有 $\frac{N(N+1)}{2}$ 个非空子串；请你找出其中满足以下条件的子串数量：

- 子串中字符 **A**、**B** 和 **C** 出现的次数三者互不相同。

如果两个子串来自 S 不同的位置，即使它们的内容一样，也要分别计数。

► 什么是子串？

约束条件

- $1 \leq N \leq 2 \times 10^5$
- $|S| = N$
- N 是整数。
- S 只包含字符 **A**、**B** 和 **C**。

输入格式

输入从标准输入读取，格式如下：

N
 S

输出格式

输出一个整数，表示满足条件的子串数量。

样例 1

Input	Output
6 AABBCC	4

从字符串 S 开头删去 0 个字符，结尾删去 3 个字符，得到子串 **AAB**，满足条件。

从开头删去 1 个字符，结尾删去 2 个字符，得到子串 **ABB**，满足条件。

从开头删去 2 个字符，结尾删去 1 个字符，得到子串 **BBC**，满足条件。

从开头删去 3 个字符，结尾删去 0 个字符，得到子串 **BCC**，满足条件。

其他子串都不满足条件。

样例 2

Input	Output
6 ABCABC	0

没有任何子串满足条件。

样例 3

Input	Output
10 ACABCAABAB	17