

Содержание

1	Асимптотические оптимальные оценки	2
2	Проверка статистических гипотез	10

1 Асимптотические оптимальные оценки

Пусть сл. векторы $\xi_n, \xi \in \mathbb{R}^K$, и определены на (Ω, \mathcal{F}, P) . Пусть функция распределения ξ_n есть $F_n(x)$, хар. ф-ция есть $\phi_n(t)$, а распределение есть Q_n . Для вектора ξ функцию распределения, хар. ф-цию и распределение обозначим $F(x)$, $\phi(t)$, Q соответственно.

Опр. 1. Функция распределения $F_n(x)$ сходится к $F(x)$ при $n \rightarrow \infty$ в основном (пишем $F_n(x) \Rightarrow F$), если $F_n(x) \rightarrow F(x) \forall x \in C(F)$

Опр. 2. Распределение Q_n сходится к распределению Q слабо (пишем $Q_n \xrightarrow{w} Q$), если \forall непрерывной и ограниченной $g : \mathbb{R}^K \rightarrow \mathbb{R}^1$

$$\int_{\mathbb{R}^K} g(x) Q_n(dx) \rightarrow \int_{\mathbb{R}^K} g(x) Q(dx)$$

или, эквивалентно, $Eg(\xi_n) \rightarrow Eg(\xi)$.

Теорема 1.

Следующие условия эквивалентны:

1. $F_n(x) \Rightarrow F$
2. $Q_n \xrightarrow{w} Q$
3. $\phi_n(t) \rightarrow \phi \forall t \in \mathbb{R}^K$

Если выполнено любое из условий 1 – 3, будем писать $\xi_n \xrightarrow{d} \xi$ и говорить, что ξ_n сходится к ξ по распределению.

Теорема 2 (О наследовании сходимости).

Пусть сл. векторы $\xi_n, \xi \in \mathbb{R}^K$, $H : \mathbb{R}^K \rightarrow \mathbb{R}^1$ Тогда:

1. Если $\xi_n \xrightarrow{d} \xi$, то $H(\xi_n) \xrightarrow{d} H(\xi)$
2. Если $\xi_n \xrightarrow{P} \xi$, то $H(\xi_n) \xrightarrow{P} H(\xi)$

Лемма Слуцкого

Пусть $\xi_n, \xi, \eta_n, a \in \mathbb{R}^1$, $\xi_n \xrightarrow{d} \xi$, а $\eta_n \xrightarrow{P} a$. Тогда:

1. $\xi_n + \eta_n \xrightarrow{d} \xi + a$
2. $\xi_n \eta_n \xrightarrow{d} a\xi$

Доказательство. Достаточно показать, что вектор

$$(\xi_n, \eta_n)^T \xrightarrow{d} (\xi, a)^T \quad (1)$$

Действительно, если (1) верно, то при $H(x, y) = x + y$ в силу Теоремы 2 получаем пункт 1 леммы, а при $H(x, y) = xy$ - пункт 2.

Для доказательства 1, проверим, что хар. ф-ция вектора $(\xi_n, \eta_n)^T$ сходится к хар. функции вектора $(\xi, \eta)^T$. Имеем:

$$|Ee^{it\xi_n + is\eta_n} - Ee^{it\xi + isa}| \leq |Ee^{it\xi_n + is\eta_n} - Ee^{it\xi_n + isa}| + |Ee^{it\xi_n + isa} - Ee^{it\xi + isa}| = \alpha_n + \beta_n$$

$$\alpha_n \leq \mathbb{E} |e^{it\xi_n}(e^{it\eta_n+isa})| = \mathbb{E} |e^{it\eta_n+isa}| = \mathbb{E} g(\eta_n), \quad g(x) := |e^{isx} - e^{isa}|$$

Ф-ция $g(x)$ непрерывна и ограничена, а т.к. $\eta_n \xrightarrow{d} a$, то в силу Теоремы 2 $\mathbb{E} g(\eta_n) \rightarrow \mathbb{E} g(a) = 0$.
Итак, $\alpha \rightarrow 0$.

$$\beta_n = |\mathbb{E} e^{isa}(e^{it\xi_n} - e^{it\xi})| = |e^{isa} \mathbb{E}(e^{it\xi_n} - e^{it\xi})| = |\mathbb{E}(e^{it\xi_n} - e^{it\xi})| \rightarrow 0$$

т.к. $\xi_n \xrightarrow{d} \xi$ и $\phi_n(t) \rightarrow \phi(t)$. □

Пусть наблюдаемые $X \sim P_\theta$, $\theta \in \Theta \subseteq \mathbb{R}^K$, а $\hat{\theta}_n$ - оценка θ

Опр. 3. Если $\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta) \xrightarrow{d} N(0, \Sigma(\theta)) \quad \forall \theta \in \Theta$ и ковариационная матрица $0 < \Sigma(\theta) < \infty$, то $\hat{\theta}_n$ называется асимптотической нормальной оценкой.

Опр. 4. Если $\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta \quad \forall \theta \in \Theta$, то $\hat{\theta}_n$ называется состоятельной оценкой.

Замечание 1. Далее $\theta \in \Theta \subseteq \mathbb{R}^1$, то есть θ и $\hat{\theta}_n$ - скаляры.

Если $\hat{\theta}_n$ - состоятельная оценка θ , то при больших n $\hat{\theta}_n \approx \theta$ с вероятностью, близкой к единице.

Если $\hat{\theta}_n$ - асимптотическая нормальная оценка θ (так как θ и $\hat{\theta}_n$ скаляры:

$\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta) \xrightarrow{d} N(0, \sigma^2(\theta)) \quad 0 < \sigma^2 < \infty, \quad \forall \theta \in \Theta$), то:

1. $\hat{\theta}_n$ - состоятельная оценка θ , так как $\hat{\theta}_n - \theta = n^{-1/2} \sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta) \xrightarrow{P} 0$ в силу п. 2 леммы Случского.
2. Скорость сходимости $\hat{\theta}_n$ к θ есть $O(\sqrt{n})$
3. При больших n со сл. в. $\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta)$ можно обращаться (с осторожностью!) как с Гауссовской величиной.

Например, пусть дисперсия предельного Гауссовского закона $\sigma^2(\theta)$ будет непрерывной ф-цией θ . Тогда

$$\frac{\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta)}{\sigma(\hat{\theta}_n)} = \underbrace{\frac{\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta)}{\sigma(\theta)}}_{\xrightarrow{d} N(0,1)} \underbrace{\frac{\sigma(\theta)}{\sigma(\hat{\theta}_n)}}_{\xrightarrow{P} 1} \xrightarrow{d} \eta \sim N(0, 1)$$

в силу п. 2 леммы Случского. Значит,

$$P_\theta \left(\left| \frac{\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta)}{\sigma(\hat{\theta}_n)} \right| < \xi_{1-\alpha/2} \right) \rightarrow P(|\eta| < \xi_{1-\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

То есть примерно с вероятностью $1 - \alpha$ выполнено неравенство, или эквивалентно раскроем по модулю

$$\underbrace{\hat{\theta}_n - n^{-1/2} \sigma(\hat{\theta}_n) \xi_{1-\alpha/2} < \theta < \hat{\theta}_n + n^{-1/2} \sigma(\hat{\theta}_n) \xi_{1-\alpha/2}}_{\text{Асимптотический доверительный интервал уровня } 1 - \alpha}$$

4. Асимптотические Гауссовские оценки можно сравнивать между собой:

Если $\sqrt{n}(\hat{\theta}_{i,n} - \theta) \xrightarrow{d} N(0, \sigma_i^2(\theta))$, $i = 1, 2, \dots$, то можно посчитать асимптотическую относительную эффективность (АОЭ):

$$e_{1,2} = \frac{\sigma_2^2(\theta)}{\sigma_1^2(\theta)}$$

Напомним, $e_{1,2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n'(x)}{n(x)}$, где $\sqrt{n}(\hat{\theta}_{1,n} - \theta) \xrightarrow{d} N(0, \sigma_1^2(\theta))$ и $\sqrt{n}(\hat{\theta}_{2,n} - \theta) \xrightarrow{d} N(0, \sigma_2^2(\theta))$.

Вопрос: Есть ли такая оценка θ_n^* , что АОЭ $e_{\theta_n^*, \hat{\theta}_n}(\theta) \geq 1 \forall \hat{\theta}_n$ и всех $\theta \in \Theta$, то есть эффективнее всех остальных?

Если да, то θ_n^* требует не больше наблюдений, чем любая $\hat{\theta}_n$, чтобы достичь одинаковой с $\hat{\theta}_n$ точности. Ясно, что предельная дисперсия $\sqrt{n}(\theta_n^* - \theta)$ должна быть не больше асимптотической дисперсии $\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta)$ для любой асимптотической Гауссовской оценки $\hat{\theta}_n$. Но какова самая маленькая асимптотическая дисперсия у $\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta)$?

Теорема Бахадура

Пусть X_1, \dots, X_n - н. о. р. сл. в., X_1 имеет плотность вероятности $f(x, \theta)$, $\theta \in \Theta \subseteq \mathbb{R}^1$, по мере ν . Пусть выполнены следующие условия:

1. Θ - интервал.
2. Носитель $N_f = \{x : f(x, \theta) > 0\}$ не зависит от θ .
3. $\forall x \in N_f$ плотность $f(x, \theta)$ дважды непрерывно дифференцируема по θ
4. Интеграл $\int f(x, \theta) \nu(dx)$ можно дважды дифференцировать по θ , внося знак дифференцирования под знак интеграла.
5. Информация Фишера $0 < i(\theta) < \infty \forall \theta \in \Theta$
6. $\left| \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \ln(f(x, \theta)) \right| \leq M(x) \forall x \in N_f, \theta \in \Theta, E_\theta M(X_1) < \infty$

Тогда, если $\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta) \xrightarrow{d} N(0, \sigma^2(\theta))$, то $\sigma^2(\theta) \geq \frac{1}{i(\theta)}$ всюду за исключением множества Лебеговой меры нуль.

Замечание 2. Если вдобавок $\sigma^2(\theta)$ и $i(\theta)$ непрерывны, то $\sigma^2(\theta) \geq \frac{1}{i(\theta)}$ при всех $\theta \in \Theta$.

Доказательство. Без доказательства. □

Опр. 5. Если $\theta, \hat{\theta}_n \in \mathbb{R}^1$ и $\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta) \xrightarrow{d} N(0, \frac{1}{i(\theta)})$, $n \rightarrow \infty, \forall \theta \in \Theta$, причем $0 < i(\theta) < \infty$, то $\hat{\theta}_n$ называется **асимптотически эффективной оценкой**.

Вопрос: Вообще можно ли найти такую оценку $\hat{\theta}_n$? Да

Дальше $X = (X_1, \dots, X_n)$, $X \sim P_\theta$, $\theta \in \Theta \subseteq \mathbb{R}^1$. Условие (A):

1. Θ - интервал, $P_{\theta_1} \neq P_{\theta_2}$ при $\theta_1 \neq \theta_2$.
2. X_1, \dots, X_n - независимые одинаково распределенные случайные величины
3. X_1 имеет плотность вероятности $f(x, \theta)$ по мере ν
4. Носитель $N_f = \{x : f(x, \theta) > 0\}$ не зависит от θ .
5. Плотность вектора X есть $p(x, \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta)$.

Опр. 6. Функция $p(X, \theta)$ как функция θ при фиксированном X называется **правдоподобием** функции.

$$L_n(X, \theta) = \ln p(X, \theta) = \sum_{i=1}^n \ln f(X_i, \theta)$$

называется логарифмическим правдоподобием.

Пусть θ_0 будет истинное значение параметра.

Лемма 1 (Неравенство Йенсена). Пусть $g(x)$ выпукла книзу борелевская функция, $E|\xi| < \infty$, $E|g(\xi)| < \infty$. Тогда $g(E\xi) \leq Eg(\xi)$. Если ξ не является почти наверное константой и g строго выпукла, то неравенство строгое.

Теорема 3 (Экстремальное свойство правдоподобия).

Пусть выполнено Условие (A). Пусть $E_{\theta_0} |\ln f(X_1, \theta)| < \infty$, $\forall \theta \in \Theta$. Тогда

$$P_{\theta_0}(p(X, \theta_0) > p(X, \theta)) \rightarrow 1, \quad n \rightarrow \infty, \quad \theta_0 \neq \theta$$

Доказательство.

$$p(X, \theta_0) > p(X, \theta) \Leftrightarrow \ln p(X, \theta_0) > \ln p(X, \theta) \Leftrightarrow$$

$$\eta_n := n^{-1} \sum_{i=1}^n \ln \left(\frac{f(X_i, \theta)}{f(X_i, \theta_0)} \right) < 0$$

То есть надо показать, что $P_{\theta_0}(\eta_n < 0) \rightarrow 1$. Но по слабому закону больших чисел:

$$\eta_n = n^{-1} \sum \ln \left(\frac{f(X_i, \theta)}{f(X_i, \theta_0)} \right) \xrightarrow{P} E_{\theta_0} \ln \left(\frac{f(X_1, \theta)}{f(X_1, \theta_0)} \right)$$

Возьмем функцию $-\ln x$ - строго выпукла вниз и $\frac{f(X_1, \theta)}{f(X_1, \theta_0)}$ не является п.н. константой (так как иначе если плотности п.н. совпадают, то и распределения при разных значениях совпадают, что противоречит Условию(A)(1)).

В силу неравенства Йенсена:

$$E_{\theta_0} \ln \frac{f(X_1, \theta)}{f(X_1, \theta_0)} < \ln E_{\theta_0} \frac{f(X_1, \theta)}{f(X_1, \theta_0)} = \ln \int_{N_f} \frac{f(x, \theta)}{f(x, \theta_0)} f(x, \theta_0) \nu(dx) = \ln 1 = 0$$

Но если η_n сходится по вероятности к отрицательному числу, то $P_{\theta_0}(\eta_n < 0) \rightarrow 1$ □

В силу теоремы 3 естественно брать оценкой то значение θ , которое максимизирует $p(X, \theta)$ при данном X

Опр. 7. Случайная величина $\hat{\theta}_n \in \Theta$ называется **оценкой максимального правдоподобия (о.м.п.)**, если $p(X, \hat{\theta}_n) = \max_{\theta \in \Theta} p(X, \theta)$, или эквивалентно $L_n(X, \hat{\theta}_n) = \max_{\theta \in \Theta} L_n(X, \theta)$

Итак, о.м.п $\hat{\theta}_n = \arg \max_{\theta \in \Theta} L_n(X, \theta)$.

Если в $\forall \theta \in \Theta$ максимум не достигается, то о.м.п. не существует.

Если Θ - интервал, $L_n(X, \theta)$ - гладкая по θ функция, то θ удовлетворяет уравнению правдоподобия

$$\frac{\partial}{\partial \theta} L_n(X, \theta) = 0 \quad (2)$$

Теорема 4 (О состоятельности решения уравнения правдоподобия).

Пусть выполнено Условие (А). Пусть $\forall x \in N_f \exists$ непрерывная производная $f'_\theta(x, \theta)$. Тогда уравнение (2) с вероятностью, стремящейся к 1 при $n \rightarrow \infty$ имеет решение $\in \Theta$. При этом среди всех таких решений есть такой корень $\hat{\theta}_n$, что он является состоятельной оценкой θ_0

Доказательство. Пусть $S_n = \{\omega\}$, при которых уравнение (2) имеет решение для $\theta \in \Theta$. Тогда теорема 4 утверждает:

1. $P_{\theta_0}(S_n) \rightarrow 1$.
2. Существует такое решение $\hat{\theta}_n \in \Theta$, что


$$P_{\theta_0} \left(\left| \hat{\theta}_n - \theta_0 \right| < \varepsilon, S_n \right) \rightarrow 1, \quad n \rightarrow \infty, \quad \forall \varepsilon > 0$$

Докажем пункт 1: Выберем малое $a > 0$ так, что на $(\theta_0 - a, \theta_0 + a) \subseteq \Theta$. Пусть

$$S_n^a = \{\omega : L_n(X, \theta_0) > L_n(X, \theta_0 - a), L_n(X, \theta_0) > L_n(X, \theta_0 + a)\}$$

В силу теоремы 3 $P_{\theta_0}(S_n^a) \rightarrow 1$

При $\omega \in S_n^a$ функция $L_n(X, \theta)$ имеет локальный максимум $\hat{\theta}_n^a$ на интервале $(\theta_0 - a, \theta_0 + a)$



Значит, $\frac{\partial}{\partial \theta} L_n(X, \hat{\theta}_n^a) = 0$. Тогда $P_{\theta_0}(S_n) \geq P_{\theta_0}(S_n^a) \rightarrow 1$, так как $S_n^a \subseteq S_n$, и пункт 1 доказан.

Докажем пункт 2: $\forall n$ при $\omega \in S_n$ может существовать целое множество корней $\{\theta_n^*\}$. Выберем в этом множестве корень $\hat{\theta}_n$, ближайший к θ_0 . Это можно сделать, так как функция $\frac{\partial}{\partial \theta} L_n(x, \theta)$ непрерывна по θ , и последовательность корней есть корень. Этот корень $\hat{\theta}_n$ и есть состоятельная оценка θ . Покажем это:

\forall малого $\varepsilon > 0$:

$$P_{\theta_0}(|\hat{\theta}_n - \theta_0| < \varepsilon, S_n) \geq P_{\theta_0}(|\hat{\theta}_n^\varepsilon - \theta_0| < \varepsilon, S_n^\varepsilon) \quad (3)$$

Так как $S_n^\varepsilon \subseteq S_n$, $(\omega : |\hat{\theta}_n^\varepsilon - \theta_0| < \varepsilon) \subseteq (\omega : |\hat{\theta}_n - \theta_0| < \varepsilon)$

Но $P_{\theta_0}(|\hat{\theta}_n^\varepsilon - \theta_0| < \varepsilon, S_n^\varepsilon) \underset{\text{т.к. события из } S_n^\varepsilon \text{ лежат в } |\hat{\theta}_n^\varepsilon - \theta_0| < \varepsilon}{=} P_{\theta_0}(S_n^\varepsilon) \rightarrow 1$, значит в силу (3)

$$P_{\theta_0}(|\hat{\theta}_n - \theta_0| < \varepsilon, S_n) \rightarrow 1$$

□

Замечание 3. Пусть

$$\theta_n^* = \begin{cases} \text{сост. корню уравнения правдоподобия, если он суц.} \\ \theta', \theta' \in \Theta, \text{ иначе} \end{cases}$$

Тогда случайная величина θ_n^* всегда определена, и $\theta_n^* \xrightarrow{P} \theta_0$, так как

$$P(|\theta_n^* - \theta_0| < \varepsilon) = P(|\hat{\theta}_n - \theta_0| < \varepsilon, S_n) + P(|\theta' - \theta_0| < \varepsilon, \bar{S}_n) \rightarrow 1$$

Ясно, что

$$\frac{\partial}{\partial \theta} L_n(X, \theta_n^*) = \bar{o}_p(1) \quad (4)$$

Так как производная отлична от нуля только на \bar{S}_n .

Будем называть θ_n^* **обобщенным состоятельным корнем уравнения правдоподобия**

Теорема 5 (Об асимптотической эффективности состоятельности решения).

Пусть $X = (X_1, \dots, X_n)$, $\{X_i\}$ - н.о.р. сл.в., и удовлетворяются предположения Теоремы Бахадура, в которых условия 3 и 6 заменены на предположения о третьей, а не второй производной. То есть

$$\left| \frac{\partial^3}{\partial \theta^3} \ln f(x, \theta) \right| \leq M(x) \quad \forall x \in N_f, \quad \forall \theta \in \Theta, \quad E_{\theta_0} M(X_1) < \infty$$

Тогда, если θ_n^* - обобщенный состоятельный корень из теоремы 4, то

$$\sqrt{n}(\theta_n^* - \theta_0) \xrightarrow{d} N(0, \frac{1}{i(\theta_0)})$$

То есть θ_n^* - асимптотическая эффективная оценка.

Доказательство. Будем обозначать $\frac{\partial}{\partial \theta} L_n(X, \theta)$, $\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} L_n(X, \theta)$, ... через $L'_n(\theta)$, $L_n^{(2)}(\theta)$, ...

Для фиксированного X в силу формулы Тейлора и последнего замечания:

$$\bar{o}_p(1) = L'_n(\theta_n^*) = L'_n(\theta_0) + L_n^{(2)}(\theta_0)(\theta_n^* - \theta_0) + \frac{1}{2} L_n^{(3)}(\tilde{\theta}_n)(\theta_n^* - \theta_0)^2, \quad \tilde{\theta}_n \in (\theta_0, \theta_n^*)$$

Отсюда,

$$\sqrt{n}(\theta_n^* - \theta_0) = - \frac{n^{-1/2} L'_n(\theta_0) + \bar{o}_p(1)}{n^{-1} (L_n^{(2)}(\theta_0) + \frac{1}{2} L_n^{(3)}(\tilde{\theta}_n)(\theta_n^* - \theta_0))} \quad (5)$$

Рассмотрим числитель (5) и покажем, что

$$n^{-1/2} L'_n(\theta_0) = n^{-1/2} \sum_{i=1}^n \frac{f'_\theta(X_i, \theta_0)}{f(X_i, \theta_0)} \xrightarrow{d} \xi \sim N(0, i(\theta_0)) \quad (6)$$

Действительно,

$$\begin{aligned} E_{\theta_0} \frac{f'_{\theta_0}(X_1, \theta_0)}{f(X_1, \theta_0)} &= \int_{N_f} \frac{f'_\theta(x, \theta_0)}{f(x, \theta_0)} f(x, \theta_0) \nu(dx) = 0 \\ D_{\theta_0} \frac{f'_{\theta_0}(X_1, \theta_0)}{f(X_1, \theta_0)} &= E_{\theta_0} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(X_1, \theta_0) \right)^2 - \underbrace{\left(E_{\theta_0} \frac{f'_{\theta_0}(X_1, \theta_0)}{f(X_1, \theta_0)} \right)^2}_{=0} \stackrel{\text{по опр.}}{=} i(\theta_0) \end{aligned}$$

Так как f, f' - борелевские функции, то случайные величины $\left\{ \frac{f'_\theta(X_i, \theta_0)}{f(X_i, \theta_0)}, i = 1, \dots, n \right\}$ - н.о.р., соотношение (6) следует из Центр. пред. Теоремы.

В силу Леммы Слуцкого числитель (5) $\xrightarrow{P} N(0, i(\theta_0))$

Теперь рассмотрим знаменатель (5):

$$n^{-1} L_n^{(2)}(\theta_0) = n^{-1} \sum_{i=1}^n \left[\frac{f_\theta^{(2)}(X_i, \theta_0)}{f(X_i, \theta_0)} - \left(\frac{f'_\theta(X_i, \theta_0)}{f(X_i, \theta_0)} \right)^2 \right] \xrightarrow{P} -i(\theta) \quad (7)$$

Действительно, в силу ЗБЧ

$$\begin{aligned} n^{-1} \sum_{i=1}^n \frac{f_\theta^{(2)}(X_i, \theta_0)}{f(X_i, \theta_0)} &\xrightarrow{P} E_{\theta_0} \frac{f_\theta^{(2)}(X_1, \theta_0)}{f(X_1, \theta_0)} = \int_{N_f} \frac{f_\theta^{(2)}(x, \theta_0)}{f(x, \theta_0)} f(x, \theta_0) \nu(dx) = 0 \\ n^{-1} \sum_{i=1}^n \left(\frac{f'_\theta(X_i, \theta_0)}{f(X_i, \theta_0)} \right)^2 &\xrightarrow{P} E_{\theta_0} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(X_1, \theta_0) \right)^2 = i(\theta) \end{aligned}$$

Применяя лемму Слуцкого, получим (7).

Далее рассмотрим второе слагаемое в знаменате (5)

$$\left| \frac{1}{2n} L_n^{(3)}(\tilde{\theta}_n)(\theta_n^* - \theta_0) \right| \leq \frac{1}{2} |\theta_n^* - \theta_0| n^{-1} \sum_{i=1}^n M(X_i) \xrightarrow[\text{л. Слуцкого}]{P} 0 \quad (8)$$

В силу (7) и (8) и Леммы Слуцкого знаменатель (5) сходится по вероятности к $-i(\theta_0)$

Значит, что вся дробь (5) сходится по распределению к $\frac{1}{i(\theta_0)} \xi \sim N(0, \frac{1}{i(\theta_0)})$ \square

Оценки максимального правдоподобия для векторного параметра

Пусть $X = (X_1, \dots, X_n)$ - н.о.р., $X_1 \sim f(x, \theta)$, $\theta \in \Theta \subseteq \mathbb{R}^k$, Θ - открытое множество

Тогда логарифмические правдоподобие имеет вид

$$L_n(X, \theta) = \sum_{i=1}^n \ln f(X_i, \theta)$$

Система уравнений правдоподобия

$$\frac{\partial L_n(X, \theta)}{\partial \theta_i} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, k$$

При условиях регулярности, похожих на условия теоремы 5, показывается:

1. С вероятностью, стремящейся к единице при $n \rightarrow \infty$, система уравнений (1) имеет такое решение $\hat{\theta}_n \in \Theta$, что $\hat{\theta}_n$ сходится к истинному значению θ_0 .
2. Соответствующая оценка θ_n^* асимптотически нормальна. А именно

$$\sqrt{n}(\theta_n^* - \theta_0) \xrightarrow{d} N(0, I^{-1}(\theta_0)), \quad n \rightarrow \infty$$

Здесь $I(\theta) > 0$ - матрица информации Фишера, то есть

$$I(\theta) = (I_{ij}(\theta)), \quad I_{ij}(\theta) = E_{\theta} \left\{ \frac{\partial \ln f(X, \theta)}{\partial \theta_i} \cdot \frac{\partial \ln f(X, \theta)}{\partial \theta_j} \right\}$$

Пример. $X = (X_1, \dots, X_n)$, где $\{X_i\}$ - н.о.р., $X_1 \sim N(0, \sigma^2)$, $a < \theta < b$, a и b - известные конечные числа, дисперсия σ^2 известна. Построим асимптотически эффективную оценку θ_n^* для θ .

Здесь $p(x, \theta) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \right)^n e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \theta)^2}$, значит

$$L_n(X, \theta) = \ln \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \right)^n - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \theta)^2$$

Уравнение правдоподобия имеет вид

$$\frac{\partial L_n(X, \theta)}{\partial \theta} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \theta) = 0$$

Его решение существует и единственно, это \bar{X} , причем в т. $\theta = \bar{X}$ $L_n(X, \theta)$ достигает максимума, так как $\frac{\partial^2 L_n(X, \bar{X})}{\partial \theta^2} = -\frac{1}{\sigma^2} < 0$

Таким образом, если $a < \bar{X} < b$, то о.м.п. существует и равна \bar{X} , в противном случае о.м.п. не существует. Если положить

$$\theta_n^* = \begin{cases} \bar{X}, & a < \bar{X} < b \\ \frac{a+b}{2}, & \bar{X} \notin (a, b) \end{cases} \quad (9)$$

То в силу теоремы 5 (её условия выполнены, проверьте сами), θ_n^* - асимптотически эффективная оценка, то есть

$$\sqrt{n}(\theta_n^* - \theta_0) \xrightarrow{d} N(0, \sigma^2) \quad (10)$$

Напомним, что в этой модели $i(\theta) = \frac{1}{\sigma^2}$. Справедливость (10) с θ_n^* из (9) легко проверить непосредственно.

Пример. Если Θ - компакт (то есть отрезок $[a, b]$), то о.м.п. существует всегда, так как непрерывная функция на отрезке всегда достигает своего максимума. Значит значение о.м.п.

$$\theta_n^* = \begin{cases} \bar{X}, & a < \bar{X} < b \\ a, & \bar{X} < a \\ b, & \bar{X} > b \end{cases}$$

Но на границах теряется асимптотическая Гауссовость.

2 Проверка статистических гипотез

$X = (X_1, \dots, X_n)$ имеет плотность вероятности $p(X, \theta)$ по мере μ , $\theta \in \Theta \subseteq \mathbb{R}^1$

Опр. 1. Предположение вида $H_0 : \theta \in \Theta_0$, где $\Theta_0 \in \Theta$, называется параметрической гипотезой. Альтернатива $H_1 : \theta \in \Theta_1$, где $\Theta_1 \in \Theta \setminus \Theta_0$

Опр. 2. Если $\Theta_0(\Theta_1)$ состоит из одной точки, то гипотеза H_0 (альтернатива H_1) называется простой. В противном случае $H_0(H_1)$ - сложная

Постановка задачи:

Необходимо построить правило (статистический критерий - *test*), который позволяет заключить, согласуется ли наблюдение X с H_0 или нет.

Правило.

Выберем в множестве значений x вектора X (у нас либо $x = \mathbb{R}^n$, либо $x = N_p \subseteq \mathbb{R}^n$ - носитель плотности) подмножество S . Если $X \in S$, то H_0 отвергается и принимается H_1 . Если $X \in \bar{S} = X \setminus S$, то H_0 принимается.

Опр. 3. Множество S называется критическим множеством или критерием, \bar{S} - область принятия гипотезы.

Опр. 4. *Ошибка 1-го рода* - принять H_1 , когда верна H_0 . Вероятность ошибки 1-го рода $\alpha = P(H_1|H_0)$ (это условная запись, а не условная вероятность). *Ошибка 2-го рода* - принять H_0 , когда верна H_1 . Вероятность ошибки 2-го рода $\beta = P(H_0|H_1)$.

Опр. 5. *Мощность критерия* S называется функцией $W(S, \theta) = W(\theta) := P_\theta(X \in S)$ (вероятность отвергнуть H_0 , когда значение параметра есть θ).

Тогда

$$\begin{aligned}\alpha &= \alpha(\theta) = W(\theta), \quad \theta \in \Theta_0; \\ \beta &= \beta(\theta) = 1 - W(\theta), \quad \theta \in \Theta_1\end{aligned}$$

Опр. 6. Обычно H_0 более важна. Поэтому рассматривают критерии такие, что

$$\alpha(\theta) = W(\theta) = P_\theta(X \in S) \leq \alpha \quad \forall \theta \in \Theta_0$$

Число α называют *уровнем значимости критерия*. Пишут S_α - критерий уровня α . Обычно α - маленькое число, которое мы задаем сами.

Опр. 7. Если критерий $S_\alpha^* \in \{S_\alpha\}$ и $\forall \theta \in \Theta_1$ и $\forall S_\alpha$ $W(S_\alpha^*, \theta) \geq W(S_\alpha, \theta)$, то критерий S_α^* называется *РНМ-критерием (равномерно наиболее мощным)*.

Если $H_0 : \theta = \theta_0$, $H_1 : \theta = \theta_1$ (то есть H_0 и H_1 - простые), то задача отыскания РНМ-критерия заданного уровня α имеет вид:

$$\begin{aligned}P_{\theta_0}(X \in S_\alpha^*) &\leq \alpha, \\ P_{\theta_1}(X \in S_\alpha^*) &\geq P_{\theta_1}(X \in S_\alpha) \quad \forall S_\alpha\end{aligned}$$

Положим для краткости: $p_0(x) := p(x, \theta_0)$, $E_0 = E_{\theta_0}$, $p_1(x) = p(x, \theta_1)$, $E_1 = E_{\theta_1}$

Введем множество

$$S(\lambda) = \{x : p_1(x) - \lambda p_0(x) > 0\}, \lambda > 0$$

Теорема 1 (Лемма Неймана-Пирсона).

Пусть для некоторого $\lambda > 0$ и критерия R (когда X попадает в R , то H_0 отвергается) выполнено:

$$1. P_0(X \in R) \leq P_0(X \in S(\lambda))$$

Тогда:

$$2. P_1(X \in R) \leq P_1(X \in S(\lambda))$$

$$3. P_1(X \in S(\lambda)) \geq P_0(X \in S(\lambda))$$

Замечание 1. $X \in S(\lambda) \Leftrightarrow \frac{p_1(x)}{p_0(x)} > \lambda$. Так как $p_1(X)$ и $p_0(X)$ - правдоподобие, то критерий называется критерием отношения правдоподобия Неймана-Пирсона.

Замечание 2. Утверждение 3 для $S(\lambda)$ означает, что

$$P(H_1 | H_1) \geq P(H_1 | H_0) \Leftrightarrow W(S(\lambda), \theta_1) \geq W(S(\lambda), \theta_0)$$

Это свойство называется несмещенностью критерия $S(\lambda)$

Доказательство. Далее для краткости $S(\lambda) = S$. Пусть $I_R(x) = \begin{cases} 1, x \in \mathbb{R} \\ 0, x \notin \mathbb{R} \end{cases}$, $I_S(x)$ определяем аналогично. Тогда Условие (А) имеет вид:

$$E_0 I_R(x) \leq E_0 I_S(x) \quad (1)$$

Докажем пункт 2: Верно неравенство

$$I_R(x)[p_1(x) - \lambda p_0(x)] \leq I_S(x)[p_1(x) - \lambda p_0(x)] \quad (2)$$

Действительно, если $(p_1(x) - \lambda p_0(x)) > 0$, то $I_S(x) = 1$ и (2) очевидно.

Если же $p_1(x) - \lambda p_0(x) \leq 0$, то правая часть (2) есть ноль, а левая \leq нуля.

Итак, (2) верно: интегрируем это неравенство по $x \in \mathbb{R}^n$:

$$\begin{aligned} E_1 I_R(X) - \lambda E_0 I_R(X) &\leq E_1 I_S(X) - \lambda E_0 I_S(X) \\ E_1 I_S(X) - E_1 I_R(X) &\geq \lambda \underbrace{[E_0 I_S(X) - E_0 I_R(X)]}_{\geq 0 \text{ по условию (1)}} \end{aligned} \quad (3)$$

В силу (1), (3) и условия $\lambda > 0$ получаем:

$$E_1 I_S(X) \geq E_1 I_R(X)$$

Докажем пункт 3: Пусть $\lambda \geq 1$. Из определения S $p_1(x) > p_0(x) \forall x \in S$. Отсюда

$$P_0(X \in S) = \int_{R^n} I_S(X) p_0(x) \mu(dx) \leq \int_{R^n} I_S(X) p_1(x) \mu(dx) = P_1(X \in S)$$

То есть $P(H_1 | H_0) \leq P(H_1 | H_1)$

Пусть $\lambda < 1$. Рассмотрим $\bar{S} = \{x : p_1(x) \leq \lambda p_0(x)\}$. При $\lambda < 1$ $p_1(x) < p_0(x)$ при $x \in \bar{S}$. Отсюда

$$P_1(X \in \bar{S}) = \int_{R^n} I_{\bar{S}}(X) p_1(x) \mu(dx) \leq \int_{R^n} I_{\bar{S}}(X) p_0(x) \mu(dx) = P_0(X \in \bar{S})$$

То есть $1 - P_1(X \in S) \leq 1 - P_0(X \in S)$, откуда $P_1(X \in S) \geq P_0(X \in S)$ □

Пример. $X = (X_1, \dots, X_n), \{X_i\}$ - н.о.р., $X_1 \sim N(\theta, \sigma^2)$, дисперсия σ^2 известна. Построим наиболее мощный критерий для проверки $H_0 : \theta = \theta_0$ против $H_1 : \theta = \theta_1$ (в случае $\theta_1 > \theta_0$). Уровень значимости возьмем α .

1. Имеем

$$p_0 = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \right)^n \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \theta_0)^2 \right\}, \quad p_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \right)^n \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)^2 \right\};$$

$$S(\lambda) = \{x : p_1(x) - \lambda p_0(x) > 0\} \stackrel{\text{делим на } p_0}{\Leftrightarrow} \exp \left\{ \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n [(x_i - \theta_1)^2 - (x_i - \theta_0)^2] \right\} > \lambda \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n [(x_i - \theta_1)^2 - (x_i - \theta_0)^2] < \lambda_1 = -2\sigma^2 \ln \lambda \stackrel{\text{арифметика}}{\Leftrightarrow} (\theta_0 - \theta_1) \sum_{i=1}^n x_i \leq \lambda_2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n x_i > \tilde{\lambda}, \quad \tilde{\lambda}(\lambda, n, \sigma^2, \theta_0, \theta_1)$$

Итак,

$$S(\lambda) = \left\{ x : \sum_{i=1}^n x_i > \tilde{\lambda} \right\} \text{ при некотором } \tilde{\lambda}$$

2. Определим $\tilde{\lambda} = \tilde{\lambda}_\alpha$ из уравнения

$$\alpha = P_{\theta_0}(X \in S(\tilde{\lambda}_\alpha)) = P_{\theta_0} \left(\sum_{i=1}^n X_i > \tilde{\lambda}_\alpha \right)$$

Преобразуем левую сумму в стандартную Гауссовскую величину. Тогда

$$\alpha = P_{\theta_0} \left(\frac{1}{\sqrt{n}\sigma} \sum_{i=1}^n (X_i - \theta_0) > \frac{\tilde{\lambda}_\alpha - n\theta_0}{\sqrt{n}\sigma} \right) = 1 - \Phi \left(\frac{\tilde{\lambda}_\alpha - n\theta_0}{\sqrt{n}\sigma} \right)$$

так как $\frac{1}{\sqrt{n}\sigma} \sum_i (X_i - \theta_0) \sim N(0, 1)$ при H_0 .

Значит $\Phi \left(\frac{\tilde{\lambda}_\alpha - n\theta_0}{\sqrt{n}\sigma} \right) = 1 - \alpha$, $\left(\frac{\tilde{\lambda}_\alpha - n\theta_0}{\sqrt{n}\sigma} \right) = \xi_{1-\alpha}$ - квантиль станд. норм. закона уровня $1 - \alpha$. Окончательно, $\tilde{\lambda}_\alpha = n\theta_0 + \sqrt{n}\sigma\xi_{1-\alpha}$

3. Положим $S_\alpha^* = \{x : \sum_{i=1}^n x_i > \tilde{\lambda}_\alpha\}$ Тогда $P_{\theta_0}(X \in S_\alpha^*) = \alpha$, и:

$$\forall S_\alpha \quad P_{\theta_0}(X \in S_\alpha) \leq \alpha = P_{\theta_0}(X \in S_\alpha^*)$$

Значит, выполнено условие 1 Леммы Неймана-Пирсона, и в силу пункта 2 этой леммы

$$P_{\theta_1}(X \in S_\alpha) \leq P_{\theta_1}(X \in S_\alpha^*)$$

То есть S_α^* - наиболее мощный критерий уровня α .

Так как S_α^* не зависит от θ_1 , то S_α^* - РНМ-критерий для $H_0 : \theta = \theta_0$ против $H_1^+ : \theta > \theta_0$.
Мощность критерия S_α^* для H_0 при альт. H_1^+

$$W(\theta, S_\alpha^*) = P_\theta \left(\sum_{i=1}^n X_i > n\theta_0 + \sqrt{n}\sigma\xi_{1-\alpha} \right) =$$

$$= P_\theta \left(\frac{1}{\sqrt{n}\sigma} \sum_{i=1}^n (X_i - \theta) > \frac{\sqrt{n}(\theta_0 - \theta)}{\sigma} + \xi_{1-\alpha} \right) = 1 - \Phi \left(\xi_{1-\alpha} + \frac{\sqrt{n}(\theta - \theta_0)}{\sigma} \right)$$

**** TODO вставить график стр 134 ****

О связи между доверительным оцениванием и проверкой гипотез

Опр. 8. Случайное подмножество $\Theta^* = \Theta^*(X, \alpha) \subseteq \Theta$ называется доверительным множеством уровня $1 - \alpha$, $0 < \alpha < 1$, если

$$P_\theta(\theta \in \Theta^*(X, \alpha)) \geq 1 - \alpha \quad \forall \theta \in \Theta$$

Теорема 2. 1. Пусть $\forall \theta_0 \in \Theta$ гипотеза $H_0 : \theta = \theta_0$ при альтернативе $H_1 : \theta \neq \theta_0$ имеет $S_\alpha(\theta_0)$ критерием уровня α . Пусть $\Theta^*(x, \alpha) = \{\theta : x \in \overline{S_\alpha}(\theta)\}$. тогда $\Theta^*(X, \alpha)$ - доверительное множество уровня $1 - \alpha$. (Если есть критерий, то можно по этому построить доверительное множество)

2. Если $\Theta^*(X, \alpha)$ - доверительное множество уровня $1 - \alpha$, то $\overline{S_\alpha}(\theta_0) = \{x : \theta_0 \notin \Theta^*(x, \alpha)\}$ есть область применения гипотезы H_0 (следовательно и критерий).

Замечание 3. Пункт 2 означает, что если θ_0 попало в доверительное множество, то H_0 надо применять.

Доказательство.

$$1. P_\theta(\theta \in \Theta^*(X, \alpha)) = P_\theta(X \in \overline{S_\alpha}(\theta)) = 1 - \underbrace{P_\theta(X \in S_\alpha(\theta))}_{\leq \alpha} \geq 1 - \alpha \quad \forall \theta \in \Theta$$

$$2. P_{\theta_0}(X \in S_\alpha(\theta_0)) = 1 - P_{\theta_0}(X \in \overline{S_\alpha}(\theta_0)) = 1 - \underbrace{P_{\theta_0}(\theta_0 \in \Theta^*(X, \alpha))}_{\geq 1-\alpha} \leq 1 - (1 - \alpha) = \alpha$$

□

Пример. Пусть $X = (X_1, \dots, X_n)$, $\{X_i\}$ - н.о.р. сл.в., $X_1 \sim N(0, \sigma^2)$, $\theta \in \mathbb{R}^1$. Построим критерий для $H_0 : \theta = \theta_0$ против $H_1 : \theta \neq \theta_0$. Уровень значимости пусть будет α , $0 < \alpha < 1$.

Построим доверительное множество для θ уровня $1 - \alpha$. Пусть $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ - оптимальная оценка θ . Тогда $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \theta)}{\sigma} \sim N(0, 1)$,

$$P_\theta \left(\left| \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \theta)}{\sigma} \right| < \xi_{1-\alpha/2} \right) = 1 - \alpha$$

$$\Phi(\xi_{1-\alpha/2}) = 1 - \alpha/2$$

То есть $\Theta^*(X, \alpha) = \{\theta : \left| \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \theta)}{\sigma} \right| < \xi_{1-\alpha/2}\}$. В силу замечания к Теореме 2 $S_\alpha(\theta_0) = \{X : \left| \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \theta_0)}{\sigma} \right| \geq \xi_{1-\alpha}\}$ есть критическое множество для H_0 . Мощность

$$\begin{aligned} W(\theta) &= P_\theta(X \in S_\alpha(\theta_0)) = P_\theta \left(\left| \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \theta_0)}{\sigma} \right| \geq \xi_{1-\alpha/2} \right) = 1 - P_\theta \left(\left| \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \theta_0)}{\sigma} \right| < \xi_{1-\alpha/2} \right) = \\ &= 1 - P \left(-\xi_{1-\alpha/2} + \frac{\sqrt{n}(\theta_0 - \theta)}{\sigma} < \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \theta)}{\sigma} < \xi_{1-\alpha} + \frac{\sqrt{n}(\theta_0 - \theta)}{\sigma} \right) = \\ &= 1 - \left[\Phi \left(\xi_{1-\alpha/2} + \frac{\sqrt{n}(\theta_0 - \theta)}{\sigma} \right) - \Phi \left(-\xi_{1-\alpha/2} + \frac{\sqrt{n}(\theta_0 - \theta)}{\sigma} \right) \right] = \\ &= \left[\Phi \left(\xi_{\alpha/2} + \frac{\sqrt{n}(\theta_0 - \theta)}{\sigma} \right) + \Phi \left(\xi_{\alpha/2} + \frac{\sqrt{n}(\theta - \theta_0)}{\sigma} \right) \right] \end{aligned}$$

***** TODO: вставить график стр 136*****

При $n \rightarrow \infty$ $W(\theta) \rightarrow 1 \forall \theta \neq \theta_0$!. То есть $S_\alpha(\theta_0)$ состоятелен против любой фиксированной альтернативы.

Критерий Фишера (F -критерий) в Гауссовской линейной регрессии

Опр. 9. Если $\xi \sim N(0, 1)$, $\eta_k \sim \chi^2(k)$, ξ и η_k независимы, а константа $\mu \in \mathbb{R}^1$, то сл.в.

$$t_k(\mu) \stackrel{d}{=} \frac{\xi + \mu}{\sqrt{\frac{1}{k}\eta_k}} \sim S(k, \mu)$$

имеет нецентральное распределение Стьюдента с k степенями свободы и параметром нецентральности μ

Опр. 10. Если $\xi_i \sim N(a_i, 1), i = 1, \dots, k$, и $\{\xi_1, \dots, \xi_k\}$ независимы, а $\Delta^2 = \sum_{j=1}^k a_j^2$, то сл. в.

$$\eta_k(\Delta) \stackrel{d}{=} \xi_1^2 + \dots + \xi_k^2 \sim \chi^2(k, \Delta^2)$$

имеет нецентральное распределение хи-квадрат с k степенями свободы и параметром нецентральности Δ^2

Опр. 11. Если $\eta_k \sim \chi^2(k, \Delta^2)$, $\nu_m \sim \chi^2(m)$, и η_k и ν_m независимы, то сл.в.

$$f_{k,m}(\Delta) \stackrel{d}{=} \frac{\frac{1}{k}\eta_k}{\frac{1}{m}\nu_m} \sim F(k, m, \Delta^2)$$

имеет нецентральное распределение Фишера с (k, m) степенями свободы и параметром нецентральности Δ^2

Лемма 2. 1. Распределение сл.в. $\eta_k \sim \chi^2(k, \Delta^2)$ зависит лишь от Δ , но не от a_1, \dots, a_k .
А именно

$$\eta_k \stackrel{d}{=} (z_1 + \Delta)^2 + z_2^2 + \dots + z_k^2, \text{ где } (z_1, \dots, z_k) - \text{н.о.р. } N(0, 1) \text{ сл.в.}$$

2. Если вектор $\xi \in \mathbb{R}^k, \xi \sim N(a, \Sigma), \Sigma > 0$, то

$$\xi^T \Sigma^{-1} \xi \sim \chi^2(k, \Delta^2), \Delta^2 = a^T \Sigma^{-1} a$$

Доказательство. 1. По определению $\eta_k(\Delta) \stackrel{d}{=} \sum_{i=1}^k \xi_i^2$, где (ξ_1, \dots, ξ_k) - н.о.р. $N(a_i, 1)$ сл.в.

Пусть $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_k)^T$, ортогональная матрица

$$C = \begin{pmatrix} \frac{a_1}{\Delta} & \cdots & \frac{a_k}{\Delta} \\ \vdots & \ddots & \vdots \end{pmatrix}, \quad \nu = C\xi$$

Тогда $\eta_k \stackrel{d}{=} |\xi|^2 = |\nu|^2$, так как C - ортог. Но

$$\nu = C \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_k \end{pmatrix} + C \overset{\circ}{\xi} = \begin{pmatrix} \Delta \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + Z, \quad \text{где } \overset{\circ}{\xi} = \xi - E\xi, Z = C\overset{\circ}{\xi} \sim N(0, E_k)$$

Итак, $\eta_k \stackrel{d}{=} |\nu|^2 = (z_1 + \Delta)^2 + z_2^2 + \dots + z_k^2$

2. $\xi^T \Sigma^{-1} \xi = |\Sigma^{-1/2} \xi|^2$, причем $\Sigma^{-1/2} \xi \sim N(\Sigma^{-1/2} a, E_k)$. Отсюда $|\Sigma^{-1/2} \xi|^2 \sim \chi^2(k, \Delta^2)$ с $\Delta^2 = |\Sigma^{-1/2} a|^2 = a^T \Sigma^{-1} a$

□

Лемма 3. Случайная величина $t_k(\mu)$ обладает следующим свойством стохастической упорядоченности. при $\mu_2 > \mu_1$

$$P(t_k(\mu_2) > x) > P(t_k(\mu_1) > x) \quad \text{при всех } x \in \mathbb{R}^1 \quad (4)$$

Аналогично

$$P(\eta_k(\Delta_2) > x) > P(\eta_k(\Delta_1) > x), \Delta_2 > \Delta_1 \quad (5)$$

$$P(f_{k,m}(\Delta_2) > x) > P(f_{k,m}(\Delta_1) > x), \Delta_2 > \Delta_1 \quad (6)$$

То есть нецентральные распределения Пирсона и Фишера стохастически упорядочены по параметру нецентральности.

Доказательство. Докажем соотношение 4, 5 и 6 доказываются аналогично.

Заметим, что, если ξ и η - независимые случайные величины, и $E|\phi(\xi, \eta)| < \infty$, то

$$E\phi(\xi, \eta) = E \left\{ E\phi(\xi, \eta) |_{\xi=\eta} \right\} \quad (7)$$

В силу (7)

$$\begin{aligned} P(t_k(\mu_2) > x) &= P \left(\frac{\xi + \mu_2}{\sqrt{\frac{1}{k}\eta_k}} > x \right) = EI \left(\xi > x \sqrt{\frac{1}{k}\eta_k} - \mu_2 \right) = \\ &= E \left\{ 1 - I \left(\xi \leq x \sqrt{\frac{1}{k}\eta_k} - \mu_2 \right) \right\} = 1 - E \left\{ EI(\xi \leq y) \Big|_{y=x\sqrt{\frac{\eta_k}{k}} - \mu_2} \right\} = \\ &= 1 - E\Phi \left(x \sqrt{\frac{1}{k}\eta_k} - \mu_2 \right) > 1 - E\Phi \left(x \sqrt{\frac{1}{k}\eta_k} - \mu_1 \right) = P(t_k(\mu_1) > x) \\ \text{так как } E\Phi \left(x \sqrt{\frac{1}{k}\eta_k} - \mu_2 \right) &< E\Phi \left(x \sqrt{\frac{1}{k}\eta_k} - \mu_1 \right) \text{ в силу возрастающей } \Phi(y) \end{aligned}$$

□

Обратимся к линейной гауссовской модели

$$X = Zc + \mathcal{E}$$

$X = (X_1, \dots, X_n)^T$ - наблюдения, Z - $n \times p$ матрица регрессоров $p < n$

$$\mathcal{E} \sim N(0, \sigma^2 E_n), \quad c = (c_1, \dots, c_p)^T$$

c и σ^2 неизвестны

Рассмотрим новый вектор $\beta = Ac$, A - $k \times p$ матрица, $rkA = k, k \leq p$.

Построим для β доверительное множество уровня $1 - \alpha$

Пусть \hat{c}_n - оценка наименьших квадратов (о.н.к.) для c , \hat{s}_n^2 - о.н.к. для σ^2 . Пусть $\hat{\beta}_n = A\hat{c}_n$.

$$\hat{c}_n \sim N(c, \sigma^2(Z^T Z)^{-1}) \Rightarrow \hat{\beta}_n \sim N(\underbrace{Ac}_{\beta}, \sigma^2 D), \text{ где } D = A(Z^T Z)^{-1}A^T$$

Заметим, что $D > 0$, так как для $\alpha \in \mathbb{R}^k, \alpha \neq 0$,

$$\alpha^T D \alpha = (A^T \alpha)^T (Z^T Z)^{-1} (A^T \alpha) > 0, \text{ т.к. } (Z^T Z)^{-1} > 0, A^T \alpha \neq 0 \text{ при } rkA = k, \alpha \neq 0$$

В силу пункта 2 леммы 2

$$\frac{1}{\sigma^2} (\hat{\beta}_n - \beta)^T D^{-1} (\hat{\beta}_n - \beta) \sim \chi^2(k)$$

так как $\frac{(n-p)\hat{s}_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-p)$, $\hat{\beta}_n$ и \hat{s}_n^2 независимы, то

$$f_{k,n-p}(X, \beta) := \frac{\frac{1}{k}(\hat{\beta}_n - \beta)^T D^{-1}(\hat{\beta}_n - \beta)/\sigma^2}{\frac{1}{n-p}(n-p)\hat{s}_n^2/\sigma^2} = \frac{(\hat{\beta}_n - \beta)^T D^{-1}(\hat{\beta}_n - \beta)}{k\hat{s}_n^2} \sim F(k, n-p)$$

Значит,

$$P_{\beta, \sigma^2} \left((\hat{\beta}_n - \beta)^T D^{-1}(\hat{\beta}_n - \beta) \leq k\hat{s}_n^2 f_{1-\alpha}(k, n-p) \right) = 1 - \alpha$$

$f_{1-\alpha}(k, n-p)$ - квантиль уровня $1 - \alpha$ $F(k, n-p)$.

Доверительное множество для β уровня $1 - \alpha$

$$\Theta^*(X, \alpha) = \left\{ \beta : (\hat{\beta}_n - \beta)^T D^{-1}(\hat{\beta}_n - \beta) < k\hat{s}_n^2 f_{1-\alpha}(k, n-p) \right\} =$$

$$= \{ \beta : f_{k,n-p}(X, \beta) < f_{1-\alpha}(k, n-p) \} - \text{доверительный эллипсоид}$$

Рассмотрим проверку гипотезы $H_0 : \beta = \beta_0$ против $H_1 : \beta \neq \beta_0$. H_0 называют линейной гипотезой, так как $\beta = Ac$ получается линейным преобразованием c . В силу замечания 3 H_0 надо принимать, если $\beta_0 \in \Theta^*(X, \alpha)$, то есть область принятия H_0 :

$$\bar{S}_\alpha(\beta_0) = \{x : f_{k,n-p}(x, \beta_0) \leq f_{1-\alpha}(k, n-p)\}$$

То есть критическое множество (критерий уровня α):

$$S_\alpha(\beta_0) = \{x : f_{k,n-p}(x, \beta_0) > f_{1-\alpha}(k, n-p)\} \quad (8)$$

Критерий 8 называют **критерием Фишера** или **F-критерием**. $f_{k,n-p}(X, \beta_0)$ - статистика F-критерия.