

Отчет по задаче на нахождение собственных значений

Шерстобитов Андрей, задача 0011

Постановка задачи:

$$\begin{cases} \frac{y_{k+1}-2y_k+y_{k-1}}{h^2} = -\lambda y_k, & 1 \leq k \leq N-1 \\ y_0 = 0 \\ y_N = y_{N-1} \end{cases}$$

1. Запишем канонический вид. Найдем коэффициенты для краевых условий

$$k = 1 : \frac{y_2 - 2y_1}{h^2} = -\lambda y_1$$

$$k = N - 1 : \frac{y_N - 2y_{N-1} + y_{N-2}}{h^2} = \frac{-y_{N-1} + y_{N-2}}{h^2} = -\lambda y_{N-1}$$

Таким образом задачу можно переписать в матричном виде:

$$\begin{pmatrix} \frac{-2}{h^2} & \frac{1}{h^2} & & & 0 \\ \frac{1}{h^2} & \frac{-2}{h^2} & \frac{1}{h^2} & & \\ & \dots & \dots & \dots & \\ & & \frac{1}{h^2} & \frac{-2}{h^2} & \frac{1}{h^2} \\ 0 & & & \frac{1}{h^2} & \frac{-2}{h^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_{N-1} \end{pmatrix} = -\lambda \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_{N-1} \end{pmatrix}$$

2. Для более удобного решения сделаем замену $p = 1 - h^2 \frac{\lambda}{2}$ и перепишем условие:

$$\begin{cases} y_{k+1} - 2py_k + y_{k-1} = 0, & 1 \leq k \leq N-1 \\ y_0 = 0 \\ y_N = y_{N-1} \end{cases}$$

Решим полученную разностную задачу:

$$P(\mu) = \mu^2 - 2p\mu + 1 = 0 \Leftrightarrow \mu_{1,2} = p \pm \sqrt{p^2 - 1}$$

Также по теореме Виета:

$$\mu_1 \cdot \mu_2 = 1 \tag{1}$$

$$\frac{\mu_1 + \mu_2}{2} = p \tag{2}$$

(а) $\mu_1 \neq \mu_2$. Тогда общее решение имеет вид

$$y_k = C_1 \mu_1^k + C_2 \mu_2^k$$

Подставим в начальные условия, чтобы найти C_1 и C_2 :

$$\begin{cases} y_0 = 0 = C_1 + C_2 \Rightarrow C_2 = -C_1 \\ y_N = y_{N-1} : C_1 \mu_1^N + C_2 \mu_2^N = C_1 \mu_1^{N-1} + C_2 \mu_2^{N-1} \end{cases}$$

Преобразуем второе равенство, используя первое:

$$C_1(\mu_1^N - \mu_2^N) = C_1(\mu_1^{N-1} - \mu_2^{N-1})$$

Если $C_1 = 0$, то $C_2 = 0$, то $y_k \equiv 0$, что нам неинтересно, так как нулевой вектор не является собственным. Иначе

$$\mu_1^N - \mu_2^N = \mu_1^{N-1} - \mu_2^{N-1} \Leftrightarrow \mu_1^N - \mu_1^{N-1} = \mu_2^N - \mu_2^{N-1} \Leftrightarrow \mu_1^{N-1}(\mu_1 - 1) = \mu_2^{N-1}(\mu_2 - 1)$$

Используем п.1 из теоремы Виета:

$$\mu_1^{N-1}(\mu_1 - \mu_1\mu_2) = \mu_2^{N-1}(\mu_2 - 1) \Leftrightarrow -\mu_1^N(\mu_2 - 1) = \mu_2^{N-1}(\mu_2 - 1)$$

Заметим, что $\mu_2 \neq 1$, так как по теореме Виета $\mu_1 = \mu_2 = 1$ – противоречие.

$$\frac{\mu_1^N}{\mu_2^{N-1}} = -1 \Leftrightarrow \mu_1^{2N-1} = -1$$

Возьмем $2N - 1$ комплексный корень из 1 и получим:

$$\begin{cases} \mu_1^{(m)} = \exp\left(\frac{\pi(2m+1)i}{2N-1}\right) \\ \mu_2^{(m)} = \exp\left(-\frac{\pi(2m+1)i}{2N-1}\right) \end{cases} \quad m = 0, \dots, 2N-2$$

Решение имеет вид:

$$\begin{aligned} y_k &= C_1\mu_1^k + C_2\mu_2^k = C \left(\exp\left(\frac{\pi(2m+1)i}{2N-1}\right) - \exp\left(-\frac{\pi(2m+1)i}{2N-1}\right) \right) = \\ &= 2C \left(\frac{\exp\left(\frac{\pi(2m+1)i}{2N-1}\right) - \exp\left(-\frac{\pi(2m+1)i}{2N-1}\right)}{2} \right) = C \sin \frac{\pi(2m+1)k}{2N-1} \\ &\quad m = 0, \dots, 2N-2, \quad k = 1, \dots, N-1 \end{aligned}$$

Или иначе:

$$y_k = C \sin \frac{\pi(2m-1)k}{2N-1}, \quad m = 1, \dots, 2N-1, \quad k = 1, \dots, N-1$$

Найдем собственные значения. По теореме Виета:

$$\begin{aligned} p = \frac{\mu_1 + \mu_2}{2} &= \frac{\exp\left(\frac{\pi(2m-1)i}{2N-1}\right) + \exp\left(-\frac{\pi(2m-1)i}{2N-1}\right)}{2} = \cos\left(\frac{\pi(2m-1)}{2N-1}\right) \\ &\quad m = 1, \dots, 2N-1, \quad k = 1, \dots, N-1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p &= 1 - \lambda \frac{h^2}{2} \Leftrightarrow \\ \lambda &= \frac{2}{h^2} \left(1 - \cos\left(\frac{\pi(2m-1)}{2N-1}\right) \right) = \frac{4}{h^2} \sin^2\left(\frac{\pi(2m-1)}{2(2N-1)}\right) \\ &\quad m = 1, \dots, 2N-1, \quad k = 1, \dots, N-1 \end{aligned}$$

У симметричной матрицы размера $N - 1 \times N - 1$ не может быть больше $N - 1$ собственного значения, но выше мы получили $2N - 1$. Посмотрим на них подробнее: обозначим $\alpha_m = \frac{\pi(2m-1)}{2N-1}$. Тогда

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= \frac{2\pi}{2(2N-1)} - \frac{\pi}{2(2N-1)} = \frac{\pi}{2(2N-1)} \\ \alpha_2 &= \frac{4\pi}{2(2N-1)} - \frac{\pi}{2(2N-1)} = 3\alpha_1 \\ &\dots \\ \alpha_{2N-1} &= \frac{2\pi(2N-1)}{2(2N-1)} - \frac{\pi}{2(2N-1)} = \pi - \frac{\pi}{2(2N-1)} < \pi\end{aligned}$$

То есть все $2N - 1$ угол расположены в верхней части тригонометрического круга. Но так как \sin имеет одинаковые значения для I и II частей круга, то половина корней будет совпадать. Таким образом ответ:

$$\begin{aligned}y_k &= C \sin \frac{\pi(2m+1)k}{2N-1} & m &= 1, \dots, N-1 \\ \lambda &= \frac{4}{h^2} \sin^2 \left(\frac{\pi(2m-1)}{2(2N-1)} \right) & k &= 1, \dots, N-1\end{aligned}$$

- (b) $\mu_1 = \mu_2$: из теоремы Виета следует $\mu_1 = \mu_2 = p$ и $\mu_1\mu_2 = 1 \Rightarrow \lambda = 0$ и $\lambda = \frac{4}{h^2}$. Вставим это решение в ответ из случая $\mu_1 \neq \mu_2$

Итоговый ответ:

$$\begin{aligned}y_k &= C \sin \frac{\pi(2m+1)k}{2N-1} & m &= 1, \dots, N-1 \\ \lambda &= \frac{4}{h^2} \sin^2 \left(\frac{\pi(2m-1)}{2(2N-1)} \right) & k &= 0, \dots, N\end{aligned}$$