

Exercice. Un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.

On définit sur E l'application $f : P \mapsto P(2X) - P(X)$.

1. Démontrer que f est un endomorphisme de E .
2. Donner une famille génératrice de $\text{Im}(f)$ puis en donner une base.
3. Que vaut $\dim \text{Ker}(f)$? Donner une base de $\text{Ker}(f)$.
4. Le noyau et l'image de f sont-ils supplémentaires?

Problème. Équations du second degré dans $\mathcal{L}(E)$.

Dans ce problème, E désignera un \mathbb{K} -espace vectoriel, dont le neutre est noté 0.

On note $\mathcal{L}(E)$ l'ensemble des endomorphismes de E . On rappelle que $\mathcal{L}(E)$ a été muni d'une structure de \mathbb{K} -espace vectoriel avec une addition $+$ et une loi de composition externe \cdot . On rappelle aussi que $(\mathcal{L}(E), +, \cdot)$ est un anneau. En particulier, l'écriture f^2 désigne l'endomorphisme $f \circ f$. Parmi les endomorphismes de E , distinguons l'identité, notée id , et l'endomorphisme nul noté 0.

Le groupe des inversibles de $\mathcal{L}(E)$ est noté $\text{GL}(E)$: c'est l'ensemble des automorphismes de E , c'est-à-dire celui des endomorphismes bijectifs.

Nous rappelons que si F est un sous-espace vectoriel de E et $f \in \mathcal{L}(E)$, on dit que F est stable par f si

$$\forall x \in F \quad f(x) \in F.$$

Nous allons considérer dans ce problème des endomorphismes f dans $\mathcal{L}(E)$ annulés par un polynôme

$$P = X^2 + \alpha X + \beta,$$

où α et β sont des scalaires de \mathbb{K} .

Plus précisément, on supposera que

$$f^2 + \alpha f + \beta \text{id} = 0.$$

Partie 1. Le cas où P est scindé à racines simples : lemme des noyaux.

Dans cette partie, nous supposons que P possède deux racines distinctes λ et μ dans \mathbb{K} : $P = (X - \lambda)(X - \mu)$. On note

$$E_\lambda = \text{Ker}(f - \lambda \text{id}) \quad \text{et} \quad E_\mu = \text{Ker}(f - \mu \text{id}).$$

0. Soit $x \in E_\lambda$. Que vaut $f(x)$?

1. Vérifier que

$$(f - \mu \text{id}) \circ (f - \lambda \text{id}) = 0 = (f - \lambda \text{id}) \circ (f - \mu \text{id}).$$

2. Vérifier que

$$\text{Im}(f - \lambda \text{id}) \subset \text{Ker}(f - \mu \text{id}) \quad \text{et} \quad \text{Im}(f - \mu \text{id}) \subset \text{Ker}(f - \lambda \text{id}).$$

3. Lemme des noyaux (1) : une preuve en dimension finie.

Dans cette question, on suppose que E est de dimension finie égale à n .

(a) En utilisant le théorème du rang, démontrer que

$$n \leq \dim E_\lambda + \dim E_\mu.$$

(b) Démontrer que E_λ et E_μ sont en somme directe, et en déduire

$$n \geq \dim E_\lambda + \dim E_\mu.$$

(c) Justifier que

$$E = E_\lambda \oplus E_\mu$$

(d) *Le temps du dessin*

On considère $E = \mathbb{R}^3$, $\lambda = 2$, $\mu = 1$, $\dim E_\lambda = 2$, $\dim E_\mu = 1$.

Faire un dessin représentant E_λ et E_μ .

Représenter aussi un vecteur x n'appartenant ni à E_λ ni à E_μ .

Enfin, représenter $f(x)$.

Un peu de couleur sera appréciée.

4. Lemme des noyaux (2) : une preuve en dimension quelconque.
On ne fait plus d'hypothèse de dimension finie pour E .
Démontrer à nouveau que $E = E_\lambda \oplus E_\mu$.

Partie 2. Cas où $P = X^2 - \lambda X$.

Dans cette partie λ est un réel non nul et f un endomorphisme de E tel que

$$f^2 = \lambda f.$$

5. Comment appelle-t-on l'endomorphisme f dans le cas particulier où $\lambda = 1$?
6. Que dire de f si on suppose qu'il s'agit d'un automorphisme de E ?
7. Justifier que

$$E = \text{Ker}(f) \oplus \text{Ker}(f - \lambda \text{id}).$$

8. Montrer qu'il existe une homothétie h et un projecteur p tels que $f = h \circ p$.
9. Un exemple.
(a) Résoudre l'équation différentielle $y'' - \lambda y' = 0$.
On précisera une base et la dimension de cet espace vectoriel.
(b) Donner un exemple d'espace vectoriel E et un exemple d'endomorphisme de E tel que $f^2 = \lambda f$ et qui ne soit pas une homothétie.

Partie 3. Cas où $P = X^2 - \gamma$.

Dans cette partie γ est un réel non nul et f un endomorphisme de E tel que

$$f^2 = \gamma \text{id}.$$

10. Comment appelle-t-on l'endomorphisme f dans le cas particulier où $\gamma = 1$?
11. Montrer que f est un automorphisme de E et préciser f^{-1} .
12. Supposons que γ possède une racine carrée ρ dans \mathbb{K} . Justifier que

$$E = \text{Ker}(f - \rho \text{id}) \oplus \text{Ker}(f + \rho \text{id}).$$

Montrer qu'il existe une homothétie h et une symétrie s tels que $f = h \circ s$.

13. Un exemple. Dans cette question, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

- (a) Résoudre l'équation différentielle $y'' - \gamma y = 0$.
On discutera suivant le signe de γ , on précisera une base et la dimension.
(b) Donner un exemple d'espace vectoriel E et un exemple d'endomorphisme f tel que $f^2 = \gamma \text{id}$ et tel que f ne soit pas une homothétie.

Partie 4. Cas où $P = X^2 + 1$ avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et en dimension finie.

Dans cette partie du problème, on suppose que E est un \mathbb{R} -espace vectoriel de dimension finie et non réduit à $\{0\}$.

On suppose qu'il existe un endomorphisme f dans $\mathcal{L}(E)$ tel que

$$f^2 = -\text{id}.$$

Pour faire le lien avec la partie 3, on fait remarquer que ce problème correspond au cas où $\alpha = -1$, mais ici, α n'a pas de racine carrée dans \mathbb{R} .

14. Soit $u \in E$ un vecteur non nul. Montrer que $(u, f(u))$ est libre.
15. On note $V_u = \text{Vect}(u, f(u))$.
Montrer que V_u est le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant u et stable par f .
16. Soit $a \in V_u$ un vecteur non nul. Montrer que $V_u = V_a$.
17. Soit F un sous-espace vectoriel de E stable par f et ne contenant pas u .
Montrer que V_u et F sont en somme directe et que $V_u \oplus F$ est stable par f .
18. En déduire qu'il existe des vecteurs u_1, \dots, u_p tels que

$$(u_1, f(u_1), u_2, f(u_2), \dots, u_p, f(u_p))$$

soit une base de E . En déduire que la dimension de E est paire.

19. Soit $g \in \mathcal{L}(E)$ tel que $g^2 = -\text{id}$.
Montrer qu'il existe un automorphisme $\theta \in \text{GL}(E)$ tel que $g = \theta^{-1} \circ f \circ \theta$.
20. Réciproquement, on suppose que E est de dimension paire.
Montrer qu'il existe un endomorphisme f dans $\mathcal{L}(E)$ tel que $f^2 = -\text{id}$.