Study	TE	seTE		SMD	95%–CI	Weight (fixed)	Weight (random)
BLCA	0.68	0.0228		0.68	[0.64; 0.73]	0.2%	4.4%
BRCA	0.25	0.0025		0.25	[0.25; 0.26]	19.1%	4.4%
CESC	0.66	0.0218		0.66	[0.62; 0.71]	0.3%	4.4%
CHOL	0.88	0.0173		0.88	[0.84; 0.91]	0.4%	4.4%
COAD	1.61	0.0048		1.61	[1.60; 1.62]	5.3%	4.4%
ESCA	0.34	0.0141		0.34	[0.31; 0.37]	0.6%	4.4%
GBM	1.18	0.0483		1.18	[1.09; 1.28]	0.1%	4.3%
HNSC	0.36	0.0059		0.36	[0.35; 0.37]	3.5%	4.4%
KICH	0.86	0.0099		0.86	[0.84; 0.88]	1.2%	4.4%
KIRC	0.92	0.0032		0.92	[0.92; 0.93]	11.7%	4.4%
KIRP	0.95	0.0096		0.95	[0.93; 0.96]	1.3%	4.4%
LIHC	0.18	0.0042		0.18	[0.17; 0.19]	6.7%	4.4%
LUAD	0.66	0.0038		0.66	[0.65; 0.66]	8.6%	4.4%
LUSC	0.99	0.0050		0.99	[0.98; 1.00]	4.9%	4.4%
PAAD	0.21	0.0584		0.21	[0.09; 0.32]	0.0%	4.3%
PCPG	0.51	0.0250		0.51	[0.46; 0.56]	0.2%	4.4%
PRAD	0.71	0.0039		0.71	[0.70; 0.71]	7.8%	4.4%
READ	1.50	0.0181		1.50	[1.47; 1.54]	0.4%	4.4%
SARC	0.71	0.0211		0.71	[0.67; 0.75]	0.3%	4.4%
STAD	0.90	0.0122		0.90	[0.88; 0.92]	0.8%	4.4%
THCA	0.22	0.0022		0.22	[0.22; 0.23]	25.3%	4.4%
THYM	0.19	0.0909		0.19	[0.01; 0.36]	0.0%	4.2%
UCEC	0.80	0.0099		0.80	[0.78; 0.82]	1.2%	4.4%
Fixed effect model				**0.54**	**[0.54; 0.54]**	100.0%	––
Overall effect				**0.71**	**[0.54; 0.88]**	––	100.0%

Heterogeneity: I^2 = 100% [100%; 100%], $p = 0$

−1.5 −1 −0.5 0 0.5 1 1.5