Study	TE	seTE		SMD	95%–CI	Weight (fixed)	Weight (random)
BLCA	0.78	0.0185		0.78	[0.74; 0.82]	0.1%	4.3%
BRCA	0.42	0.0019		0.42	[0.42; 0.43]	8.0%	4.4%
CESC	1.17	0.0586		1.17	[1.06; 1.29]	0.0%	4.3%
CHOL	0.57	0.0198		0.57	[0.53; 0.61]	0.1%	4.3%
COAD	1.34	0.0024		1.34	[1.34; 1.35]	4.9%	4.4%
ESCA	0.80	0.0137		0.80	[0.77; 0.82]	0.2%	4.3%
GBM	0.40	0.0033		0.40	[0.39; 0.40]	2.7%	4.4%
HNSC	0.49	0.0083		0.49	[0.47; 0.51]	0.4%	4.4%
KICH	1.09	0.0101		1.09	[1.07; 1.11]	0.3%	4.4%
KIRC	0.27	0.0012		0.27	[0.27; 0.27]	20.3%	4.4%
KIRP	0.11	0.0018		0.11	[0.11; 0.11]	8.9%	4.4%
LIHC	0.49	0.0032		0.49	[0.49; 0.50]	2.9%	4.4%
LUAD	0.81	0.0015		0.81	[0.80; 0.81]	13.0%	4.4%
LUSC	1.51	0.0020		1.51	[1.51; 1.52]	7.2%	4.4%
PAAD	0.20	0.0028		0.20	[0.19; 0.20]	3.7%	4.4%
PCPG	0.43	0.0046		0.43	[0.42; 0.43]	1.4%	4.4%
PRAD	0.42	0.0021		0.42	[0.41; 0.42]	6.6%	4.4%
READ	1.15	0.0039		1.15	[1.14; 1.16]	1.9%	4.4%
SARC	1.06	0.0025		1.06	[1.06; 1.07]	4.7%	4.4%
STAD	0.85	0.0076		0.85	[0.83; 0.86]	0.5%	4.4%
THCA	0.04	0.0021		0.04	[0.03; 0.04]	6.4%	4.4%
THYM	0.11	0.0151		0.11	[0.08; 0.14]	0.1%	4.3%
UCEC	0.53	0.0023		0.53	[0.53; 0.54]	5.7%	4.4%
Fixed effect model				**0.56**	**[0.56; 0.56]**	**100.0%**	**--**
Overall effect				**0.65**	**[0.47; 0.84]**	**--**	**100.0%**

Heterogeneity: $I^2 = 100\%$ [100%; 100%], $p = 0$

−1.5 −1 −0.5 0 0.5 1 1.5