

Study	OR	95%–CI
<b>Smoker%&lt;68%</b>		
Haroun et al (2014, Egypt)	31.15	[3.70; 262.06]
Hsu et al (2007, Taiwan)	3.77	[1.56; 9.13]
Hsu et al (2007, Taiwan)	1.85	[0.68; 5.01]
Li et al (2010, China)	110.03	[6.67; 1814.87]
Zhang et al (2011, China)	1.00	[0.06; 16.56]
<b>Fixed effect model</b>	<b>3.79</b>	<b>[2.07; 6.92]</b>
<b>Random effects model</b>	<b>5.76</b>	<b>[1.64; 20.24]</b>
<i>Heterogeneity: I-squared=67.1%, tau-squared=1.202, p=0.0162</i>		
<b>Smoker%&gt;=68%</b>		
Kim.D et al (2007, Korea)	2.52	[1.29; 4.92]
Verri et al (2009, Multi-country)	1.19	[0.80; 1.77]
Yanagawa et al (2007, Japan)	6.81	[2.85; 16.29]
Zochbauer-Muller et al (2001, Multy-country)	6.30	[2.87; 13.85]
<b>Fixed effect model</b>	<b>2.12</b>	<b>[1.58; 2.84]</b>
<b>Random effects model</b>	<b>3.20</b>	<b>[1.31; 7.83]</b>
<i>Heterogeneity: I-squared=86.7%, tau-squared=0.7074, p&lt;0.0001</i>		
<b>Fixed effect model</b>	<b>2.37</b>	<b>[1.82; 3.09]</b>
<b>Random effects model</b>	<b>3.95</b>	<b>[1.98; 7.88]</b>
<i>Heterogeneity: I-squared=78.8%, tau-squared=0.7268, p&lt;0.0001</i>		

