

משרד הבריאות ממליץ על קבלת [חיסון נגד שפעת](#) כל שנה, לכלל האוכלוסייה, החל מילדים בגיל חצי שנה. החיסון ניתן בקופות החולים ובכיתות ב' ו-ג' בבתי הספר.

## תדריך החיסונים

תדריך החיסונים של אגף האפידמיולוגיה מיועד לסייע ביישום תוכנית החיסונים בארץ ומהווה כלי מכוון בנוגע להבטים המעשיים הכרוכים בפעולות החיסון, עבור הצוות הרפואי.

[לעיון בתדריך החיסונים >](#)

## טבלת מועדי חיסונים בתקופת הילדות

גיל / חיסון	<a href="#">דלקת כבד B</a>	<a href="#">פלצת (טטנוס), אסכרה (דיפטריה), שעלת, שיתוק ילדים (פוליו)</a>	<a href="#">המופילוס אינפלואנצה b</a>	<a href="#">פנוימוקוק</a>	<a href="#">נגיף רוטה</a>	<a href="#">חצבת, חזרת, אדמת, אבעבועות רוח</a>	<a href="#">דלקת כבד A</a>	<a href="#">נגיף פפילומה</a>	<a href="#">שפעת*</a>
<b>בלידה בבית החולים</b>	מנה ראשונה	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>חודש</b>	מנה שניה	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>חודשיים</b>	—	מנה ראשונה	מנה ראשונה	מנה ראשונה	מנה ראשונה	—	—	—	—
<b>4 חודשים</b>	—	מנה שניה	מנה שניה	מנה שניה	מנה שניה	—	—	—	—
<b>6 חודשים</b>	מנה שלישית	מנה שלישית + חיסון פוליו bOPV	מנה שלישית	—	מנה שלישית	—	—	—	מספר המנות (1 או 2) יקבע לפי גיל הילד וקבלת החיסון בעבר
<b>12 חודשים</b>	—	מנה רביעית	מנה רביעית	מנה שלישית	—	מנה ראשונה	—	—	—
<b>18 חודשים</b>	—	חיסון פוליו bOPV	—	—	—	—	מנה ראשונה	—	—
<b>24 חודשים</b>	—	—	—	—	—	—	מנה שניה	—	—
<b>6 שנים (כתה א')</b>	—	—	—	—	—	מנה שניה	—	—	—
<b>7 שנים (כתה ב')</b>	—	מנת דחף	—	—	—	—	—	—	מנה אחת