


ALORON

জৈব রসায়ন

ORGANIC ZERO TO PRO








Lecture-20

Mottasin Pahlavi



- ❑ অ্যামিন
- ❑ ডায়াজোনিয়াম লবণ
- ❑ ইথার
- ❑ জৈব এমিড ও অর জাতক

অ্যামিন




V.V.I

অ্যামিনের আৱৰ্ধৰ্শতা


 NH_3 , RNH_2 , R_2NH , R_3N 

NH_3 এর চেয়ে RNH_2 বেশি আৱৰ্ধৰ্শতা

$\text{NH}_3 < 1^\circ$ অ্যামিন




RNH_2 এর চেয়ে R_2NH বেশি আৱৰ্ধৰ্শতা
 1° অ্যামিন $<$ 2° অ্যামিন



$2^\circ > 1^\circ > 3^\circ > \text{NH}_3$


এক্সিড: H^+ দান করে

আব: H^+ গ্রহণ করে



অ্যামিনৰ প্ৰযুক্তি


নাইট্ৰোজেন থকা মূলকৰ বিজাৰণ বৰ্ত্তে অ্যামিন গঠিত হয়।




অ্যামিনের প্রভুতি:

- ✓ ১. অ্যানকাইন স্থানাইড ও অ্যাক্সোনিয়া থেজ
- ✓ ২. মাথানাইডের বিজারন $(-CN)$
- ✓ ৩. অইয়ো মাথানাইডের বিজারন $(-NC)$
- ✓ ৪. অ্যামাইডের বিজারন $(-CONH_2)$
৫. নাইট্রো মুনকের বিজারন $(-NO_2)$
৬. ইফম্যানি ইন্ডাং শঙ্কর

① $R-X$ 3 NH_3 (216):



NH_3 ଗ୍ରହଣ




② -CN (নাইট্রাইল)

নাইট্রাইল $\xrightarrow{\text{বিজারণ}}$ 1° অ্যামিন



③ আইমো সায়ানাইড (খ)


আইমো সায়ানাইড $\xrightarrow{\text{বিভারক}}$ 2° অ্যামিন



④ অ্যামাইডের বিজারণ





⑤ নাইট্রো (শ্রু)




⑥ ହେନ୍ସ୍ ଉକ୍ଷୟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା








অ্যারোম্যাটিক অ্যামিনের জন্য same:



অন্যান্য বিশেষ প্রযুক্তি






বিক্রিয়া:

- ① কার্বিল অ্যামিন বিক্রিয়া
- ② $1^\circ, 2^\circ, 3^\circ$ অ্যামিন পার্যক্করণ
(HNO_2 এর মাধ্যমে)
- ③ ডায়াজোমকরণ বিক্রিয়া
- ④ অ্যামিনিলেট স্ট্রাকচার


① କାର୍ବିଲ୍‌ ଆମିନ୍‌ ଗଠନ:

ଆରୋମାଟିକ୍‌ ଆମିନ୍‌
(1°)

ଏବଂ
 CHCl_3
ଏବଂ ସୋଡ଼ିୟ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍



② 1°, 2°, 3° બાંધારા ના 2-કુલર
(HNO₂ દ્વારા)







1°




2°




3°







(৩) ডায়াজোবেন বিক্রিয়া




ডায়াজোনিয়াম লবণের বিক্রিয়া






④ অ্যানিলিনের নাইট্রেশন

— NH_2 অর্থাৎ দ্রবীভূত নিদ্রাক



নাইট্রেশন HNO_3 ও H_2SO_4 দ্বারা



যেহেতু (অ্যানিলিন) যার C এবং NH_2 মূল N এবং C যার
 চার্জ দ্বারা। তাই অ্যানিলিনের (NH_3^+) গঠন হয়।
 অ্যানিলিনের নাইট্রেশন যার নিদ্রাক।