

SYSTÈMES DYNAMIQUES

Feuille d'exercices 7

Exercice 1. Critère de mélange fort

Soit (T, X, \mathcal{X}, ν) un système dynamique pmp. Montrer que (T, X, \mathcal{X}, ν) est mélangeant si et seulement si, pour une base hilbertienne donnée Φ de $L^2(X, \mathcal{X}, \nu)$ et pour tout $\varphi, \psi \in \Phi$, on a

$$\int_X \varphi(T^n x) \bar{\psi}(x) d\nu \longrightarrow \left(\int_X \varphi d\nu \right) \left(\int_X \bar{\psi} d\nu \right) \text{ quand } n \rightarrow \infty.$$

Exercice 2. Décroissance surexponentielle des corrélations pour les applications dilatantes du cercle

Pour tout $m \in \mathbf{N}_{\geq 2}$ on note E_m la multiplication par m sur \mathbf{R}/\mathbf{Z} .

1. Montrer que E_m est fortement mélangeante pour la mesure de Haar μ sur \mathbf{R}/\mathbf{Z} .
2. Soient $\varphi, \psi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbf{R}/\mathbf{Z})$.

(a) Montrer que pour tout $N > 0$, il existe $C > 0$ telle que

$$\left| \int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} \psi(\theta) e^{-2i\pi k\theta} d\mu(\theta) \right| \leq \frac{C}{|k|^N}, \quad k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}.$$

(b) En déduire que pour tout $r > 0$, il existe $C > 0$ telle que

$$\left| \int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} \varphi(\psi \circ E_m^j) d\mu - \int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} \varphi d\mu \int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} \psi d\mu \right| \leq C e^{-rj}, \quad j \in \mathbf{N}.$$

Exercice 3. Théorème de Rényi pour le mélange

Montrer qu'un système dynamique pmp (T, X, \mathcal{X}, ν) est fortement mélangeant si et seulement si, pour tout $A \in \mathcal{X}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \nu(A \cap T^{-n}(A)) = \nu(A)^2.$$

Exercice 4. Un critère pour le mélange faible

Un ensemble $E \subset \mathbf{N}$ d'entiers est dit de densité nulle si

$$\lim_n \frac{1}{n} \#(\{1, \dots, n\} \cap E) = 0.$$

Inversement, une suite strictement croissante d'entiers (n_j) est de densité 1 si l'ensemble complémentaire $\mathbb{C}\{n_j, j \in \mathbf{N}\}$ est de densité nulle.

1. Soit (a_n) une suite de nombre complexes bornés. Montrer que $\lim_n \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} |a_n| = 0$ si et seulement si, il existe un ensemble de densité nulle E tel que $\lim_{\substack{n \rightarrow +\infty \\ n \notin E}} a_n = 0$.

2. Soit (T, X, \mathcal{X}, ν) un système dynamique pmp. Montrer que T est faiblement mélangeante si et seulement si il existe une suite d'entiers (n_j) de densité 1 telle que

$$\lim_j \nu(T^{-n_j}(A) \cap B) = \nu(A)\nu(B), \quad A, B \in \mathcal{X},$$

ou encore si et seulement si

$$\lim_n \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \left(\nu(T^{-k}(A) \cap B) - \nu(A)\nu(B) \right)^2 = 0, \quad A, B \in \mathcal{X}.$$

Exercice 5. *Bien fondé de la définition de mélange*

Dans cet exercice, on cherche à montrer que si (T, X, \mathcal{X}, ν) , un système dynamique pmp, possède la propriété que pour tout $A, B \in \mathcal{X}$, il existe N tel que

$$\nu(A \cap T^{-n}(B)) = \nu(A)\nu(B) \tag{1}$$

pour tout $n \geq N$, alors il est trivial dans le sens que $\nu(A) \in \{0, 1\}$ pour tout $A \in \mathcal{X}$. On suppose dans la suite que la propriété 1 est vérifiée.

1. Définissons $\mathcal{S} = \mathcal{X} \pmod{\nu}$ l'ensemble des parties mesurables modulo les parties négligeables. Montrer que (\mathcal{S}, d) est un espace métrique complet, où $d(A, B) = \nu(A \Delta B)$ pour $A, B \in \mathcal{S}$.
2. Supposons qu'il existe $B \in \mathcal{S}$ tel que $0 < \nu(B) < 1$. On définit pour $N \in \mathbf{N}$

$$\Lambda_N = \{A \in \mathcal{S} : \forall n \geq N, \nu(A \cap T^{-n}(B)) = \nu(A)\nu(B)\}.$$

Montrer que les $(\Lambda_N)_N$ sont des fermés d'intérieurs vides.

3. Conclure.