

TD 6 : Complétude & Connexité

Exercice 1 : Echauffement

Pour chacun des espaces métriques suivants, dire s'il est complet. S'il ne l'est pas, en décrire un complété. On rappelle qu'un complété d'un espace métrique F est un espace métrique complet E muni d'une isométrie $i : F \rightarrow E$ telle que $i(F)$ est dense dans E .

1. \mathbb{R} muni de la topologie usuelle.
2. $]0, 1[$ muni de la distance $d(x, y) = |x - y|$.
3. L'espace E_0 des fonctions continues de \mathbb{R} dans \mathbb{R} tendant vers 0 en $+\infty$ et $-\infty$, avec la norme $\|\cdot\|_\infty$.
4. L'espace E des fonctions continues de \mathbb{R} dans \mathbb{R} à support compact, avec la norme $\|\cdot\|_\infty$.
5. L'espace c_0 des suites $u \in \mathbb{R}^\mathbb{N}$ nulles sauf en un nombre fini de points muni de la norme uniforme $\|\cdot\|_\infty$.
6. L'espace l_1 des suites $u \in \mathbb{R}^\mathbb{N}$ tel que $\|u\|_1 := \sum_{n \in \mathbb{N}} |u_n| < \infty$ muni de la norme $\|\cdot\|_1$.
7. L'espace c_0 muni de la norme $\|\cdot\|_1$.

Exercice 2 : Connexité : exemples et contre-exemples

1. Montrer que $\{0, 1\}^\mathbb{N}$ est totalement discontinu i.e. ses composantes connexes sont les singletons.
2. Montrer que l'ensemble de \mathbb{R}^2 ,

$$E = \{(0, 0)\} \cup [0, 1] \times \{1\} \cup \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \left\{\frac{1}{n}\right\} \times [0, 1]$$

est connexe mais pas connexe par arcs.

3. Montrer que l'ensemble de \mathbb{R}^2 ,

$$E = \{(x, rx); x \in [0, 1], r \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]\}$$

est connexe par arcs mais pas localement connexe par arcs (localement connexe par arcs : pour tout $x \in X$, tout voisinage de x contient un voisinage connexe par arcs.)

Exercice 3 : Autour du théorème de point fixe de Picard

On commence par rappeler l'énoncé du théorème :

Théorème. Soit (X, d) un espace métrique complet et $f : X \rightarrow X$ k -Lipschitzienne avec $0 < k < 1$. Alors f possède un unique point fixe.

1. Montrer par un contre-exemple que la conclusion du théorème tombe en défaut si :
 - a) l'on enlève l'hypothèse X complet
 - b) on suppose simplement que pour tout $x, y \in X$, $d(f(x), f(y)) < d(x, y)$.

2. Soit (X, d) un espace métrique complet et $f : X \rightarrow X$ continue et $p \in \mathbb{N}^*$ tel que f^p est k -contractante avec $0 < k < 1$. Montrer que f possède un unique point fixe.
3. Soit X et Y deux espaces métriques avec X complet et $f : X \times Y \rightarrow X$ une application continue et k -contractante en X . Montrer que la fonction qui à y associe l'unique point fixe de $f(\bullet, y)$ est continue.
4. **Une application.** Soit $f :]0; +\infty[\rightarrow]0; +\infty[$ une fonction \mathcal{C}^1 et $k \in]0; 1[$ tels que

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^* \quad x|f'(x)| \leq kf(x).$$

Montrer que f admet un unique point fixe. *Indication : on pourra considérer la distance $d(x, y) := |\ln(x) - \ln(y)|$ et montrer qu'elle engendre la topologie usuelle sur \mathbb{R}_+^* et en fait un espace complet.*

Exercice 4 : Pot pourri de connexité

1. Montrer que \mathbb{R} et \mathbb{R}^2 ne sont pas homéomorphes.
2. Soit X un espace topologique tel que tout point possède un voisinage connexe par arcs. Montrer que X est connexe si et seulement si il est connexe par arcs.
3. Soient A et B deux parties connexes d'un espace topologique X telles que $\overline{A} \cap B \neq \emptyset$. Montrer que $A \cup B$ est connexe.
4. Soient A et B deux fermés d'un espace topologique tels que $A \cup B$ et $A \cap B$ soient connexes. Montrer que A et B sont connexes.

Exercice 5 : une application du théorème de Baire aux fonctions continues

On rappelle l'énoncé suivant du théorème de Baire :

Théorème. Soit (X, d) un espace métrique complet et (F_n) une famille dénombrable de fermés d'intérieur vide ($F_n = \emptyset$). Alors, $\bigcup_n F_n$ est d'intérieur vide.

1. **Un corollaire du théorème de Baire.** Soit X un espace métrique complet et (F_n) une suite de fermés tels que $X = \bigcup_n F_n$. Montrer que $\Omega = \bigcup_n \overset{\circ}{F}_n$ est dense dans X .
2. Soient X et Y deux espaces métriques. On suppose X **complet**. Soit (f_n) une suite de fonctions continues de $X \rightarrow Y$ et $f : X \rightarrow Y$ telles que pour tout $x \in X$, $f_n(x) \rightarrow f(x)$. On souhaite montrer que l'ensemble des points de continuité de f est dense dans X . Pour $k \in \mathbb{N}^*, n \in \mathbb{N}$, on note

$$F_{n,k} := \{x \in X; \forall p, q \geq n, d(f_p(x), f_q(x)) \leq \frac{1}{k}\}, \quad \Omega_k = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \overset{\circ}{F}_{k,n} \text{ et } \Omega = \bigcap_k \Omega_k$$

- a) Montrer que si $x \in \Omega$, alors f est continue en x .
 - b) Conclure.
3. Montrer que si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable, alors f' est continue sur une partie dense.

Exercice 6 : Projection sur un convexe fermé

Soit $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace de Hilbert réel. On rappelle que l'identité suivante, dite du parallélogramme, est vérifiée : pour tout $x, y \in H$,

$$\|x\|^2 + \|y\|^2 = \frac{1}{2} (\|x - y\|^2 + \|x + y\|^2)$$

1. **Projection sur un convexe fermé.** Soit C une partie convexe fermé de H . Soit $x \in H$.
 - a) Montrer qu'il existe un unique point, noté $p_C(x)$, tel que $d(x, C) = \|x - p_C(x)\|$.
 - b) Montrer que $p_C(x)$ est de manière équivalente, l'unique point $z \in C$ tel que pour tout $y \in C$, $\langle x - z, y - z \rangle \leq 0$.
2. **Applications fondamentales.**
 - a) Soit F un sous-espace vectoriel fermé de H . Montrer que $F \oplus F^\perp = H$.
 - b) Soit G un sous-espace vectoriel de H . Montrer que $\overline{G} = H \iff G^\perp = \{0\}$.
 - c) **Théorème de représentation de Riesz.** On rappelle que H^* est l'espace des formes linéaires continues sur H , muni de la norme $\|l\|_{H^*} = \sup_{\|x\|=1} |l(x)|$. Pour $x \in H$, on note $l_x : y \in H \mapsto \langle x, y \rangle \in \mathbb{R}$. Montrer que l'application $x \in H \mapsto l_x \in H^*$ est une isométrie surjective. En particulier, H et H^* sont isométriques.



Exercice 7 : Fonctions continues nulle part dérivables

On notera $E = C^0([0, 1], \mathbb{R})$.

1. **Un exemple ...** Montrer que la fonction $f : x \in [0, 1] \mapsto \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{d(2^n x)}{2^n}$ est continue et nulle part dérivable, où $d(x)$ désigne la distance de x à l'entier de plus proche.
2. **... loin d'être exceptionnel !** En étudiant les ensembles

$$F_n := \{f \in E; \exists x \in [0, 1], \forall y \in [0, 1], |f(x) - f(y)| \leq n|x - y|\}$$

montrer que l'ensemble des fonctions continues nulle part dérivables est dense dans E .

Exercice 8 : Le tipi de Cantor

On rappelle que l'ensemble triadique de Cantor est obtenu comme l'intersection d'une famille dénombrable d'intervalles $K = \bigcap_{m \in M} I_m$ où M est dénombrable. On note alors $\mathcal{B} = \bigcup_{m \in M} \partial I_m$. On note $p = (1/2, 1) \in \mathbb{R}^2$. Si $z \in K$, on définit la partie

$$D(z) = \begin{cases} \{(x, y) \in [(z, 0), p]; y \in \mathbb{Q}\} & \text{si } z \in \mathcal{B} \\ \{(x, y) \in [(z, 0), p]; y \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}\} & \text{sinon} \end{cases}$$

Enfin, on appelle Tipi de Cantor (ou éventail de Knaster-Kuratowski) la partie $X = \bigcup_{z \in K} D(z)$, que l'on munit de la topologie induite.

1. Montrer que $X \setminus \{p\}$ est totalement discontinu.
2. (**difficile**) montrer que X est connexe.

Exercice 9 : Interversion surprenante !

On va démontrer le théorème de Sunyer i Balaguer :

Soit $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que pour tout $x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}, f^{(n)}(x) = 0$. Alors f est polynomiale. Autrement dit,

$$\forall x, \exists n, f^{(n)}(x) = 0 \iff \exists n, \forall x, f^{(n)}(x) = 0$$

1. On va commencer par un cas facile : on suppose que f est analytique i.e. f est développable en série entière au voisinage de chacun de ses points.
 - a) Montrer que s'il existe $I \subset \mathbb{R}$ intervalle non vide tel que $f|_I = 0$ alors $f = 0$.
 - b) En considérant les ensembles $F_n = \{x \in \mathbb{R}, f^{(n)}(x) = 0\}$, montrer le résultat.
2. On démontre dans cette question la version générale du théorème. Soit $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que pour tout $x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}, f^{(n)}(x) = 0$. On note

$$Y = \{x \in \mathbb{R}; \exists a < x < b, f \text{ est polynomiale sur }]a, b[\} \text{ et } X = \mathbb{R} \setminus Y$$

- a) Montrer que si $X = \emptyset$, alors f est polynomiale.
 Dans la suite de la question, on raisonne par l'absurde et on suppose que $X \neq \emptyset$.
- b) Montrer que X est complet.
- c) Montrer que X est sans point isolé.
- d) On note $F_n = \{x \in X; f^{(n)}(x) = 0\}$. Montrer qu'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ et $a < b \in \mathbb{R}$ tels que $X \cap]a, b[\neq \emptyset$ et pour tout $n \geq n_0$, $X \cap]a, b[\subset F_n$.
- e) Montrer que $]a, b[\subset F_{n_0}$ puis conclure.

Exercice 10 : Théorème d'Alexandroff-Mazurkiewicz (Partiel 2016)

Soit (X, d) un espace métrique complet et soit A une partie de X . On va montrer l'équivalence suivante :

(1) Il existe une distance d' sur A qui engendre la même topologie que d et pour laquelle (A, d') est complet.

(2) A est une intersection dénombrable d'ouverts de X .

1. Quelques préliminaires.
 - a) Montrer qu'un fermé de X peut s'écrire comme intersection dénombrable d'ouverts.
 - b) Montrer que l'ensemble des points de continuité d'une fonction $f : Y \rightarrow \mathbb{R}$ où Y est un espace topologique, est une intersection dénombrable d'ouverts.
2. On va traiter le sens direct.
 - a) Soit d' une distance complète sur A , induisant la même topologie que la distance d . Montrer qu'on peut supposer d' bornée et A dense dans X .
 - b) Pour z dans X , on pose

$$f(z) = \sup \left\{ \limsup_n d'(x_n, x_{n+1}) \text{ tq } x \in A^\mathbb{N} \text{ et } x_n \rightarrow z \text{ pour } d \right\}.$$

Montrer que f est bien définie et à valeurs réelles. Montrer que f est continue exactement en les points de A .

c) Conclure le sens (1) \implies (2).

3. Passons au sens réciproque.

a) Soit U un ouvert de X . On considère d' , définie sur U , par

$$d'(x, x') = d(x, x') + \left| \frac{1}{f(x)} - \frac{1}{f(x')} \right|,$$

où $f(x) = d(x, X - U)$. Montrer que d' est une distance sur U , induisant la même topologie que d . Montrer que (U, d') est un espace métrique complet.

b) Utiliser la question précédente pour construire une métrique complète sur $A = \bigcap_n U_n$, où $(U_n)_n$ est une famille dénombrable d'ouverts de X .