

# Aula 8 -

À medida que cresce o número de equações e de incógnitas num sistema linear, cresce também a complexidade da álgebra envolvida em sua solução.

Podemos escrever um sistema de equações qualquer usando uma matriz aumentada.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 9 \\ 2x_1 + 4x_2 - 3x_3 = 1 \\ 3x_1 + 6x_2 - x_3 = 0 \end{cases} \rightarrow \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & -2 & 1 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{array} \right]$$

Um método para resolver sistemas lineares consiste em efetuar operações algébricas no sistema que não alterem seu conjunto solução e que produzem uma sucessão de sistemas cada vez mais simples.

As operações típicas são as seguintes:

- 1 – Multiplicar uma equação inteira por uma constante não nula.
- 2 – Trocar duas equações entre si.
- 3 – Somar uma constante vezes uma equação a outra equação.

Essas operações são denominadas operações elementares com linhas de uma matriz.

## Exemplo

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 9 \\ 2x_1 + 4x_2 - 3x_3 = 1 \\ 3x_1 + 6x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & \textcolor{red}{i} & 3 \\ 2 & 4 & -2 & \textcolor{red}{i} & 1 \\ 3 & 6 & -5 & \textcolor{red}{i} & 0 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} L_1 \\ L_2 = L_2 - 2L_1 \\ L_3 = L_3 - 3L_1 \end{array}$$

$$\left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & \textcolor{red}{i} & 9 \\ 0 & 2 & -7 & \textcolor{red}{i} & -17 \\ 0 & 3 & -11 & \textcolor{red}{i} & -27 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} L_1 \\ L_2 \\ L_3 = L_3 - (\frac{3}{2})L_1 \end{array}$$

$$\left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & \textcolor{red}{i} & 9 \\ 0 & 2 & -7 & \textcolor{red}{i} & -17 \\ 0 & 0 & -(\frac{1}{2}) & \textcolor{red}{i} & -(\frac{3}{2}) \end{array} \right]$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 9 \\ 2x_2 - 7x_3 = -17 \\ -(\frac{1}{2})x_3 = -(\frac{3}{2}) \end{cases}$$

Elaborando as equações:

$$-\left(\frac{1}{2}\right)x_3 = -\left(\frac{3}{2}\right)$$

$$-x_3 = -3$$

$$x_3 = 3$$

$$2x_2 - 7x_3 = -17$$

$$2x_2 - 7 \cdot 3 = -17$$

$$2x_2 = -17 + 21$$

$$2x_2 = 4$$

$$x_2 = 2$$

$$x_1 = 9 - 2 - 2 \cdot 3 \rightarrow x_1 = 1$$

Usando Gauss no exemplo da aula passada: