

CONSENTEMENT DE L'ÉPILATION LASER

CONTRE-INDICATIONS AU TRAITEMENT LASER :

- * Exposition solaire récente (2 jours)
- * Grossesse !
- * Prise de Roaccutane au cours des 6 derniers mois
- * Utilisation de médicaments pouvant provoquer une photosensibilisation ou pouvant augmenter la pilosité: corticoïdes, Dilantin, Cyclosporine, Minoxidil, Penicillamine, Psoralène, ...)
- * Problèmes de peaux: cancer, troubles de la cicatrisation
- * Implants métalliques sur la zone à traiter (broches, vis...)
- * Appareils dentaires métalliques sur les dents
- * Tatouages - Maquillage permanent, semi permanent sur la zone à traiter
- * Vitamine cheveux
- * Poil blond, clair
- * Problèmes hormonal

Je reconnais avoir pris connaissance des contre-indications au traitement Diode Ice laser et je certifie l'exactitude de mes réponses. Je m'engage à prévenir le spécialiste si mon état venait à évoluer.

CONSIGNES AVANT LA SÉANCE :

- ✓ Arrêter l'épilation à la cire et/ou à la pince et/ou à l'épilateur ainsi que la décoloration au moins un mois avant la séance.
- ✓ Le rasage de la zone à traiter devra être réalisé la veille au soir avant la séance pour une plus grande efficacité.

RÉSULTATS ATTENDUS

L'épilation Ice diode laser permet de supprimer de 80% à 90% des poils terminaux sur les zones traitées.

Dans environ 1% des cas, non prévisibles, l'épilation laser :

n'est pas définitive, sans explication connue, n'est pas efficace, sans explication connue.

Les résultats peuvent être mauvais :

- * en cas de douleur et/ou de mouvements excessifs durant la séance, de dépassement des délais entre séances, ou de bronzage durant le traitement,
- * en cas d'acné tardive (après 20 ans) et/ou rebelle, en cas d'obésité, ou de prise de poids importante,
- * en cas d'immaturité du système pileux (moins de 18 ans chez les femmes, moins de 45 ans chez les hommes),
- * sur la pilosité du visage,

- * sur les zones à risque de stimulation paradoxale,

- * sur les poils profonds (genoux, coudes),

- * trouble de la fertilité, trouble hormonal,

- * prise au long cours de corticoïdes, ou hyperpilosité congénitale ou ethnique.

Des progrès visibles doivent s'observer dès la 4ème séance !

Si ce n'est pas le cas, interrompez votre traitement, même si vous estimez qu'il n'est pas fini. Vous pourrez le reprendre quand votre statut hormonal sera devenu plus favorable.

EFFETS SECONDAIRES

Comme toutes techniques, je comprends que des effets secondaires au traitement sont possibles :

Effets normaux après traitement :

- * prise au long cours de corticoïdes, ou hyperpilosité congénitale ou ethnique.
- * apparition autour de chaque poil d'œdèmes (gonflements) qui persistent quelques heures : c'est une preuve d'efficacité.
- * rougeurs, gêne ou sensibilité de la peau persistant de un à trois jours.
- * démangeaisons: effet dérangeant qui régresse en quelques jours.

EFFETS SECONDAIRES RARES ET PERMANENTS :

- ✓ J'accepte qu'aucun remboursement n'est accepté
- ✓ j'accepte que le traitement peut ne pas fonctionner sur moi

Parent (ou responsable légal) :

Date :

Signature lu et approuvée :