

第1章 无穷级数

无穷级数是数学分析三大组成部分之一。

无穷级数是研究函数的工具

- 表示函数
- 研究性质
- 数值计算

无穷级数

- 数项级数
- 函数项级数
- 幂级数
- Fourier级数**

1.1 数项级数

1.1.1 数项级数的概念和性质

1.1.2 正项级数及其判别法

1.1.3 一般项级数及其判别法

1.1.1 数项级数的概念和性质

1、数项级数的概念

引例 用圆内接正多边形面积逼近圆面积.

依次作圆内接正 3×2^n ($n = 0, 1, 2, \dots$) 边形, 设 a_0 表示内接正三角形面积, a_k 表示边数增加时增加的面积, 则圆内接正


3×2^n 边形面积为

$$a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

$n \rightarrow \infty$ 时, 这个和逼近于圆的面积 A .

即

$$A = a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$$



定义1: 给定一个数列 $u_1, u_2, u_3, \cdots, u_n, \cdots$ 将各项依次相加, 简记为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 即

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n + \cdots \quad (1)$$

称上式为**无穷级数**, 其中第 n 项 u_n 叫做级数的一般项,

级数的前 n 项和

$$S_n = \sum_{k=1}^n u_k = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n$$

称为级数的**部分和**.

定义2: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ 存在, 则称无穷级数

收敛, 并称 S 为级数的**和**, 记作 $S = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 不存在, 则称无穷级数**发散**.

当级数收敛时, 称差值

$$r_n = S - S_n = u_{n+1} + u_{n+2} + \cdots$$

为级数的**余项**.

显然 $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 0$

例1. 讨论等比级数(又称几何级数)

$$\sum_{n=0}^{\infty} a q^n = a + a q + a q^2 + \cdots + a q^n + \cdots \quad (a \neq 0)$$

(q 称为公比) 的敛散性.

解: 1) 若 $q \neq 1$, 则部分和

$$S_n = a + a q + a q^2 + \cdots + a q^{n-1} = \frac{a - a q^n}{1 - q}$$

当 $|q| < 1$ 时, 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{a}{1 - q}$

因此级数收敛, 其和为 $\frac{a}{1 - q}$;

当 $|q| > 1$ 时, 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \infty$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \infty$,

因此级数发散.

2). 若 $|q| = 1$, 则

当 $q = 1$ 时, $S_n = na \rightarrow \infty$, 因此级数发散;

当 $q = -1$ 时, 级数成为

$$a - a + a - a + \cdots + (-1)^{n-1}a + \cdots$$

因此
$$S_n = \begin{cases} a, & n \text{ 为奇数} \\ 0, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 不存在, 因此级数发散.

综合 1)、2) 可知, $|q| < 1$ 时, 等比级数收敛;

$|q| \geq 1$ 时, 等比级数发散.

例2. 判别下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n+1}{n};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}.$$

解: (1)

$$S_n = \ln \frac{2}{1} + \ln \frac{3}{2} + \ln \frac{4}{3} + \cdots + \ln \frac{n+1}{n}$$

$$= (\cancel{\ln 2} - \ln 1) + (\cancel{\ln 3} - \cancel{\ln 2}) + \cdots + (\ln(n+1) - \cancel{\ln n})$$

$$= \ln(n+1) \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty)$$

所以级数 (1) 发散;

技巧:

利用“拆项相消”求和

$$\begin{aligned}
 (2) \quad S_n &= \frac{1}{\underline{1 \cdot 2}} + \frac{1}{\underline{2 \cdot 3}} + \frac{1}{\underline{3 \cdot 4}} + \cdots + \frac{1}{\underline{n \cdot (n+1)}} \\
 &= \left(1 - \cancel{\frac{1}{2}} \right) + \left(\cancel{\frac{1}{2}} - \cancel{\frac{1}{3}} \right) + \left(\cancel{\frac{1}{3}} - \cancel{\frac{1}{4}} \right) + \cdots + \left(\cancel{\frac{1}{n}} - \frac{1}{n+1} \right) \\
 &= 1 - \frac{1}{n+1} \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty)
 \end{aligned}$$

所以级数 (2) 收敛, 其和为 1 .

技巧:

利用 “拆项相消” 求和

2、级数的基本性质

性质1. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛于 S , 即 $S = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 则各项

乘以常数 c 所得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c u_n$ 也收敛, 其和为 $c S$.

证: 令 $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$, 则 $\sigma_n = \sum_{k=1}^n c u_k = c S_n$,

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = c \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = c S$$

这说明 $\sum_{n=1}^{\infty} c u_n$ 收敛, 其和为 $c S$.

说明: 级数各项乘以非零常数后其敛散性不变.

性质2. 设有两个收敛级数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$, $\sigma = \sum_{n=1}^{\infty} v_n$

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 也收敛, 其和为 $S \pm \sigma$.

(收敛级数可逐项相加或减)

证: 令 $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$, $\sigma_n = \sum_{k=1}^n v_k$, 则

$$\tau_n = \sum_{k=1}^n (u_k \pm v_k) = S_n \pm \sigma_n \rightarrow S \pm \sigma \quad (n \rightarrow \infty)$$

这说明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 也收敛, 其和为 $S \pm \sigma$.

说明:

(1) 性质2 表明收敛级数可逐项相加或减.

(2) 若两级数中一个收敛一个发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 必发散. (用反证法可证)

但若二级数都发散, $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 不一定发散.

例如, 取 $u_n = (-1)^{2n}$, $v_n = (-1)^{2n+1}$,

而 $u_n + v_n = 0$

性质3. 在级数前面加上或去掉有限项, 不会影响级数的敛散性.

证: 将级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的前 k 项去掉, 所得新级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{k+n}$ 的部分和为

$$\sigma_n = \sum_{l=1}^n u_{k+l} = S_{k+n} - S_k$$

由于 $n \rightarrow \infty$ 时, σ_n 与 S_{k+n} 极限状况相同, 故新旧两级数敛散性相同.

当级数收敛时, 其和的关系为 $\sigma = S - S_k$.

类似可证前面加上有限项的情况.

性质4. 收敛级数加括弧后所成的级数仍收敛于原级数的和.

证: 设收敛级数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 若按某一规律加括弧, 例如

$$(u_1 + u_2) + (u_3 + u_4 + u_5) + \cdots$$

则新级数的部分和序列 σ_m ($m = 1, 2, \cdots$) 为原级数部分和序列 S_n ($n = 1, 2, \cdots$) 的一个子序列, 因此必有

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sigma_m = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$$

用反证法可证

推论: 若加括弧后的级数发散, 则原级数必发散.

注意: 收敛级数去括弧后所成的级数不一定收敛.

例如, $(1-1) + (1-1) + \cdots = 0$, 但 $1-1+1-1+\cdots$ 发散.

例3.判断级数的敛散性:

$$\frac{1}{\sqrt{2}-1} - \frac{1}{\sqrt{2}+1} + \frac{1}{\sqrt{3}-1} - \frac{1}{\sqrt{3}+1} + \frac{1}{\sqrt{4}-1} - \frac{1}{\sqrt{4}+1} + \dots$$

解: 考虑加括号后的级数

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}-1} - \frac{1}{\sqrt{2}+1}\right) + \left(\frac{1}{\sqrt{3}-1} - \frac{1}{\sqrt{3}+1}\right) + \left(\frac{1}{\sqrt{4}-1} - \frac{1}{\sqrt{4}+1}\right) + \dots$$

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n}-1} - \frac{1}{\sqrt{n}+1} = \frac{2}{n-1}$$

$$\therefore \sum_{n=2}^{\infty} a_n = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 发散, 从而原级数发散.}$$

3、级数收敛的必要条件

设收敛级数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 则必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

证: $u_n = S_n - S_{n-1}$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n - \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = S - S = 0$$

可见: 若级数的一般项不趋于0, 则级数必发散.

例如, $\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{3}{4} - \frac{4}{5} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{n}{n+1} + \cdots$, 其一般项为

$$u_n = (-1)^{n-1} \frac{n}{n+1}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, u_n 不趋于0, 因此这个级数发散.

注意: $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ 并非级数收敛的充分条件.

例如, 调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$

虽然 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, 但此级数发散.

事实上, 假设调和级数收敛于 S , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (S_{2n} - S_n) = 0$$

$$\text{但 } S_{2n} - S_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \cdots + \frac{1}{2n} > \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}$$

矛盾! 所以假设不真.

例4 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(n + \frac{1}{n}\right)^n}{n^{n+\frac{1}{n}}}$ 的敛散性.

解 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(n + \frac{1}{n}\right)^n}{n^{n+\frac{1}{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(n + \frac{1}{n}\right)^n}{n^n n^{\frac{1}{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left[\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^{n^2} \right]^{\frac{1}{n}}}{n^{\frac{1}{n}}} = 1 \neq 0$$

所以由级数收敛的必要条件知原级数发散.


例5. 判断下列级数的敛散性, 若收敛求其和:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n n!}{n^n}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 + 3n^2 + 2n}; \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n}.$$

解: (1) 令 $u_n = \frac{e^n n!}{n^n}$, 则

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{\frac{e^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{e^n n!}{n^n}} = \frac{e}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} > 1 \quad (n=1, 2, \dots)$$

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$



故 $u_n > u_{n-1} > \dots > u_1 = e$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$, 这说明级数(1)发散.

(2) 因

$$\begin{aligned}\frac{1}{n^3 + 3n^2 + 2n} &= \frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2} \frac{(n+2) - n}{n(n+1)(n+2)} \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right] \quad (n=1, 2, \cdots)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^3 + 3k^2 + 2k} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{1 \cdot 2} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right]\end{aligned}$$

进行拆项相消

$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{4}$, 这说明原级数收敛, 其和为 $\frac{1}{4}$.

$$\begin{aligned}
(3) \quad S_n &= \frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \frac{5}{2^3} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n} \\
S_n - \frac{1}{2}S_n &= \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{\underline{2^2}} + \frac{5}{\underline{2^3}} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n} \right) - \left(\frac{1}{\underline{2^2}} + \frac{3}{\underline{2^3}} + \frac{5}{2^4} + \cdots + \frac{2n-1}{\underline{2^{n+1}}} \right) \\
&= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{2n-1}{2^{n+1}} \\
&= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1 - \frac{1}{2^{n-1}}}{1 - \frac{1}{2}} - \frac{2n-1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2} + 1 - \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{2n-1}{2^{n+1}} \\
\therefore S_n &= 3 - \frac{1}{2^{n-2}} - \frac{2n-1}{2^n}, \text{ 故 } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 3,
\end{aligned}$$

这说明原级数收敛, 其和为 3.

4. 级数收敛的Cauchy准则

定理1(柯西准则) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充要条件是:

任给正数 ε , 总存在正整数 N , 使得当 $m > N$

以及对任意的正整数 p 都有

$$\left| u_{m+1} + u_{m+2} + \cdots + u_{m+p} \right| < \varepsilon.$$

根据定理1以及数列发散的充要条件, 可以立刻

写出级数发散的充要条件是: 存在某正数 ε_0 , 对

任何正整数 N , 总存在正整数 $m_0 (> N)$ 和 p_0 , 有

$$\left| u_{m_0+1} + u_{m_0+2} + \cdots + u_{m_0+p_0} \right| \geq \varepsilon_0.$$

例6 讨论调和级数 $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$ 的敛散性.

解 取 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$, 对任何正整数 N 只要 $m > N$ 和 $p = m$

$$\begin{aligned} \text{就有 } |u_{m+1} + u_{m+2} + \cdots + u_{2m}| &= \left| \frac{1}{m+1} + \frac{1}{m+2} + \cdots + \frac{1}{2m} \right| \\ &\geq \left| \frac{1}{2m} + \frac{1}{2m} + \cdots + \frac{1}{2m} \right| = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

因此调和级数发散.

例7 运用级数收敛的柯西准则证明级数 $\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛.
证 由于

$$\begin{aligned} & \left| u_{m+1} + u_{m+2} + \cdots + u_{m+p} \right| \\ &= \frac{1}{(m+1)^2} + \frac{1}{(m+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(m+p)^2} \\ &< \frac{1}{m(m+1)} + \frac{1}{(m+1)(m+2)} + \cdots + \frac{1}{(m+p-1)(m+p)} \\ &= \left(\frac{1}{m} - \frac{1}{m+1} \right) + \left(\frac{1}{m+1} - \frac{1}{m+2} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{m+p-1} - \frac{1}{m+p} \right) \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{m} - \frac{1}{m+p} < \frac{1}{m}.$$

因此, 对任意 $\varepsilon > 0$, 可取 $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil$, 当 $m > N$ 及任意正

整数 p , 由上式可得 $\left| u_{m+1} + u_{m+2} + \cdots + u_{m+p} \right| < \frac{1}{m} < \varepsilon$,

依级数收敛的柯西准则, 知级数 $\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛.

注 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ 的收敛性已由例2的证明过程所显示.