

4.1.2 求导法则

一、四则运算求导法则

二、反函数的求导法则


三、复合函数求导法则

四、初等函数的求导问题

五、对数求导法


思路:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \quad (\text{构造性定义})$$




$$\left\{ \begin{array}{l} (C)' = 0 \\ (\sin x)' = \cos x \\ (\ln x)' = \frac{1}{x} \end{array} \right\} \text{证明中利用了两个重要极限}$$

本节内容



求导法则



其它基本初等
函数求导公式

初等函数求导问题

一、四则运算求导法则

定理1. 函数 $u = u(x)$ 及 $v = v(x)$ 都在 x 具有导数

$\implies u(x)$ 及 $v(x)$ 的和、差、积、商 (除分母为 0 的点外) 都在点 x 可导, 且

$$(1) [u(x) \pm v(x)]' = u'(x) \pm v'(x)$$

$$(2) [u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$$

$$(3) \left[\frac{u(x)}{v(x)} \right]' = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v^2(x)} \quad (v(x) \neq 0)$$

下面分三部分加以证明, 并同时给出相应的推论和例题.

$$(1) (u \pm v)' = u' \pm v'$$

证：设 $f(x) = u(x) \pm v(x)$ ，则

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[u(x+h) \pm v(x+h)] - [u(x) \pm v(x)]}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h} \pm \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x+h) - v(x)}{h} \\ &= u'(x) \pm v'(x) \end{aligned} \quad \text{故结论成立.}$$

此法则可推广到任意有限项的情形. 例如,

$$\text{例如, } (u + v - w)' = u' + v' - w'$$

$$(2) \quad (uv)' = u'v + uv'$$

证：设 $f(x) = u(x)v(x)$ ，则有

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{u(x+h) - u(x)}{h} v(x+h) + u(x) \frac{v(x+h) - v(x)}{h} \right] \\ &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \quad \text{故结论成立.} \end{aligned}$$

推论：1) $(Cu)' = Cu'$ (C 为常数)

$$2) \quad (uvw)' = u'vw + uv'w + uvw'$$

$$3) \quad (\log_a x)' = \left(\frac{\ln x}{\ln a} \right)' = \frac{1}{x \ln a}$$

例1. $y = \sqrt{x}(x^3 - 4\cos x - \sin 1)$, 求 y' 及 $y'|_{x=1}$.

$$\begin{aligned}\text{解: } y' &= (\sqrt{x})'(x^3 - 4\cos x - \sin 1) \\ &\quad + \sqrt{x}(x^3 - 4\cos x - \sin 1)' \\ &= \frac{1}{2\sqrt{x}}(x^3 - 4\cos x - \sin 1) + \sqrt{x}(3x^2 + 4\sin x) \\ y'|_{x=1} &= \frac{1}{2}(1 - 4\cos 1 - \sin 1) + (3 + 4\sin 1) \\ &= \frac{7}{2} + \frac{7}{2}\sin 1 - 2\cos 1\end{aligned}$$

$$(3) \quad \left(\frac{u}{v} \right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

证：设 $f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$ ，则有

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{u(x+h)}{v(x+h)} - \frac{u(x)}{v(x)}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{\frac{u(x+h) - u(x)}{h} v(x) - u(x) \frac{v(x+h) - v(x)}{h}}{v(x+h)v(x)} \right] \\ &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v^2(x)} \end{aligned}$$

故结论成立.

推论： $\left(\frac{C}{v} \right)' = \frac{-Cv'}{v^2}$ (C 为常数)

例2. 求证 $(\tan x)' = \sec^2 x$, $(\csc x)' = -\csc x \cot x$.

$$\begin{aligned}\text{证: } (\tan x)' &= \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' = \frac{(\sin x)' \cos x - \sin x (\cos x)'}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \sec^2 x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(\csc x)' &= \left(\frac{1}{\sin x} \right)' = \frac{-(\sin x)'}{\sin^2 x} = \frac{-\cos x}{\sin^2 x} \\ &= -\csc x \cot x\end{aligned}$$

类似可证: $(\cot x)' = -\csc^2 x$, $(\sec x)' = \sec x \tan x$.

二、反函数的求导法则

定理2. 设 $y = f(x)$ 为 $x = f^{-1}(y)$ 的反函数, $f^{-1}(y)$ 在 y 的某邻域内单调可导, 且 $[f^{-1}(y)]' \neq 0 \implies$

$$f'(x) = \frac{1}{[f^{-1}(y)]'} \quad \text{或} \quad \frac{d y}{d x} = \frac{1}{\frac{d x}{d y}}$$

证: 在 x 处给增量 $\Delta x \neq 0$, 由反函数的单调性知

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) \neq 0, \therefore \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{\frac{\Delta x}{\Delta y}}$$

且由反函数的连续性知 $\Delta x \rightarrow 0$ 时必有 $\Delta y \rightarrow 0$, 因此

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\Delta x}{\Delta y}} = \frac{1}{[f^{-1}(y)]'}$$

例3. 求反三角函数及指数函数的导数.

解: 1) 设 $y = \arcsin x$, 则 $x = \sin y$, $y \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$,

$\therefore \cos y > 0$, 则

$$\begin{aligned} (\arcsin x)' &= \frac{1}{(\sin y)'} = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 y}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \end{aligned}$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

利用

$$\arccos x = \frac{\pi}{2} - \arcsin x$$

类似可求得

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1 + x^2}, \quad (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1 + x^2}$$

2) 设 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$), 则 $x = \log_a y, y \in (0, +\infty)$

$$\therefore (a^x)' = \frac{1}{(\log_a y)'} = \frac{1}{\frac{1}{y \ln a}} = y \ln a = a^x \ln a$$

特别当 $a = e$ 时, $(e^x)' = e^x$

小结:

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

$$(a^x)' = a^x \ln a$$

$$(e^x)' = e^x$$

三、复合函数求导法则

定理3. $u = g(x)$ 在点 x 可导, $y = f(u)$ 在点 $u = g(x)$ 可导, 则 复合函数 $y = f[g(x)]$ 在点 x 可导, 且

$$\frac{dy}{dx} = f'(u)g'(x)$$

证: $\because y = f(u)$ 在点 u 可导, 故 $\lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} = f'(u)$

$$\therefore \Delta y = f'(u)\Delta u + \alpha\Delta u \quad (\text{当 } \Delta u \rightarrow 0 \text{ 时 } \alpha \rightarrow 0)$$

故有
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u)\frac{\Delta u}{\Delta x} + \alpha\frac{\Delta u}{\Delta x} \quad (\Delta x \neq 0)$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[f'(u)\frac{\Delta u}{\Delta x} + \alpha\frac{\Delta u}{\Delta x} \right] = f'(u)g'(x)$$

$$\text{复合函数 } y = f[g(x)] \quad \frac{dy}{dx} = f'(u)g'(x)$$

推广：此法则可推广到多个中间变量的情形。

例如, $y = f(u), u = \varphi(v), v = \psi(x)$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dv} \cdot \frac{dv}{dx} \quad \text{——链式法则}$$

$$= f'(u) \cdot \varphi'(v) \cdot \psi'(x)$$

y
 $|$
 u
 $|$
 v
 $|$
 x

关键：搞清复合函数结构, 由外向内逐层求导.

例4. 求下列导数: (1) $(x^\mu)'$; (2) $(x^x)'$; (3) $(\operatorname{sh} x)'$.

解: (1) $(x^\mu)' = (e^{\mu \ln x})' = e^{\mu \ln x} \cdot (\mu \ln x)' = x^\mu \cdot \frac{\mu}{x}$
 $= \mu x^{\mu-1}$

(2) $(x^x)' = (e^{x \ln x})' = e^{x \ln x} \cdot (x \ln x)' = x^x (\ln x + 1)$

(3) $(\operatorname{sh} x)' = \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)' = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \operatorname{ch} x$

说明: 类似可得

$$(\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x; \quad (\operatorname{th} x)' = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}; \quad (a^x)' = a^x \ln a.$$

$$\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}$$

$$a^x = e^{x \ln a}$$

例5. 设 $y = \ln \cos(e^x)$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解:
$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\cos(e^x)} \cdot (-\sin(e^x)) \cdot e^x$$
$$= -e^x \tan(e^x)$$

思考: 若 $f'(u)$ 存在, 如何求 $f(\ln \cos(e^x))$ 的导数?

$$\frac{df}{dx} = f'(\ln \cos(e^x)) \cdot (\ln \cos(e^x))' = \dots$$

这两个记号含义不同

$$f'(u) \Big|_{u=\ln \cos(e^x)}$$

练习: 设 $y = f(f(f(x)))$, 其中 $f(x)$ 可导, 求 y' .


例6. 设 $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$, 求 y' .

解:
$$y' = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}} \cdot \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{x^2 + 1}} \cdot 2x \right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

记 $\operatorname{arsh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$, 则
(反双曲正弦)

$$(\operatorname{arsh} x)' = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$$


$$\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

的反函数

请自行求其它反双曲函数的导数.

四、初等函数的求导问题

1. 常数和基本初等函数的导数

$$(C)' = 0$$

$$(a^x)' = a^x \ln a$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\tan x)' = \sec^2 x$$

$$(\sec x)' = \sec x \tan x$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(x^\mu)' = \mu x^{\mu-1}$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\cot x)' = -\csc^2 x$$

$$(\csc x)' = -\csc x \cot x$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

2. 有限次四则运算的求导法则

$$(u \pm v)' = u' \pm v'$$

$$(Cu)' = Cu' \quad (C \text{ 为常数})$$

$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0)$$

3. 复合函数求导法则

$$y = f(u), u = \varphi(x)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = f'(u) \cdot \varphi'(x)$$

4. 初等函数在定义区间内可导, 且导数仍为初等函数

说明: 最基本的公式

$$(C)' = 0$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

由定义证, 其它公式
用求导法则推出.

例7. $y = \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}}$, 求 y' .

解: $\because y = \frac{2x - 2\sqrt{x^2 - 1}}{2} = x - \sqrt{x^2 - 1}$

$$\therefore y' = 1 - \frac{1}{2\sqrt{x^2 - 1}} \cdot (2x) = 1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

例8. 设 $y = x^{a^a} + a^{x^a} + a^{a^x}$ ($a > 0$), 求 y' .

解: $y' = a^a x^{a^a - 1} + a^{x^a} \ln a \cdot a x^{a-1}$
 $+ a^{a^x} \ln a \cdot a^x \ln a$


例9. $y = e^{\sin x^2} \arctan \sqrt{x^2 - 1}$, 求 y' .

$$\begin{aligned} \text{解: } y' &= (e^{\sin x^2} \cdot \cos x^2 \cdot 2x) \arctan \sqrt{x^2 - 1} \\ &\quad + e^{\sin x^2} \left(\frac{1}{x^2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x^2 - 1}} \cdot 2x \right) \\ &= 2x \cos x^2 e^{\sin x^2} \arctan \sqrt{x^2 - 1} \\ &\quad + \frac{1}{x\sqrt{x^2 - 1}} e^{\sin x^2} \end{aligned}$$

关键： 搞清复合函数结构
由外向内逐层求导

例10. 设 $y = \frac{1}{2} \arctan \sqrt{1+x^2} + \frac{1}{4} \ln \frac{\sqrt{1+x^2}+1}{\sqrt{1+x^2}-1}$, 求 y' .

解:
$$y' = \frac{1}{2} \frac{1}{1+(\sqrt{1+x^2})^2} \cdot \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + \frac{1}{4} \left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}+1} \cdot \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1+x^2}-1} \cdot \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right)$$
$$= \frac{1}{2} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \left(\frac{1}{2+x^2} - \frac{1}{x^2} \right)$$
$$= \frac{-1}{(2x+x^3)\sqrt{1+x^2}}$$



五、对数求导法

1) 对幂指函数 $y = u^v$ 可用对数求导法求导：

$$\ln y = v \ln u$$

$$\frac{1}{y} y' = v' \ln u + \frac{u' v}{u}$$

$$y' = u^v \left(v' \ln u + \frac{u' v}{u} \right)$$

注意：

$$y' = \underbrace{u^v \ln u \cdot v'}_{\text{按指数函数求导公式}} + \underbrace{v u^{v-1} \cdot u'}_{\text{按幂函数求导公式}}$$

按指数函数求导公式

按幂函数求导公式

例11. 求 $y = x^{\sin x}$ ($x > 0$) 的导数.

解: 两边取对数, 化为隐式

$$\ln y = \sin x \cdot \ln x$$

↓ 两边对 x 求导

$$\frac{1}{y} y' = \cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x}$$

$$\therefore y' = x^{\sin x} \left(\cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x} \right)$$

另解: $y' = (x^{\sin x})' = (e^{\sin x \ln x})' = e^{\sin x \ln x} (\sin x \ln x)' = \dots$

2) 有些显函数用对数求导法求导很方便.

例12. $y = \left(\frac{a}{b}\right)^x \left(\frac{b}{x}\right)^a \left(\frac{x}{a}\right)^b \quad (a > 0, b > 0, \frac{a}{b} \neq 1)$



两边取对数

$$\ln y = x \ln \frac{a}{b} + a[\ln b - \ln x] + b[\ln x - \ln a]$$



两边对 x 求导

$$\frac{y'}{y} = \ln \frac{a}{b} - \frac{a}{x} + \frac{b}{x}$$

$$y' = \left(\frac{a}{b}\right)^x \left(\frac{b}{x}\right)^a \left(\frac{x}{a}\right)^b \left(\ln \frac{a}{b} - \frac{a}{x} + \frac{b}{x} \right)$$

例13. $y = \sqrt{\frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}}$

↓ 两边取对数

$$(\ln|u|)' = \frac{u'}{u}$$

$$\ln y = \frac{1}{2} [\ln|x-1| + \ln|x-2| - \ln|x-3| - \ln|x-4|]$$

↓ 对 x 求导

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-4} \right]$$

$$y' = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}} \left[\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-4} \right]$$

六、相关变化率

设 $x = x(t)$ 及 $y = y(t)$ 都可导, 而 x 与 y 之间存在某种关系 $y = f(x)$, 从而它们的变化率 $\frac{dx}{dt}$ 与 $\frac{dy}{dt}$ 之间也存在一定关系, 这样两个相互依赖的变率称为 相关变化率

相关变化率问题:

已知其中一个变化率时如何求出另一个变化率?

$$\text{方法: } y = f(x) \Rightarrow \frac{dy}{dt} = f'(x) \frac{dx}{dt}$$

例14. 已知一气球的体积以 $50\text{cm}^3 / \text{s}$ 的速度增大, 求在半径分别为 5cm 、 10cm 时, 气球半径的增大速率.

解 设气球的半径为 r , 体积为 V , 则 $V = \frac{4}{3}\pi r^3$,

$$\text{于是有 } \frac{dV}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt}, \Rightarrow \frac{dr}{dt} = \frac{1}{4\pi r^2} \frac{dV}{dt},$$

因 $\frac{dV}{dt} = 50\text{cm}^3 / \text{s}$, 故


$$\text{当 } r = 5\text{cm} \text{ 时, } \frac{dr}{dt} = \frac{1}{4\pi \times 5^2} \times 50 \approx 0.16\text{cm} / \text{s}.$$

$$\text{当 } r = 10\text{cm} \text{ 时, } \frac{dr}{dt} = \frac{1}{4\pi \times 10^2} \times 50 \approx 0.04\text{cm} / \text{s}.$$

例15. 一气球从离开观察员500米处离地面铅直上升,其速率为140米/秒.当气球高度为500米时, 观察员视线的仰角增加率是多少

解 设气球上升 t 秒后,其高度为 h ,观察员视线的仰角为 α ,则

$$\tan \alpha = \frac{h}{500}$$



上式两边对 t 求导得 $\sec^2 \alpha \cdot \frac{d\alpha}{dt} = \frac{1}{500} \cdot \frac{dh}{dt}$

$\therefore \frac{dh}{dt} = 140$ 米/秒, 当 $h = 500$ 米时, $\sec^2 \alpha = 2$

$\therefore \frac{d\alpha}{dt} = 0.14$ (弧度/分) 仰角增加率

练习：

1. 在中午十二点正甲船的 6 公里/小时的速率向东行驶，乙船在甲船之北 16 公里，以 8 公里/小时的速率向南行驶，问下午一点正两船相距的速率为多少？

2. 注水入高 8 米，上顶直径 8 米的正圆锥形容器中，其速率为每分钟 4 立方米，问：当水深为 5 米时，其表面上升的速率为多少？

内容小结

求导公式及求导法则

注意: 1) $(uv)' \neq u'v'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' \neq \frac{u'}{v'}$

2) 搞清复合函数结构, 由外向内逐层求导.

思考与练习

$$\begin{aligned} 1. \left(\frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{x}} \right)' &= \left(\left(\frac{1}{x} \right)^{\frac{3}{4}} \right)' \quad \text{对吗?} \\ &\quad \searrow \\ &= \frac{3}{4} \left(\frac{1}{x} \right)^{-\frac{1}{4}} \cdot \frac{-1}{x^2} \end{aligned}$$

2. 设 $f(x) = (x-a)\varphi(x)$, 其中 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处连续, 在求 $f'(a)$ 时, 下列做法是否正确?

$$\begin{aligned} &\text{因 } f'(x) \neq \varphi(x) + (x-a)\varphi'(x) \\ &\text{故 } f'(a) = \varphi(a) \end{aligned}$$

正确解法:

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x-a)\varphi(x)}{x-a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) = \varphi(a) \end{aligned}$$

3. 求下列函数的导数

$$(1) \ y = \left(\frac{a}{x}\right)^b, \quad (2) \ y = \left(\frac{a}{b}\right)^{-x}.$$

解: (1) $y' = b \left(\frac{a}{x}\right)^{b-1} \cdot \left(-\frac{a}{x^2}\right) = -\frac{a^b b}{x^{b+1}}$

$$(2) \ y' = \left(\frac{a}{b}\right)^{-x} \ln \frac{a}{b} \cdot (-x)' = -\left(\frac{b}{a}\right)^x \ln \frac{a}{b}$$

或 $y' = \left(\left(\frac{b}{a}\right)^x\right)' = \left(\frac{b}{a}\right)^x \ln \frac{b}{a}$

4. 设 $f(x) = x(x-1)(x-2)\cdots(x-99)$, 求 $f'(0)$.

解: 方法1 利用导数定义.

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} (x-1)(x-2)\cdots(x-99) = -99! \end{aligned}$$

方法2 利用求导公式.

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x)' \cdot [(x-1)(x-2)\cdots(x-99)] \\ &\quad + x \cdot [(x-1)(x-2)\cdots(x-99)]' \end{aligned}$$

$$\therefore f'(0) = -99!$$

5. 设 $f(x) = \begin{cases} x \cos \frac{\pi x}{2}, & x < 1, \\ ax^2 + b, & x \geq 1, \end{cases}$ 在 $x = 1$ 处可导, 求 a, b 及 $f'(x)$.

6. 求 $f'(x)$:

(1) $f(x) = \arcsin \sqrt{1 - x^2};$

(2) $f(x) = \begin{cases} x^2 e^{-x^2}, & |x| \leq 1, \\ \frac{1}{e}, & |x| > 1. \end{cases}$

思考题

1. 设 m 为正整数, 定义 $f(x) = \begin{cases} x^m \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$

(1) m 为何值时, $f(x)$ 在 $x_0 = 0$ 可导;

(2) m 为何值时, $f'(x)$ 在 $x_0 = 0$ 连续.

2. 设 $f(x)$ 是定义在 R 上的函数, 且 $\forall x, y \in R$ 都有

$$f(x+y) = e^x f(y) + e^y f(x).$$

若 $f'(0) = e$, 求 $f(x)$.

3. 设 $f(0) = 0$, $f'(0)$ 存在且有限, 令

$$x_n = f\left(\frac{1}{n^2}\right) + f\left(\frac{2}{n^2}\right) + \cdots + f\left(\frac{n}{n^2}\right) \quad (n \in N^+),$$

试求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, 并利用以上结果计算:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{i}{n^2}; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sin \frac{i}{n^2};$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right).$$

4. 证明: 不存在定义在 \mathbf{R} 上的可导函数 $f(x)$,

$$\text{满足 } f(f(x)) = -x^3 + x^2 + 1.$$