

**Quadro 9. Características gerais das meningites meningocócicas**

|                             |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agente etiológico</b>    | Bactéria <i>Neisseria meningitidis</i> com sorogrupos do tipo A, B, C e D, Y, W-135, 29-E e sorotipos.                                                                   |
| <b>Reservatório</b>         | O homem                                                                                                                                                                  |
| <b>Modo de transmissão</b>  | Direta – pelas secreções nasofaríngeas.                                                                                                                                  |
| <b>Período de incubação</b> | Em média, três a quatro dias, podendo variar de dois a dez dias.                                                                                                         |
| <b>Transmissibilidade</b>   | Perdura até o desaparecimento do meningococo das secreções nasofaríngeas, geralmente 24 horas após o início do tratamento.                                               |
| <b>Suscetibilidade</b>      | Universal, porém baixa                                                                                                                                                   |
| <b>Imunidade</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pela doença;</li> <li>• As vacinas não conjugadas contra a meningite conferem imunidade relativa e de curta duração.</li> </ul> |

**Quadro 9.1. Vacina contra a meningite meningocócica C**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de vacina em uso no Brasil | Oligossacarídeo Meningocócico C conjugado com a proteína CRM-197 de <i>Corynebactérium diphteriae</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                               |
| Número de doses                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Para o menor de 1 ano, duas doses com um reforço aos 12 meses;</li><li>• Criança entre 10 e 11 meses não vacinadas deverão receber apenas uma dose da vacina e uma dose de reforço aos 12 ou 15 meses;</li><li>• Criança entre 1 ano a menor de 5 anos de idade não vacinada deverá receber apenas uma dose desta vacina;</li><li>• O intervalo mínimo entre as doses é 30 dias e entre a segunda dose e o reforço é de 60 dias.</li></ul> |             |                                                                                                                                                               |
| Idade recomendada               | <ul style="list-style-type: none"><li>• A partir dos 2 meses. No Brasil, na vacina de rotina, no terceiro e quinto mês, podendo ser aplicada até 4 anos 11 meses e 29 dias. Crianças que recebem uma dose a partir de 1 ano não necessitam de mais doses ou reforços.</li></ul>                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                               |
| Conservação                     | Nível                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Temperatura | Tempo de duração                                                                                                                                              |
|                                 | Central                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +2°C a +8°C | Depende do laboratório produtor: observar o prazo de validade do produto; utilizar imediatamente após a reconstituição ou de acordo com a bula do fabricante. |
|                                 | Regional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +2°C a +8°C |                                                                                                                                                               |
|                                 | Local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +2°C a +8°C |                                                                                                                                                               |
| Via de administração            | Intramuscular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                               |
| Volume da dose                  | 0,5ml (ou conforme laboratório produtor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                               |