

Quadro 9.2. Vacina contra a meningite meningocócica ACWY

Tipo de vacina em uso no Brasil	<i>Oligossacarídeo meningocócico A...10 mcg Conj. com proteína CRM197 de Corynebacterium diphtheriae...6,7 a 33,3 mcg; Oligossacarídeo meningocócico C...5 mcg Conj. com proteína CRM197 de Corynebacterium diphtheriae...7,1 a 12,5 mcg; Oligossacarídeo meningocócico W-135...5 mcg Conj. com proteína CRM197 de Corynebacterium diphtheriae...3,3 a 8,3mcg; Oligossacarídeo meningocócico Y...5 mcg Conj. com proteína CRM197 de Corynebacterium diphtheriae...5,6 a 10 mcg;</i>	
Número de doses	Administrar 1 (um) reforço ou 1 (uma) dose, conforme situação vacinal.	
Idade recomendada	Adolescentes de 11 a 14 anos, independentemente de ter recebido anteriormente a vacina MenC (conjugada) ou dose de reforço.	
Conservação	Nível da temperatura	Tempo de duração
	Central +2°C a +8°C	Até a validade do produto. Utilizar imediatamente ou conforme orientação do laboratório.
	Regional +2°C a +8°C	
	Local +2°C a +8°C	
Via de administração	Intramuscular	
Volume da dose	0,5ml (ou conforme laboratório produtor)	
Duração da imunidade	Prolongada sempre que a vacina for conjugada.	
Indicações	Na rotina para adolescentes de 11 a 14 anos.	
Contraindicações	Contraindicada para pacientes com hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da vacina, incluindo o toxóide diftérico.	

Quadro 10. Características gerais da febre amarela

Agente etiológico	Vírus da febre amarela
Reservatório	O homem, os primatas e o mosquito transmissor.
Modo de transmissão	Picada do mosquito transmissor infectado.
Período de incubação	Três a seis dias, em média.
Transmissibilidade	De um a dois dias antes do início dos sintomas e durante os três a cinco primeiros dias da doença.
Suscetibilidade	Geral
Imunidade	• Pela doença; • Pela vacina; • Por anticorpos maternos, até o 6º mês de idade.