

Indicações	• Em campanha consultar o informe técnico; • Nos CRIsEs – cardiopatas, pneumopatas, hepatopatas, imunodeprimidos, imunodeficiências congênitas, doadores de órgãos sólidos e medula óssea, transplantados de órgãos sólidos e medula, diabetes mellitus, fibrose cística, trissomias, implante de cóclea, doença neurológica crônica incapacitante, usuário crônico de ácido acetilsalicílico, nefropatia crônica/síndrome nefrótica, asma, asplenia anatômica ou funcional, profissionais da saúde, comunicantes domiciliares de imunodeprimidos, profissionais que trabalham diretamente com estes pacientes e com idosos de 60 anos ou mais.
Contraindicações	• Reação anafilática à ingestão de ovo; • Reação grave na dose anterior; • Síndrome de Guillain-Barré.
Eventos adversos	• Locais: dor, hiperemia, edema • Sistêmicos: cefaleia, mal-estar, febre, mialgia e raramente anafilaxia e síndrome de Guillain-Barré.

*Para os primovacinados: apenas uma dose anual é suficiente nas vacinações subsequentes.

**Atentar para as indicações do laboratório produtor.

Quadro 15. Características gerais da COVID-19

Agente etiológico	Sars-cov-2
Reservatório	O homem
Modo de transmissão	Transmissão por gotículas respiratórias ou contato com objetos e superfícies contaminadas.
Período de incubação	Geralmente um a três dias antes do início dos sintomas.
Transmissibilidade	Em média, de um a sete dias após o início dos sintomas. A transmissão pode ocorrer mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas.
Suscetibilidade	Universal
Imunidade	Pela vacina