

Quadro 15.1. Vacina Dengue

Tipo de vacina	sorotipos 1, 2, 3 e 4 do vírus da dengue (atenuada)		
Nº de doses	Duas doses		
Idade recomendada	10 anos a 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade		
Conservação	Nível	Temperatura	Tempo de duração
	Regional	+2°C e +8°C	VALIDADE APÓS ABERTURA DO FRASCO: Sob refrigeração entre +2°C a +8°C por 2 horas.
	Municipal	+2°C e +8°C	
Via de administração	Subcutânea		
Dose (volume)	0,5ml		
Eficácia esperada	reduzir 80,2% de casos de dengue sintomática e 90,4% de hospitalizações, sendo bem tolerada e sem apresentar qualquer risco de segurança importante ou exacerbação de doença.		
Esquema vacinal/intervalos	2 (duas) doses, com intervalo de 3 (três) meses entre as doses.		
Indicações	crianças e adolescentes de 10 anos a 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade.		
Contraindicações	Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer excipiente listado na seção composição ou hipersensibilidade à uma dose anterior de vacina dengue (atenuada); • Indivíduos com imunodeficiência congênita ou adquirida, incluindo aqueles recebendo terapias imunossupressoras tais como quimioterapia ou altas doses de corticosteroides sistêmicos dentro de quatro semanas anteriores à vacinação, assim como ocorre com outras vacinas vivas atenuadas; • Indivíduos com infecção por HIV sintomática ou infecção por HIV assintomática quando acompanhada por evidência de função imunológica comprometida; • Mulheres grávidas ou em período de amamentação.		
Eventos adversos	Locais: Dor no local da injeção foi o evento mais comum, seguido por vermelhidão e edema. Sistêmicos: cefaléia foi o evento mais comum, seguido por mialgia, fadiga e astenia.		