

**Quadro 5.1. Vacina contra o tétano, a difteria, a coqueluche – DTP (tríplice bacteriana).
Vacina contra tétano e difteria dT (dupla adulto).**

Tipo de vacina	- DTP – toxoide diftérico + toxoide tetânico + bactéria da coqueluche; - dT – toxoide diftérico + tetânico (tipo adulto).	
Número de doses e intervalos entre as doses	- DTP: duas doses de reforço, uma aos 15 meses e outra aos 4 anos. O intervalo entre a terceira dose (com penta) e o reforço com DTP e entre as duas doses de reforço com DTP é no mínimo de 06 meses. Manter reforços de 10 em 10 anos com a vacina (dT) dupla adulto; - dT: A partir dos 7 anos de idade, para aqueles indivíduos ainda não vacinados ou com esquema incompleto. São adotados dois esquemas no Brasil: - três doses com intervalo de 60 dias (mínimo de 30 dias). - Gestantes: devem ser vacinadas contra o tétano como estratégia de eliminação do tétano neonatal; nestes casos o esquema deve ser iniciado, terminado ou complementado com uma dose da vacina dTpa; - No caso de ferimentos graves, o reforço deverá ser antecipado para 05 anos; - Criança com 6 anos sem nenhuma dose de reforço, administrar o 1º reforço. Na impossibilidade de manter o intervalo de 6 meses entre as doses de reforço, agendar dT para 10 anos após esse primeiro reforço. Neste caso, essas crianças ficam liberadas do segundo reforço da DTP.	
Idade recomendada	- DTP: reforço aos 15 meses e 4 anos. Pode ser utilizada até 6 anos, 11 meses e 29 dias; - A partir de sete anos: usar a dupla adulto (dT).	
Conservação	Nível	Temperatura
	Central	+2°C a +8°C
	Regional	+2°C a +8°C
	Local	+2°C a +8°C
		Tempo de duração
		Observar o prazo de validade e conservação do produto;
		Prazo de validade após frasco aberto: Até 15 dias: Lab. Butantan Até 04 semanas: Serum Institute of India ou Biofarma ou a depender do laboratório produtor.
Via de administração	Intramuscular profunda	
Dose	0,5ml (ou de acordo com o laboratório produtor)	
Eficácia esperada	Difteria: 80 a 90% (após 3ª dose); Coqueluche: em torno de 75 a 80% (após 3ª dose); Tétano: aproximadamente 100% (após 3ª dose).	
Duração de imunidade	- Coqueluche e difteria – alguns anos; - Tétano – acima de 10 anos.	

Contraindicações	- Indivíduos com doença neurológica em atividade. - Indivíduos que tenham apresentado os seguintes sintomas ou patologias após a(s) aplicação(ões) de dose(s) anterior(es): - Convulsão nas primeiras 72 horas; - Encefalopatia nos primeiros sete dias; - Episódio hipotônico-hiporresponsivo; - Neuropatia periférica; - Reação de Arthus; - Síndrome de Guillain-Barré; - Anafilaxia (choque anafilático). Notas: Nas situações acima (itens a, b, c), em face da contraindicação para o uso da vacina tríplice (DTP), utilizar a vacina dupla tipo infantil (DT) ou DTP acelular.
Eventos adversos	Leves: dor, vermelhidão e enduração locais, febre, mal-estar geral e irritabilidade nas primeiras 24 ou 48 horas; Graves: convulsão e episódio hipotônico-hiporresponsivo, anafilaxia e encefalopatias.

Quadro 5.2. Vacina contra o tétano, a difteria e a coqueluche acelular tipo adulto - dTp acelular (uso adulto e infantil a partir de 4 anos)

Tipo de vacina	- Vacina inativada composta por toxoides diftérico, tetânico e pertussis; - Adsorvida em hidróxido e fosfato de alumínio; - Forma de apresentação: suspensão em frasco, seringa monodose com 0,5ml.
Indicação	- A vacina é indicada para as gestantes, a cada gestação, a partir da vigésima semana (20ª). Importante vacinar o mais precocemente possível, dentro da indicação do período de gestação, pelo risco de intercorrências, por exemplo, do parto prematuro. - A vacina é indicada para profissionais de saúde e parteiras tradicionais. Observação: Segundo o Ministério da Saúde parteira tradicional é aquela que presta assistência ao parto domiciliar baseada em saberes e práticas tradicionais e é reconhecida pela comunidade como parteira. - Administrar uma dose de dTpa para todos os profissionais de saúde, considerando o histórico vacinal de difteria e tétano. - Em casos de gestantes que não receberam a vacina durante a gestação, a dTpa pode ser feita até 45 dias de puerpério.
Número e intervalo entre as doses	Para gestante: O esquema recomendado da vacina tipo adulto-dTpa é uma dose a cada gestação; A depender da situação vacinal encontrada, administrar uma dose da vacina dTpa para iniciar esquema vacinal, completar ou como dose de reforço. Para profissionais de saúde: administração de uma dose de dTpa e reforço a cada dez anos com dTpa (em detrimento da dT) caso continue na mesma função no trabalho.