

Contraindicações	- Indivíduos com doença neurológica em atividade. - Indivíduos que tenham apresentado os seguintes sintomas ou patologias após a(s) aplicação(ões) de dose(s) anterior(es): - Convulsão nas primeiras 72 horas; - Encefalopatia nos primeiros sete dias; - Episódio hipotônico-hiporresponsivo; - Neuropatia periférica; - Reação de Arthus; - Síndrome de Guillain-Barré; - Anafilaxia (choque anafilático). Notas: Nas situações acima (itens a, b, c), em face da contraindicação para o uso da vacina tríplice (DTP), utilizar a vacina dupla tipo infantil (DT) ou DTP acelular.
Eventos adversos	Leves: dor, vermelhidão e enduração locais, febre, mal-estar geral e irritabilidade nas primeiras 24 ou 48 horas; Graves: convulsão e episódio hipotônico-hiporresponsivo, anafilaxia e encefalopatias.

Quadro 5.2. Vacina contra o tétano, a difteria e a coqueluche acelular tipo adulto - dTp acelular (uso adulto e infantil a partir de 4 anos)

Tipo de vacina	- Vacina inativada composta por toxoides diftérico, tetânico e pertussis; - Adsorvida em hidróxido e fosfato de alumínio; - Forma de apresentação: suspensão em frasco, seringa monodose com 0,5ml.
Indicação	- A vacina é indicada para as gestantes, a cada gestação, a partir da vigésima semana (20ª). Importante vacinar o mais precocemente possível, dentro da indicação do período de gestação, pelo risco de intercorrências, por exemplo, do parto prematuro. - A vacina é indicada para profissionais de saúde e parteiras tradicionais. Observação: Segundo o Ministério da Saúde parteira tradicional é aquela que presta assistência ao parto domiciliar baseada em saberes e práticas tradicionais e é reconhecida pela comunidade como parteira. - Administrar uma dose de dTpa para todos os profissionais de saúde, considerando o histórico vacinal de difteria e tétano. - Em casos de gestantes que não receberam a vacina durante a gestação, a dTpa pode ser feita até 45 dias de puerpério.
Número e intervalo entre as doses	Para gestante: O esquema recomendado da vacina tipo adulto-dTpa é uma dose a cada gestação; A depender da situação vacinal encontrada, administrar uma dose da vacina dTpa para iniciar esquema vacinal, completar ou como dose de reforço. Para profissionais de saúde: administração de uma dose de dTpa e reforço a cada dez anos com dTpa (em detrimento da dT) caso continue na mesma função no trabalho.

Conservação	Nível	Temperatura	Tempo de duração
	Central	+2°C a +8°C	Observar o prazo de validade e conservação do produto; após a abertura do frasco utilizar o conteúdo imediatamente.
	Regional	+2°C a +8°C	
	Local	+2°C a +8°C	
Via de administração	Intramuscular profunda na região ventroglútea ou deltoide		
Dose	0,5ml (ou de acordo com o laboratório produtor)		
Eficácia esperada	A efetividade da vacina na prevenção da doença em lactentes até os três meses de idade foi estimada em 91%, quando a vacina é aplicada até 28 dias antes do parto. Posteriormente, a proteção conferida pela mãe é progressivamente menor, sendo de 38% se a vacina é aplicada na última semana de gravidez. Após a administração de dTpa, é necessário um mínimo de duas semanas para gerar uma resposta imune máxima para os antígenos da vacina.		
Contraindicações	Anafilaxia e eventos neurológicos subsequentes à administração de dT e dTpa e a seus componentes.		
Eventos adversos	• Locais: dor, hiperemia e enduração • Sistêmicos: febre > ou = a 40°C, convulsão febril, episódio hipotônico-hiporresponsivo (raro).		

Quadro 5.3. Vacina contra o tétano, a difteria, a coqueluche, o *haemophilus influenzae* tipo b, hepatite B, vacina pentavalente

Tipo de vacina	DTP +Hib +HB– toxoide diftérico + toxoide tetânico + bactéria da coqueluche + proteína da cápsula do <i>Haemophilus influenzae b</i> (PRP) + vírus inativado (engenharia genética) da hepatite B
Número de doses e intervalos entre as doses	Três doses: aos 2, 4 e 6 meses, com o intervalo de 60 dias entre as doses (intervalo mínimo de 30 dias)
Idade recomendada	• 2 meses, 4 meses, 6 meses, podendo ser utilizada, quando necessário, até 6 anos, 11 meses e 29 dias (idade em que as crianças ainda podem receber a DTP de célula inteira) • A partir de sete anos: usar a dupla adulto (dT)