

Quadro 12. Características gerais da hepatite A

Agente etiológico	Vírus da hepatite A (VHA), vírus RNA, família Picornaviridae
Reservatório	O homem
Modo de transmissão	Transmissão fecal oral
Período de incubação	De 15 a 45 dias (média de 30 dias)
Transmissibilidade	Transmite desde duas semanas antes do início dos sintomas até o final da segunda semana da doença.
Suscetibilidade	Universal. São suscetíveis todos os indivíduos sorologicamente negativos ao anti-HAV IgG.
Imunidade	A imunidade é duradoura e específica, podendo ser adquirida pela infecção com o vírus (doença) ou pela vacina, sendo indistinguíveis ao perfil sorológico.

Quadro 12.1. Vacina contra hepatite A (inativada e adsorvida)

Tipo de vacina	Vacina de vírus inativado, adsorvida, purificada, injetável, apresentação em frasco unidose de 25U/0,5ml para uso em crianças.		
Número de doses	Dose única para crianças de 15 meses.		
Idade recomendada	A partir dos 15 meses, podendo ser aplicada na rede pública até a idade de 4 anos, 11 meses e 29 dias.		
Conservação	Nível	Temperatura	Tempo de duração
	Central	+2°C a +8°C	Observar o prazo de validade do produto: utilizar imediatamente após a abertura do frasco.
	Regional	+2°C a +8°C	
	Local	+2°C a +8°C	
Via de administração	Intramuscular. Precaução: excepcionalmente, pode ser utilizada pela via subcutânea (SC) em pessoas com coagulopatias.		
Dose (volume)	0,5ml		
Eficácia esperada	Superior a 99%		
Duração da imunidade	Prolongada		
Indicação	Para todas as crianças a partir de 12 meses. A vacina pode ser indicada para outras faixas etárias segundo critérios do CRIE.		

Contraindicações	- As contraindicações de carácter gerais; - Hipersensibilidade conhecida a qualquer componente da vacina.
Eventos adversos	Locais: dor, vermelhidão e edema no local da aplicação; Sistêmicos: fraqueza, cansaço, febre, diarreia, dor abdominal, náusea, vômito, dor de garganta, resfriado, cefaleia, dor muscular.

Quadro 13. Características gerais da varicela

Agente etiológico	Vírus Varicela-Zóster
Reservatório	O homem
Modo de transmissão	- Pessoa a pessoa através do contato direto e de secreções respiratórias; - Indiretamente através de objetos contaminados.
Período de Incubação	De 14 a 16 dias; podendo variar de 10 a 20 dias.
Transmissibilidade	- Um a dois dias antes da erupção, até cinco dias após o surgimento do primeiro grupo de vesículas; - Enquanto houver vesículas a infecção é possível.
Suscetibilidade	Universal
Imunidade	- Pela infecção natural ou doença; - Pela vacina.

Quadro 13.1. Vacina contra o sarampo, a caxumba, a rubéola e a varicela, tetra viral

Tipo de vacina	Vírus atenuado		
Número de doses	Dose única para crianças de 15 meses previamente vacinadas com uma dose da vacina tríplice viral (VTV).		
Idade recomendada	A partir dos 15 meses, podendo ser aplicada na rede pública até 4 anos, 11 meses e 29 dias.		
Conservação	Nível	Temperatura	Tempo de duração
	Central	+2°C a +8°C	Observar o prazo de validade do produto: utilizar imediatamente após a diluição.
	Regional	+2°C a +8°C	
	Local	+2°C a +8°C	
Via de administração	Subcutânea na região posterior do deltoide esquerdo.		
Dose (volume)	0,5ml		

Eficácia esperada	Superior a 95%
Duração da imunidade	Prolongada
Indicações	A partir de 15 meses
Contraindicações	As contraindicações de caráter geral: - Hipersensibilidade conhecida à neomicina ou qualquer outro componente da vacina; - Hipersensibilidade após administração das vacinas: sarampo, caxumba, rubéola e/ou varicela; - Imunodeficiências primárias ou secundárias.
Eventos adversos	Locais: dor, vermelhidão, vesículas no local da aplicação; Sistêmicos: febre, exantema, convulsão febril, anafilaxia, meningite, herpes zoster grave, encefalite, ataxia, eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, pneumonia, trombocitopenia e síndrome de Guillain-Barré.

Quadro 13.2. Vacina contra a varicela

Tipo de vacina	Vírus atenuado		
Número de doses	Segunda dose: para crianças de 4 anos previamente vacinadas com uma dose de tetraviral ou VTV+varicela.		
Idade recomendada	Aos 4 anos, podendo ser aplicada na rede pública até 6 anos, 11 meses e 29 dias.		
Conservação	Nível	Temperatura	Tempo de duração
	Central	+2°C a +8°C	Observar o prazo de validade do produto. Utilizar imediatamente após a diluição.
	Regional	+2°C a +8°C	
	Local	+2°C a +8°C	
Via de administração	Subcutânea na região posterior do deltoide esquerdo.		
Dose (volume)	0,5ml		
Eficácia esperada	Superior a 90%		
Duração da imunidade	Prolongada		
Indicações	A partir de 15 meses, profissional de saúde e indígenas.		