

Quadro 16. Características gerais do HPV

Agente etiológico	Papilomavírus humano (DNA vírus)
Reservatório	O homem
Modo de transmissão	Doença altamente contagiosa de transmissão direta, através do contato sexual, ou indireta, através de fômites.
Período de incubação	É muito variável, de meses a anos.
Transmissibilidade	• Não ocorre através do sangue, pois o vírus não faz viremia ou do ejaculado, exceto na presença de um condiloma uretral; • Ocorre na presença de microtraumatismos na superfície da pele ou mucosas (preferencialmente na JEC, junção escamo colunar da mucosa genital), geralmente não perceptíveis, e penetrando até as células germinativas basais; • Ocorre transmissão enquanto houver vírus na mucosa (camada basal).
Suscetibilidade	Universal
Imunidade	A imunidade pode ser adquirida pela doença ou vacinação (pré e pós-exposição). A produção de anticorpos neutralizantes na infecção natural é inferior à produção de anticorpos pela vacinação e apenas cerca de 52% a 68% das pacientes irão formar anticorpos pela infecção natural.

Quadro 16.1. Vacina recombinante contra o HPV (6,11,16,18)

Tipo de vacina	Vírus inativado de cultivo celular		
Número de doses e intervalo entre as doses	Na rotina: Meninos e meninas: 09 a 14 anos. Uma (1) dose. No CRIE: Meninas e mulheres, meninos e homens, de 9 a 45 anos de idade, vivendo com HIV/Aids, transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea, pacientes oncológicos e vítimas de violência sexual. Administrar 3 (três) doses da vacina com intervalo de 2 (dois) meses entre a primeira e segunda dose e 6 (seis) meses entre a primeira e terceira dose (0, 2 e 6 meses). Para a vacinação deste grupo, mantém-se a necessidade de prescrição médica.		
Conservação	Nível	Temperatura	Tempo de duração
	Central	+2°C a +8°C	Observar o prazo de validade do produto: usar imediatamente após a reconstituição.
	Regional	+2°C a +8°C	
	Local	+2°C a +8°C	
Via de administração	Intramuscular, preferencialmente na região ventroglútea (Hochstetter) ou deltoide em segunda opção.		
Dose (volume)	0,5 ml (ou conforme laboratório produtor)		
Eficácia esperada	86% para as lesões de alto grau.		
Indicações	- Meninas e meninos de 9 a 14 anos na rotina e para indivíduos de 9 a 45 anos em alguma das seguintes situações: imunodeprimido por HIV/ Aids, imunodeprimido oncológico ou por tratamento quimioterápico, imunodeprimido que irá se submeter ou tenha se submetido a transplante de órgão sólido ou medula. - Vítimas de violência sexual.		
Contraindicações	- Hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula; - Gestantes: no caso de vacinar inadvertidamente uma gestante, interromper a vacinação e voltar a vacinar com a dose faltante após o parto.		
Eventos adversos	Locais: dor, eritema e edema no local da aplicação; Sistêmicos: cefaleia, fadiga, mal estar, náusea ou vômito, febre de 38 graus ou mais, síncope (desmaio) e reações de hipersensibilidade.		