

Quadro 14. Características gerais da influenza

Agente etiológico	Vírus da <i>Influenza</i> Tipo A, B e C – família <i>Orthomyxovirus</i>
Reservatório	O homem: suspeita-se que os animais sejam fonte de novos subtipos do vírus.
Modo de transmissão	Transmissão direta – aérea.
Período de incubação	Em média, de um a cinco dias.
Transmissibilidade	Em média, de três a sete dias, iniciando-se com os sintomas clínicos.
Suscetibilidade	Universal
Imunidade	• Pela doença; • Pela vacina: imunidade contra os vírus utilizados na vacina e reforço contra as cepas afins que tenham produzido infecção anterior.

Quadro 14.1. Vacina contra a influenza

Tipo de vacina	Vírus <i>Influenza</i> (três cepas do Mixovírus) inativados, fracionados e purificados.		
Número de doses**	- Crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias: duas* doses de 0,25ml com intervalo de quatro a seis semanas; - Crianças de 3 anos a 8 anos, 11 meses e 29 dias: duas* doses de 0,5ml com intervalo de quatro a seis semanas; ≥ 9 anos e adultos: 1 dose de 0,5ml.		
Idade recomendada**	A partir de seis meses, dependendo do laboratório produtor.		
Conservação	Nível	Temperatura	Tempo de duração
	Central	+2°C a +8°C	Até a validade do frasco. Depois de aberto, utilizar por 7 dias ou conforme orientação do laboratório produtor.
	Regional	+2°C a +8°C	
	Local	+2°C a +8°C	
Via de administração	Intramuscular e Subcutânea profunda.		
Dose (volume)	0,5 e 0,25ml, dependendo da idade do cliente e laboratório produtor.		
Eficácia	70% a 90% de proteção contra a doença e 90% de proteção contra a morte.		
Duração da imunidade	A partir de 20 dias após a vacinação; começa a declinar a partir de quatro meses.		

Indicações	• Em campanha consultar o informe técnico; • Nos CRIsEs – cardiopatas, pneumopatas, hepatopatas, imunodeprimidos, imunodeficiências congênitas, doadores de órgãos sólidos e medula óssea, transplantados de órgãos sólidos e medula, diabetes mellitus, fibrose cística, trissomias, implante de cóclea, doença neurológica crônica incapacitante, usuário crônico de ácido acetilsalicílico, nefropatia crônica/síndrome nefrótica, asma, asplenia anatômica ou funcional, profissionais da saúde, comunicantes domiciliares de imunodeprimidos, profissionais que trabalham diretamente com estes pacientes e com idosos de 60 anos ou mais.
Contraindicações	• Reação anafilática à ingestão de ovo; • Reação grave na dose anterior; • Síndrome de Guillain-Barré.
Eventos adversos	• Locais: dor, hiperemia, edema • Sistêmicos: cefaleia, mal-estar, febre, mialgia e raramente anafilaxia e síndrome de Guillain-Barré.

*Para os primovacinados: apenas uma dose anual é suficiente nas vacinações subsequentes.

**Atentar para as indicações do laboratório produtor.

Quadro 15. Características gerais da COVID-19

Agente etiológico	Sars-cov-2
Reservatório	O homem
Modo de transmissão	Transmissão por gotículas respiratórias ou contato com objetos e superfícies contaminadas.
Período de incubação	Geralmente um a três dias antes do início dos sintomas.
Transmissibilidade	Em média, de um a sete dias após o início dos sintomas. A transmissão pode ocorrer mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas.
Suscetibilidade	Universal
Imunidade	Pela vacina