

Quadro 9. Características gerais das meningites meningocócicas

Agente etiológico	Bactéria <i>Neisseria meningitidis</i> com sorogrupos do tipo A, B, C e D, Y, W-135, 29-E e sorotipos.
Reservatório	O homem
Modo de transmissão	Direta – pelas secreções nasofaríngeas.
Período de incubação	Em média, três a quatro dias, podendo variar de dois a dez dias.
Transmissibilidade	Perdura até o desaparecimento do meningococo das secreções nasofaríngeas, geralmente 24 horas após o início do tratamento.
Suscetibilidade	Universal, porém baixa
Imunidade	• Pela doença; • As vacinas não conjugadas contra a meningite conferem imunidade relativa e de curta duração.

Quadro 9.1. Vacina contra a meningite meningocócica C

Tipo de vacina em uso no Brasil	Oligossacarídeo Meningocócico C conjugado com a proteína CRM-197 de <i>Corynebactérium diphteriae</i> .		
Número de doses	• Para o menor de 1 ano, duas doses com um reforço aos 12 meses; • Criança entre 10 e 11 meses não vacinadas deverão receber apenas uma dose da vacina e uma dose de reforço aos 12 ou 15 meses; • Criança entre 1 ano a menor de 5 anos de idade não vacinada deverá receber apenas uma dose desta vacina; • O intervalo mínimo entre as doses é 30 dias e entre a segunda dose e o reforço é de 60 dias.		
Idade recomendada	• A partir dos 2 meses. No Brasil, na vacina de rotina, no terceiro e quinto mês, podendo ser aplicada até 4 anos 11 meses e 29 dias. Crianças que recebem uma dose a partir de 1 ano não necessitam de mais doses ou reforços.		
Conservação	Nível	Temperatura	Tempo de duração
	Central	+2°C a +8°C	Depende do laboratório produtor: observar o prazo de validade do produto; utilizar imediatamente após a reconstituição ou de acordo com a bula do fabricante.
	Regional	+2°C a +8°C	
	Local	+2°C a +8°C	
Via de administração	Intramuscular		
Volume da dose	0,5ml (ou conforme laboratório produtor)		

Duração da imunidade	Prolongada sempre que a vacina for conjugada.
Indicações	Para crianças de 2 meses até 4 anos 11 meses e 29 dias.
Contraindicações	Reação alérgica a qualquer um dos componentes da vacina e nas situações de adiamento da vacinação.
Eventos adversos	• Locais: rubor, edema, endurecimento e hipersensibilidade/dor. • Sistêmicos • Crianças pequenas: febre, choro, irritabilidade, sonolência ou comprometimento do sono, anorexia, diarreia e vômitos; • Adultos: vertigem, febre, cefaleia, náuseas e vômitos, desmaios, mialgia e artralgia. • Raros • Distúrbios gastrointestinais (vômitos, náusea e diarreia); • Distúrbios da pele e do tecido subcutâneo (erupções cutâneas, urticária, prurido, púrpura, eritema multiforme e síndrome de Steven-Johnson); • Distúrbios musculoesqueléticos, do tecido conjuntivo e ossos (mialgia e artralgia); • Reações de hipersensibilidade grave incluindo anafilaxia, broncoespasmo, edema facial e angioedema, podendo ocorrer, em proporção inferior, uma pessoa em cada dez mil que recebem esta vacina. • Muito Raros • Distúrbios do sistema nervoso: vertigens, convulsões incluindo convulsões febris, desmaios, hipoestésias e parestesias, hipotonia; • Distúrbios visuais e fotofobias, geralmente associados com outros sinais e sintomas neurológicos como cefaleia e vertigem; • Convulsões.