

Conservação	Nível	Temperatura	Tempo de duração
	Central	+2°C a +8°C	Observar o prazo de validade e conservação do produto; após a abertura do frasco utilizar o conteúdo imediatamente.
	Regional	+2°C a +8°C	
	Local	+2°C a +8°C	
Via de administração	Intramuscular profunda na região ventroglútea ou deltoide		
Dose	0,5ml (ou de acordo com o laboratório produtor)		
Eficácia esperada	A efetividade da vacina na prevenção da doença em lactentes até os três meses de idade foi estimada em 91%, quando a vacina é aplicada até 28 dias antes do parto. Posteriormente, a proteção conferida pela mãe é progressivamente menor, sendo de 38% se a vacina é aplicada na última semana de gravidez. Após a administração de dTpa, é necessário um mínimo de duas semanas para gerar uma resposta imune máxima para os antígenos da vacina.		
Contraindicações	Anafilaxia e eventos neurológicos subsequentes à administração de dT e dTpa e a seus componentes.		
Eventos adversos	• Locais: dor, hiperemia e enduração • Sistêmicos: febre > ou = a 40°C, convulsão febril, episódio hipotônico-hiporresponsivo (raro).		

Quadro 5.3. Vacina contra o tétano, a difteria, a coqueluche, o *haemophilus influenzae* tipo b, hepatite B, vacina pentavalente

Tipo de vacina	DTP +Hib +HB– toxoide diftérico + toxoide tetânico + bactéria da coqueluche + proteína da cápsula do <i>Haemophilus influenzae b</i> (PRP) + vírus inativado (engenharia genética) da hepatite B
Número de doses e intervalos entre as doses	Três doses: aos 2, 4 e 6 meses, com o intervalo de 60 dias entre as doses (intervalo mínimo de 30 dias)
Idade recomendada	• 2 meses, 4 meses, 6 meses, podendo ser utilizada, quando necessário, até 6 anos, 11 meses e 29 dias (idade em que as crianças ainda podem receber a DTP de célula inteira) • A partir de sete anos: usar a dupla adulto (dT)

Conservação	Nível	Temperatura	Tempo de duração
	Central	+2°C a +8°C	Observar o prazo de validade e conservação do produto; após a abertura do frasco utilizar o conteúdo imediatamente (frasco unidose) ou conforme orientação do laboratório produtor.
	Regional	+2°C a +8°C	
	Local	+2°C a +8°C	
Via de administração	Intramuscular profunda		
Dose	0,5ml (de acordo com o laboratório produtor)		
Eficácia esperada	• Difteria: 80 a 90% (após 3ª dose) • Coqueluche: em torno de 75 a 80% (após 3ª dose) • Tétano: aproximadamente 100% (após 3ª dose) • <i>Haemophilus</i>: em torno de 95% (após 3ª dose) • Hepatite B: em torno de 95% (após 3ª dose)		
Duração de imunidade	• Coqueluche e difteria: alguns anos • Tétano: acima de 10 anos • <i>Haemophilus</i>: vários anos • Hepatite B: vários anos		
Contraindicações	Crianças com doença neurológica em atividade Crianças que tenham apresentado após a(s) aplicação(ões) de dose(s) anterior(es): a) convulsão nas primeiras 72 horas; b) encefalopatia nos primeiros sete dias; c) episódio hipotônico-hiporresponsivo; d) anafilaxia. Notas: Nas situações acima (itens a, b, c), em face da contraindicação para o uso da vacina tríplice (DTP), utilizar a vacina dupla tipo infantil (DT) ou DTP acelular e dar continuidade aos esquemas com a vacina Hib e HB unidose.		
Eventos adversos	• Leves: dor, vermelhidão e enduração locais, febre, mal-estar geral e irritabilidade nas primeiras 24 ou 48 horas; • Graves: convulsão e episódio hipotônico-hiporresponsivo, anafilaxia e encefalopatias.		