

PRAZO DE UTILIZAÇÃO DAS VACINAS APÓS ABERTURA DO FRASCO



GOVERNO DE
SANTA CATARINA
SECRETARIA DA SAÚDE

Vacina	Apresent. em doses	Laboratórios	Prazo de utilização, após abertura do frasco, segundo a bula do produtor
Vacina adsorvida difteria e tétano - dT Dupla tipo adulto (dT)	Multidose	Fundação Butantan	Depois de aberto o frasco-ampola de múltiplas doses, pode ser utilizado em até 15 dias se mantido em condições assépticas e sob temperatura entre +2°C a + 8°C.
		Intervax e Biological	Depois de aberto o frasco-ampola de múltiplas doses, pode ser utilizado em até 4 semanas se mantido em condições assépticas e sob temperatura entre +2°C a + 8°C.
		Biofarma e Serum Institute of India	Depois de aberto o frasco-ampola de múltiplas doses, pode ser utilizado em até 28 dias se mantido em condições assépticas e sob temperatura entre +2°C a + 8°C.
Vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis-DTP Triplíce bacteriana - DTP	Multidose	Fundação Butantan	Depois de aberto o frasco-ampola de múltiplas doses, pode ser utilizado em até 15 dias se mantido em condições assépticas e sob temperatura entre +2°C a + 8°C.
		Biofarma	Depois de aberto o frasco-ampola de múltiplas doses, pode ser utilizado em até 4 semanas se mantido em condições assépticas e sob temperatura entre +2°C a + 8°C.
		Biological	Depois de aberto o frasco-ampola de múltiplas doses, pode ser utilizado 28 dias se mantido em condições assépticas e sob temperatura entre +2°C a + 8°C. A OMS recomenda que os frascos abertos desta vacina possam ser mantidos para uso em sessões de imunização subsequentes (até no máximo de 28 dias).
		Serum Institute of India	Depois de aberto o frasco-ampola de múltiplas doses, pode ser utilizado em até 28 dias se mantido em condições assépticas e sob temperatura entre +2°C a + 8°C.
Vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (acelular) dTpa	Unidose	Fundação Butantan	Uso Imediato
	Unidose	GSK	A vacina deve ser administrada imediatamente após abertura do recipiente (não mais do que 8 horas após abertura).
Vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (acelular) DTPa	Unidose	Sanofi Pasteur	Uma vez aberta a ampola, deve-se descartar imediatamente qualquer conteúdo não utilizado.
Vacina contra raiva célula vero (liofilizada)	Unidose	Fundação Butantan	Usar imediatamente, depois da sua reconstituição.

Vacina	Apresent. em doses	Laboratórios	Prazo de utilização, após abertura do frasco, segundo a bula do produtor
Vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae b (conjugada) - Pentavalente	Unidose	Biological, Serum Institute of India ou Panacea	Uso Imediato
	Multidose	Biological	Depois de aberto o frasco-ampola de múltiplas doses, pode ser utilizado em até 28 dias se mantido em condições assépticas e sob temperatura entre +2°C a + 8°C.
Vacina adsorvida Hepatite A (inativada)	Unidose	Fundação Butantan ou MSD	Uso Imediato
Vacina BCG	10 doses	Fundação Adolfo de Paiva (FAP)	A vacina diluída deve ser usada no mesmo dia, por um prazo máximo de 6 horas, mantendo-a sob refrigeração +2°C a + 8°C.
	20 doses	Serum Institute of India	
Vacina Haemophilus Influenzae b - Hib	Multidose	Bio-Manguinhos	Depois de aberto o frasco-ampola de multidose, somente poderá ser utilizado em até 5 dias, se mantido as condições assépticas e sob temperatura entre +2°C a + 8°C.
Vacina Febre Amarela (atenuada)	Multidose	Bio-Manguinhos	A vacina diluída deve ser usada no mesmo dia, por um prazo máximo de 6 horas, mantendo-a sob refrigeração +2°C a + 8°C.
Vacina Hepatite B (recombinante)	10 doses	Instituto Butantan	Depois de aberto o frasco-ampola de múltiplas doses, somente poderá ser utilizada por até 15 dias, se mantida em condições assépticas e sob temperatura entre +2°C a + 8°C.
		Butantan/LG Chem	Depois de aberto o frasco-ampola de múltiplas doses, somente poderá ser utilizada por até 10 dias, se mantida em condições assépticas e sob temperatura entre +2°C a + 8°C.
		Serum Institute of India ou LG Life Sciences ou LG Chem	Depois de aberto o frasco-ampola de múltiplas doses, somente poderá ser utilizada por até 28 dias, se mantida em condições assépticas e sob temperatura entre +2°C a + 8°C.
	20 doses	Sanofi	Depois de aberto o frasco-ampola de múltiplas doses, somente poderá ser utilizada por até 10 dias, se mantida em condições assépticas e sob temperatura entre +2°C a + 8°C.
Vacina Meningocócica ACWY (conjugada)	Unidose	Pfizer, GSK ou Sanofi	Uso Imediato
Vacina Papilomavírus Humano - HPV	Unidose	Instituto Butantan	Uso Imediato
Vacina Pneumocócica 10 Valente (conjugada)	4 doses	Bio-Manguinhos / Fiocruz	Após a abertura do frasco, somente poderá ser utilizado em até 28 dias, se mantido as condições assépticas e sob temperatura entre +2°C a + 8°C.
Vacina Poliomielite Inativada - VIP	10 doses	Bio-Manguinhos ou Sanofi	Depois de aberto o frasco-ampola de multidose, somente poderá ser utilizado em até 28 dias, se mantido as condições assépticas e sob temperatura entre +2°C a + 8°C.

Vacina	Apresent. em doses	Laboratórios	Prazo de utilização, após abertura do frasco, segundo a bula do produtor
Vacina Poliomielite - VOP	Multidose	Bio-Manguinhos / Fiocruz	Depois de aberto o frasco multidose, somente poderá ser utilizado em até 28 dias, se mantida as condições assépticas e sob temperatura entre +2°C a +8°C. Bisnaga Multidose - Depois de aberto, o frasco multidose somente poderá ser utilizado em até 5 dias, se mantida as condições assépticas e sob temperatura entre +2°C a + 8°C.
Vacina Rotavírus humano	Unidose	Bio-Manguinhos / Fiocruz	Uso Imediato
Vacina sarampo, caxumba e rubéola (atenuada) - VTV	Multidose	Bio-Manguinhos / Fiocruz ou Merck	Depois da reconstituição, usar até 8 horas, manter em temperatura entre +2°C a + 8°C e os cuidados que mantenham a sua integridade.
	Multidose	Serum Institute of India ou Sanofi Pasteur	Depois da reconstituição, usar até 6 horas, manter em temperatura entre +2°C a + 8°C e os cuidados que mantenham a sua integridade.
Vacina sarampo, caxumba, rubéola e varicela (atenuada) - Tetra Viral	Unidose	Bio-Manguinhos / Fiocruz	Após reconstituição, recomenda-se o uso imediato. No entanto, foi demonstrado a estabilidade, por até 8 horas após, se mantido as condições assépticas e sob temperatura entre +2°C a + 8°C.
Vacina varicela (atenuada)	Unidose	Merck ou Green Cross	Uso Imediato
		GSK	Após reconstituição, recomenda-se o uso imediato. A vacina reconstituída pode ser utilizada, por até 8 horas após, desde que mantido as condições assépticas e sob temperatura entre +2°C a + 8°C.

Observações:

1. As informações técnicas acima citadas são de responsabilidade de cada laboratório produtor, de acordo com a bula do produto. Um mesmo produto, dependendo do laboratório produtor, pode ter prazo de utilização diferente.
2. A tabela acima é apenas um instrumento facilitador para uso nas salas de vacina. Considerando que o laboratório produtor realiza estudos de tempo em tempo, podem ocorrer alterações no processo produtivo e no registro do produto. É necessário consultar a bula que acompanha o produto.
3. Após reconstituição, as vacinas Unidose deverão ser aplicadas imediatamente.

Atualizado em julho de 2022.