



RESUMO DAS INDICAÇÕES DE IMUNOBIOLOGICOS ESPECIAIS E ESQUEMAS RECOMENDADOS PELO CRIE/MS

Procedimentos para Avaliação e Indicação de Imunobiológicos Especiais: 1. Avaliar histórico vacinal (iniciar ou completar esquemas já iniciados) conforme proposto abaixo. 2. A orientação das <u>Indicações</u> de vacinas especiais, deve ser feita pelas equipes de saúde e <u>prescrita pelo médico</u> , levando-se em conta o histórico do paciente: se é suscetível, se tem restrições para o uso de determinada vacina e ou situações de adiamento; recomendações do médico ou do serviço especializado que faz o acompanhamento, em concordância com as indicações do CRIE. 3. Além das vacinas especiais, GARANTIR que o paciente tenha as vacinas de <u>Rotina</u> em dia.	
DTPa quando indicado substituição de esquema + HB + Hib em < de 1 ano (com uma dose adicional de Hib, R1 aos 15 meses).	MncC no esquema de três doses, sem dose prévia = D1 + D2 com intervalo de dois meses, mais reforço cinco anos após a D1. Quando já recebeu a D1 há mais de 1 ano, somente agendar o reforço.
Pncc23V além das Indicações de CRIE, é recomendada (D1 + Ref) para pessoas com mais de 60 anos não vacinadas, quando vivem acamadas e/ou residem em instituições fechadas como asilos, casas geriátricas, hospitais.	A vacina HPV está na <u>Rotina</u> para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Indivíduos de 09 a 26 anos vivendo com HIV/AIDS e indivíduos imunodeprimidos (submetidos a transplante de órgãos sólidos, transplantes de medula óssea ou pacientes oncológicos) em esquema de 3 doses = D1 + D2 com intervalo de dois meses + D3 com intervalo de seis meses após a D1.
Pacientes. Oncológico – em tratamento de QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, ou que terminaram o tratamento recentemente (máximo 5 anos após a última sessão)	Varc em esquema de 2 doses=D1 + D2 com intervalo de 3 meses.
Vacina HA – para ter indicação pelo CRIE é necessário o exame anti-HAV com resultado não reagente. Somente não é necessário para pacientes hepatopatas, nefropatas e transplantados.	Pncc13V – Pncc13V para Pncc23V intervalo de 8 semanas. Intervalo da Pncc23V para Pncc13V 1 ano. A Pncc13V não tem indicação para pessoas já imunizadas pelas vacinas Pncc7V e/ou Pncc10V. Está indicada para crianças a partir de 5 anos de idade com as indicações contempladas pelo CRIE.

	MOTIVO DE INDICAÇÃO	IMUNOBIOLOGICOS E ESQUEMAS
1	ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO POSITIVO OU FORTEMENTE SUSPEITO DE INFECÇÃO POR VHB	HB IGHB (avaliar exposição e se suscetível - Conforme Manual de Recomendações para terapia Antirretroviral em adultos infectados com o HIV 2008 - Suplemento III 2010. Quando houver indicação a aplicação deverá ser o mais breve possível, preferencialmente nas primeiras 24 horas e no máximo até 7 dias após exposição)
2	HIV/AIDS	Pncc23V HB (4 doses dobro vol + sorologia pós) HA (se suscetível) SRC/Varc (avaliação CD4, com solicitação médica) MncC (sem dose prévia = 3 doses ou completar esquema) FLU dT Pncc13V (1dose, se não imunizados com Pncc7V ou Pncc10V) Hib (se vacinado na Rotina = 1 dose; não vacinado na Rotina = 2 doses) *HPV na Rotina para sexo feminino de 9 a 26 anos de idade.
3	ASMA PERSISTENTE MODERADA OU GRAVE	Pncc23V Hib (se vacinado na Rotina = 1 dose; não vacinado na Rotina = 2 doses) FLU



	MOTIVO DE INDICAÇÃO	IMUNOBIOLOGICOS E ESQUEMAS
4	ASPLENIA ANATÔMICA OU FUNCIONAL e doenças relacionadas (Anemia Falciforme, Talassemia Maior)	Pncc23V HB HA SRC/Varc (se não contraindicação) Hib (se vacinado na Rotina = 1 dose; não vacinado na Rotina = 2 doses) MncC (sem dose prévia = 3 doses ou completar esquema) FLU dT
5	CANDIDATOS A TRANSPLANTE DE ÓRGÃO SÓLIDO, cadastrados em programas de transplantes, preferencialmente completar esquema até 15 dias antes do TRANSPLANTE	VIP (em substituição de esquema da Rotina) HB (4 doses dobro vol+ sororologia pós Hib (se vacinado na Rotina = 1 dose; não vacinado na Rotina = 2 doses) HA Pncc23V MncC (1 dose) SRC/Varc (se não contraindicação) FLU dT
6	CARDIOPATIAS CRÔNICAS (Cardíaca isquêmica, Insuficiência cardíaca, Hipertensão arterial crônica com comorbidade)	Pncc23V Hib (se vacinado na Rotina = 1 dose; não vacinado na Rotina = 2 doses) FLU
7	CARDIOPATIAS CRÔNICAS em < 2 anos de idade, se risco de descompensação em vigência de febre.	DTPa
8	COAGULOPATIAS (hemofilias, púrpuras, trombofilias, doença de Von Willebrand, distúrbios plaquetários)	HA HB FLU
9	COMUNICANTES DOMICILIARES DE IMUNODEPRIMIDOS	SRC/Varc (se suscetível e não contraindicação = 2 doses) VIP (em substituição de esquema da Rotina) FLU
10	COMUNICANTES SEXUAIS DE CASO AGUDO DE HEPATITE B	HB IGHB (avaliar exposição e se suscetível. Quando houver indicação a aplicação deverá ser o mais breve possível, no máximo até 14 dias após exposição)
11	CONTATO HOSPITALAR COM VARICELA, suscetível a doença	IGVZ (criança hospitalizada <u>< de 9 meses de idade</u> em contato direto e prolongado com varicela, no máximo até 96 horas após o contato) Varc (imunocompetente <u>> de 9 meses de idade</u> , no momento ou durante a internação em unidade onde existir caso de varicela, no máximo até 120 horas após o contato)



	MOTIVO DE INDICAÇÃO	IMUNOBIOLOGICOS E ESQUEMAS
12	CONVÍVIO COM PORTADOR DE HEPATITE B	HB
13	CRIANÇA FILHO DE MÃE HIV <u>somente exposta</u> (até 18 meses)	VIP Varc (D1 com 1 ano pelo CRIE e reforço com TetraViral aos 15 meses na Rotina) FLU
14	CRIANÇAS E ADOLESCENTES <19 ANOS com HIV/AIDS	Hib (se vacinado na Rotina = 1 dose; não vacinado na Rotina = 2 doses) HA (2 doses) SRC/Varc (2 doses se não contraindicação) Pncc23V MncC (sem dose prévia = 3 doses ou completar esquema) HB (sem doses prévias = 4 doses dobro vol + sorologia pós) FLU HPV (*rotina – 09 a 26 anos de idade; esquema 3 doses) Pncc13V (1dose, maiores de 5 anos e se não foram imunizados com Pncc7V e/ou PNcc10V)
15	DERMATOPATIAS CRÔNICAS GRAVES (ictiose, epidermólise bolhosa, psoríase, dermatite atópica grave)	Varc FLU
16	DIABETES <i>MELLITUS</i>	Pncc23V HB (3 doses + sorologia pós) Hib (se vacinado na Rotina = 1 dose; não vacinado na Rotina = 2 doses) FLU
17	Doadores de MEDULA ÓSSEA cadastrados em programas de transplantes, preferencialmente completar esquema até 15 dias antes do TRANSPLANTE	VIP (em substituição de esquema da Rotina) HB HA SRC/Varc FLU dT
18	Doadores de ÓRGÃOS SÓLIDOS cadastrados em programas de transplantes, preferencialmente completar esquema até 15 dias antes do TRANSPLANTE	VIP (em substituição de esquema da Rotina) HB HA SRC/Varc FLU dT
19	DOADORES DE SANGUE	HB



	MOTIVO DE INDICAÇÃO	IMUNOBIOLOGICOS E ESQUEMAS
20	DOENÇA CONVULSIVA CRÔNICA OU NEUROLÓGICA INCAPACITANTE (se < 7 anos substituição de esquema da Rotina)	DTPa
21	DOENÇA DE DEPÓSITO (Gaucher, Nieman-Pick, mucopolissacaridoses tipo I e II, glicogenoses)	HB HA Hib (se vacinado na Rotina = 1 dose; não vacinado na Rotina = 2 doses) Pncc23V MncC (1 dose) FLU
22	DOENÇA NEUROLÓGICA CRÔNICA INCAPACITANTE	Pncc23V MncC (1 dose) Hib (se vacinado na Rotina = 1 dose; não vacinado na Rotina = 2 doses)) FLU
23	ENCEFALOPATIA QUE TEVE INÍCIO ATÉ 7 dias após dose de Penta/DTP/DTPa	DT (substituição de esquema da Rotina em < 7 anos de idade)
24	EVENTO ADVERSO PRÉVIO	Ver Ficha de Notificação e Investigação de EAPV, se Conduta de substituição de esquema
25	FIBROSE CÍSTICA (MUCOVISCIDOSE)	Pncc23V Hib (se vacinado na Rotina = 1 dose; não vacinado na Rotina = 2 doses)) HB HA FLU
26	FISTULA LIQUÓRICA E DERIVAÇÃO VENTRÍCULO PERITONIAL	Pncc23V Hib (se vacinado na Rotina = 1 dose; não vacinado na Rotina = 2 doses) MncC (1 dose) FLU
27	GESTANTE (se suscetível e exposta à varicela ou contato físico prolongado com lesões de herpes zoster)	IGVZ o mais breve possível até no máximo 96 horas após o contato



	MOTIVO DE INDICAÇÃO	IMUNOBIOLOGICOS E ESQUEMAS
28	HEMOGLOBINOPATIAS	HA FLU
29	HEPATOPATIAS CRÔNICAS E PORTADORES DE HEPATITE C	HA HB (3 doses + sorologia pós) Pncc23V MncC (1 dose) FLU
30	HEPATOPATIAS CRÔNICAS E PORTADORES DE HEPATITE B	HA Pncc23V MncC (1 dose) FLU
31	HOSPITALIZADO, quando houver indicação de dar continuidade à vacinação durante a internação	VIP (substituição de esquema da Rotina) DTPa /Hib HB (criança que permaneça internada em UTI Neonatal ou Berçário na idade de vacinação)
32	IMPLANTE DE CÓCLEA	Pncc23V MncC (1 dose) Hib (se vacinado na rotina = 1 dose; não vacinado na rotina = 2 doses) FLU
33	IMUNODEFICIÊNCIA DE IgA E DE SUBCLASSES DE IMUNOGLOBULINAS	VIP Varc Pncc23V MncC (sem dose prévia = 3 doses ou completar esquema) HA HB
34	IMUNODEPRESSÃO DEVIDO AO CANCER OU IMUNOSSUPRESSÃO TERAPÊUTICA	VIP/DTPa (em substituição de esquema da Rotina) Varc (se não contraindicação) HA HB (4 doses dobro vol + soro Hib (se vacinado na Rotina = 1 dose; não vacinado na Rotina = 2 doses) logia pós) Pncc23V MncC (sem dose prévia = 3 doses ou completar esquema) FLU
35	IMUNODEFICIÊNCIAS COMBINADAS DA IMUNIDADE CELULAR E HUMORAL	VIP Pncc23V MncC (sem dose prévia = 3 doses ou completar esquema) HA FLU Pncc13V (1dose)



	MOTIVO DE INDICAÇÃO	IMUNOBIOLOGICOS E ESQUEMAS
36	IMUNODEFICIÊNCIAS DA FAGOCITOSE: Doença granulomatosa crônica	Pncc23V MncC (sem dose prévia = 3 doses ou completar esquema) HA HB FLU
37	IMUNODEFICIÊNCIAS DA IMUNIDADE HUMORAL GRAVE	Hib (se vacinado na Rotina = 1 dose; não vacinado na Rotina = 2 doses)) VIP Varc Pncc23V MncC (sem dose prévia = 3 doses ou completar esquema) HA HB FLU
38	IMUNODEFICIÊNCIAS DO COMPLEMENTO	Hib (se vacinado na Rotina = 1 dose; não vacinado na Rotina = 2 doses) Varc Pncc23V MncC (sem dose prévia = 3 doses ou completar esquema) HA HB FLU
39	IMUNODEPRIMIDO APÓS EXPOSIÇÃO DE RISCO (avaliar qual agente e formas de transmissão)	IGHB (mesmo que previamente vacinado) IGVZ (se não teve a doença ou recebeu a vacina quando já estava em imunossupressão) IGRH (na indicação de imunoprofilaxia + a vacina) IGTH (na indicação de imunoprofilaxia, mesmo que previamente vacinado, em substituição ao soro)
40	MICROBIOLOGISTA rotineiramente exposto a isolamento de <i>Neisseria meningitidis</i>	MncC (D1 com Reforço 5 anos após)
41	NÃO SOROCONVERSÃO APÓS ESQUEMA PRIMÁRIO DA VACINA HEPATITE B	HB
42	NEFROPATIAS CRÔNICAS/HEMODIALISADOS/SINDROME NEFRÓTICA	HA HB (4 doses dobro vol + sorologia pós) Pncc23V Hib (se vacinado na Rotina = 1 dose; não vacinado na Rotina = 2 doses) SRC/Varc (se não contraindicação) FLU dT
43	PNEUMOPATIAS CRÔNICAS (Dpoc, Enfisema pulmonar, Bronquite crônica, Bronquiectasia, Intersticiais do pulmão, Displasia broncopulmonar, Bronquiectasias, Hipertensão arterial pulmonar)	Pncc23V Hib (se vacinado na Rotina = 1 dose; não vacinado na Rotina = 2 doses) FLU



	MOTIVO DE INDICAÇÃO	IMUNOBIOLOGICOS E ESQUEMAS
44	PNEUMOPATIAS CRÔNICAS em < de 2 anos de idade e com risco de descompensação em vigência de febre	DTPa
45	PREMATURIDADE <1000Gr ou 31 semanas de gestação, para a 1ª dose; restante do esquema vacinal com Penta.	DTPa Hib HB
46	PREVENÇÃO DA INFECÇÃO PERINATAL PELO VÍRUS HB	HB IGHB (preferencialmente nas primeiras 12 a 24 horas de vida)
47	PROFISSIONAL DE SAÚDE	HB FLU (Varc se suscetível e não contra-indicação: a) em convívio hospitalar com imunodeprimido e pediatria; b) na pós exposição à varicela, no máximo até 120 horas) dT SRC dTpa (profissionais de saúde que prestam atendimento direto ao RN nas maternidades e UTI Neo)
48	RECEPTORES DE MULTIPLAS TRANSFUSÕES DE SANGUE	HB (3 doses + sorologia pós)
49	RN de mães que tiveram Varicela nos últimos 5 dias de gestação ou até 48 hs após o parto	IGVZ no máximo até 96 horas após exposição
50	RN PREMATURO APÓS EXPOSIÇÃO DE RISCO, contato direto prolongado com varicela	IGVZ: a) se RN Prematuro de 28 a 36 semanas de gestação e a mãe nunca teve varicela; b) RN com menos de 28 semanas de gestação ou < de 1.000 gr ao nascer, mesmo que a mãe já teve varicela
51	RN em situação de RISCO DE TÉTANO NEONATAL	IGTH: a) se mãe é desconhecida ou com história vacinal desconhecida b) mãe não adequadamente vacinada; c) RN Prematuro com lesões potencialmente tetanogênicas, independentemente de história vacinal da mãe



	MOTIVO DE INDICAÇÃO	IMUNOBIOLOGICOS E ESQUEMAS
52	SUBSTITUIÇÃO DE VACINAS BACTERIANAS POR DTPa em < 2 anos de idade	Hib
53	TRANSPLANTADO DE CÉLULAS TRONCO HEMATOPOIÉTICAS - TMO (Esquema Vacinal é REFEITO)	DTPa (< 7 anos em substituição de esquema da Rotina) Hib (3 doses) HB (3 doses) HA VIP (3 doses) Pncc23V (2 meses após a última dose de Pncc13V) MncC (3 doses) SRC/ Varc (24 meses após TMO se não contraindicação/solicitação médica) FLU Pncc13V (1 ou 3 doses conforme situação vacinal da Pncc23V)
54	TRANSPLANTADO DE ÓRGÃO SÓLIDO - Esquema iniciado no pré-transplante deve ser completado, <u>não repetir</u>	VIP e DTPa (em substituição de esquema da Rotina) HB (4 doses dobro vol+ sororologia pós) HA MncC (1 dose) Hib (se vacinado na Rotina = 1 dose; não vacinado na Rotina = 2 doses) Pncc23V FLU dT Pncc13V (1dose)
55	TRISSOMIAS (Síndrome de Down - Síndrome de Edwards - Síndrome de Patau - Síndrome de Turner - Síndrome de Klinefelter - Síndrome de Warkany)	Pncc23V HA MncC (1 dose) Hib (se vacinado na Rotina = 1 dose; não vacinado na Rotina = 2 doses) Varc FLU
56	USUÁRIO CRONICO ACIDO ACETIL SALICILICO	Varc (suspender uso do ácido acetil salicílico por seis semanas após a vacinação) FLU
57	VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL/PROFILAXIA APÓS EXPOSIÇÃO DE RISCO	HB IGHB (avaliar exposição e se suscetível. Quando houver indicação a aplicação deverá ser o mais breve possível, no máximo até 14 dias após exposição)
58	VIAJANTE oficial governamental ou forças armadas em missão	HA MncC (1 dose)
Organizado pelo CRIE/GEVIM/DIVE/SC, Outubro/2019, com base no Manual dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais/PNI/MS-2019 e Lista de Motivos de Indicação do Sistema SIPNI.		