

Eficácia esperada	Superior a 95%
Duração da imunidade	Prolongada
Indicações	A partir de 15 meses
Contraindicações	As contraindicações de caráter geral: - Hipersensibilidade conhecida à neomicina ou qualquer outro componente da vacina; - Hipersensibilidade após administração das vacinas: sarampo, caxumba, rubéola e/ou varicela; - Imunodeficiências primárias ou secundárias.
Eventos adversos	Locais: dor, vermelhidão, vesículas no local da aplicação; Sistêmicos: febre, exantema, convulsão febril, anafilaxia, meningite, herpes zoster grave, encefalite, ataxia, eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, pneumonia, trombocitopenia e síndrome de Guillain-Barré.

Quadro 13.2. Vacina contra a varicela

Tipo de vacina	Vírus atenuado		
Número de doses	Segunda dose: para crianças de 4 anos previamente vacinadas com uma dose de tetraviral ou VTV+varicela.		
Idade recomendada	Aos 4 anos, podendo ser aplicada na rede pública até 6 anos, 11 meses e 29 dias.		
Conservação	Nível	Temperatura	Tempo de duração
	Central	+2°C a +8°C	Observar o prazo de validade do produto. Utilizar imediatamente após a diluição.
	Regional	+2°C a +8°C	
	Local	+2°C a +8°C	
Via de administração	Subcutânea na região posterior do deltoide esquerdo.		
Dose (volume)	0,5ml		
Eficácia esperada	Superior a 90%		
Duração da imunidade	Prolongada		
Indicações	A partir de 15 meses, profissional de saúde e indígenas.		