

Eventos adversos	• Reações locais como: dor e abscesso; • Reações sistêmicas como: mialgia, mal-estar, dor de cabeça e febre entre 2 e 7 dias após a vacinação, com duração de um a três dias; • Reações de hipersensibilidade: foram relatados raros casos de erupção cutânea, urticária, bronco espasmo e reações anafiláticas, inclusive com choque, surgindo após a aplicação da vacina contra a febre amarela. Embora ocorrendo geralmente em pessoas com história de alergia a proteínas do ovo, outros componentes também podem deflagrar reações de hipersensibilidade; • Manifestações neurológicas: o mais grave dos eventos adversos neurotrópicos associados à vacina contra febre amarela é a encefalite, caracterizada por febre e manifestações neurológicas variadas (meningismo, convulsão, paresia) associadas a alterações liquóricas e iniciadas 7 a 21 dias após a vacinação.
-------------------------	--

Quadro 11. Características gerais do sarampo, da rubéola e da caxumba

SARAMPO	
Agente etiológico	Vírus do sarampo (<i>Paramixovírus</i>)
Reservatório	O homem
Modo de transmissão	De pessoa a pessoa, pelas secreções nasofaríngeas.
Período de incubação	De 7 a 18 dias
Transmissibilidade	Desde o período prodrômico, em geral quatro dias antes, até quatro dias após o início da erupção.
Suscetibilidade	Universal
Imunidade	• Pela doença; • Pela vacina; • Por anticorpos maternos. Após os nove meses de idade, cerca de 80% das crianças já perderam esses anticorpos.

RUBÉOLA	
Agente etiológico	Vírus da rubéola
Reservatório	O homem
Modo de transmissão	Contato direto pelas secreções nasofaríngeas.
Período de incubação	De 14 a 21 dias, em média 17 dias.

Transmissibilidade	De 5 a 7 dias antes e durante toda a fase do exantema.
Suscetibilidade	Universal
Imunidade	• Através da doença; • Pela vacina; • Por anticorpos maternos, após o nono mês de vida cerca de 80% das crianças já perderam estes anticorpos.

CAXUMBA	
Agente etiológico	Vírus da parotidite infecciosa – gênero <i>Paramyxoviridae</i>
Reservatório	O homem
Modo de transmissão	Disseminação de gotículas e pelo contato direto com a saliva de uma pessoa infectada.
Período de incubação	De 12 a 25 dias; em média, 18 dias.
Transmissibilidade	• De seis a sete dias antes da parotidite, principalmente nas 48 horas antes, até nove dias depois do início da doença; • Na urina, o vírus pode estar presente até o 14º dia após o início da doença.
Suscetibilidade	Universal
Imunidade	• Pela infecção natural; • Pela doença; • Pela vacina.

Quadro 11.1. Vacina contra o sarampo, a caxumba e a rubéola, tríplice viral (VTV).

Tipo de vacina VTV	Vírus atenuado
Número de doses	• Duas para os indivíduos até 29 anos, 11 meses e 29 dias. Na rotina a primeira aos 12 meses e a segunda aos 15 meses (com a tetraviral); • Uma para os indivíduos de 30 a 59 anos ou mais se nunca vacinados; • Para profissionais de saúde: duas (independente da faixa etária).
Idade recomendada	• A partir dos 12 meses; • Até 29 anos: duas doses da vacina VTV e/ou Tetraviral; • De 29 a 59 anos: uma dose; • Trabalhadores de saúde independentemente da idade devem receber duas doses de tríplice viral.

Conservação	Nível	Temperatura	Tempo de duração
	Central	+2°C a +8°C	Observar o prazo de validade do produto. Utilizar por até 8 horas após a diluição.
	Regional	+2°C a +8°C	
	Local	+2°C a +8°C	
Via de administração	Subcutânea na região posterior do deltoide.		
Dose (volume)	0,5ml		
Eficácia esperada	Superior a 95%		
Duração da imunidade	Prolongada		
Indicações	- A partir de 12 meses; - Em casos de bloqueio quando a criança recebe a dose com VTV antes dos 12 meses (dos 6 a 11 meses) deverá ser agendada para receber a dose de rotina aos 12 meses.		
Contraindicações	- As contraindicações de caráter geral; - Gestantes (as mulheres vacinadas deverão evitar a gravidez por um mês); - Evento adverso grave na dose anterior; - Pessoas com imunodeficiências congênicas ou adquiridas. Infecção assintomática pelo HIV não constitui contraindicação; - Pessoas em usos de corticosteroides em doses imunossupressoras – devem ser vacinadas com intervalo de pelo menos um mês após a suspensão da droga; - Pessoas em uso de quimioterapia: só devem ser vacinadas 3 meses após a suspensão do tratamento; - Transplantados da medula óssea: recomenda-se vacinar com intervalo de 2 anos após o transplante. * Crianças de seis a oito meses de idade e também as crianças comprovadamente portadoras de alergia à proteína do leite de vaca (APLV) não devem receber a vacina tríplice viral do fabricante Serum Institute of India. Estas crianças deverão ser vacinadas com a vacina tríplice viral do laboratório Fiocruz/Bio-Manguinhos.		
Eventos adversos	Leves: febre, cefaleia, linfadenopatias regionais, ardência, eritema, hiperestesia, enduração, irritabilidade, conjuntivite e/ou manifestações catarrais, exantema, orquite, parotidite, artrites, urticária local; Graves: choque anafilático, púrpura trombocitopênica, meningite e panencefalite.		