

**Quadro 4. Características gerais da hepatite B**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agente etiológico</b>    | Vírus da hepatite B                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Reservatório</b>         | O homem                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Modo de transmissão</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pelo sangue:</b> transfusão, contaminação de ferida, lacerações, uso de seringas contaminadas e secreções vaginais;</li> <li>• <b>Pelo sêmen:</b> atividades sexuais;</li> <li>• <b>Da mãe para o filho:</b> no período perinatal ou no útero.</li> </ul> |
| <b>Período de incubação</b> | 45 a 160 dias, mas, em média, é de 60 a 90 dias.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Transmissibilidade</b>   | De dois a três meses antes dos sintomas, durante a fase aguda da doença, podendo persistir por vários anos até o resto da vida, no caso do portador crônico.                                                                                                                                          |
| <b>Suscetibilidade</b>      | Geral                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Imunidade</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pela infecção natural;</li> <li>• Pela vacina;</li> <li>• Pela imunoglobulina (temporária, + ou - 28 dias).</li> </ul>                                                                                                                                       |

**Quadro 4.1. Vacina contra a hepatite B**

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de vacina                             | Recombinação de ADN (ácido desoxirribonucleico) – engenharia genética.                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                               |
| Número de doses e intervalo entre as doses | <ul style="list-style-type: none"><li>Três doses com intervalo de 0 – 1 – 6 meses;</li><li>Quatro doses com intervalo de 0 – 1 – 2 – 6 a 12 meses, para as situações especiais do CRIE;</li><li>Dose com volume dobrado para hemodialisados e imunodeprimidos.</li></ul>                                                                      |             |                                                                                                               |
| Idade recomendada                          | A partir do nascimento, o mais cedo possível.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                               |
| Conservação                                | Nível                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Temperatura | Tempo de duração                                                                                              |
|                                            | Central                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +2°C a +8°C | Prazo de validade após frasco aberto:<br>Até 15 dias: Lab. Butantan<br>Até 28 dias: Lab. LG Chemical e SERUM. |
|                                            | Regional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | +2°C a +8°C |                                                                                                               |
|                                            | Local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +2°C a +8°C |                                                                                                               |
| Via de administração                       | Intramuscular no músculo anterior da coxa, região ventroglútea (Hochstetter), lateral da coxa ou deltoide, dependendo da idade do receptor.                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                               |
| Dose (volume)                              | Para Butantan e SERUM: 0,5ml até 19 anos 11 meses e 29 dias de idade e 1ml em indivíduos a partir de 20 anos. Para LG Life Sciences 0,5ml até 15 anos 11 meses e 29 dias e 1 ml em indivíduos a partir de 16 anos. Dose com volume dobrado em imunodeprimidos. No entanto, observar outras recomendações, a depender do laboratório produtor. |             |                                                                                                               |

|                             |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eficácia esperada</b>    | Superior a 95% (após a 3ª dose)                                                                                                                                                                                             |
| <b>Duração da imunidade</b> | Prolongada                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Indicações</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para todos os indivíduos sem limite de faixa etária;</li> <li>• Caso haja atraso da segunda dose, a terceira deverá aguardar pelo menos dois meses após a segunda dose.</li> </ul> |
| <b>Contraindicações</b>     | Anafilaxia em dose anterior                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Eventos adversos</b>     | Febre, cefaleia, reações locais leves, mal-estar e, raramente, anafilaxia.                                                                                                                                                  |

### Doses e volume das vacinas hepatite B Laboratório Butantan, SERUM, e LG Life Science

Nas indicações para imunodeprimido, hemodialisado, pré-diálise, HIV, transplantado de órgão sólido, paciente com neoplasia ou que necessite quimioterapia, radioterapia ou corticoterapia:

- **Em menores de 20 anos de idade para vacina Butantan e SERUM (até 19 anos, 11 meses e 29 dias) e em menores de 16 anos para vacina LG Life Science (até 15 anos, 11 meses e 29 dias):** administrar via intramuscular, 1,0 ml de suspensão injetável; esquema de 04 doses (momento 0, 1, 2 e 6);
- **Com 20 anos ou mais de idade para vacina Butantan e SERUM e em maiores de 15 anos (16 anos e mais) para vacina LG Life Science:** administrar via intramuscular 2,0 ml de solução injetável; esquema de 4 doses (momento 0, 1, 2 e 6);
- **Recém-nascido filho de mãe HIV positivo:** administrar via intramuscular, **0,5 ml** de suspensão injetável; esquema de 4 doses (**momento 0, 2, 4 e 6 meses de idade**), conforme o calendário vacinal de rotina (doses de 2, 4 e 6 meses feitas com penta). Aos 15 meses, aplicar mais uma dose de vacina penta (1º ref. com penta e não com DTP). Aos 18 meses, se a criança tiver resultado para HIV reagente, realizar sorologia para anti-HBs. Caso o resultado do anti-HBs seja < 10U/L, aplicar um novo esquema de 4 doses de hepatite B monovalente, dose dobrada para a faixa etária (1ml) nos tempos 0,30,60,180.

### Nas indicações para imunocompetentes:

- **Em menores de 20 anos de idade para vacina Butantan e SERUM (até 19 anos, 11 meses e 29 dias) e em menores de 16 anos para vacina LG Life Sciences (até 15 anos, 11 meses e 29 dias):** administrar via intramuscular, 0,5 ml de suspensão injetável; esquema de 3 doses (**momento 0,1 e 6**);
- **Com 20 anos ou mais de idade para vacina Butantan e SERUM e para maiores de 15 anos, 11 meses e 29 dias (com 16 anos e mais) para vacina LG Life Sciences:** administrar via intramuscular, **1,0 ml** de solução injetável; esquema de 3 doses (**momento 0, 1 e 6**);
- **Recém-nascido filho de mãe HBsAg reagente:** administrar as doses segundo o calendário (ao nascer com HB mono e com volume normal e aos 2, 4 e 6 meses com penta) e aplicar simultaneamente à primeira dose, em local diferente da vacina, a imunoglobulina humana hiperimune contra hepatite B até o 7º dia de vida. Sorotestar no nono mês e caso seja não reagente, aplicar mais um esquema de 3 doses normais (0,30,180);
- **RN de baixo peso: aplicar 04 doses com volume normal (0,5ml) seguindo a rotina:** ao nascer com HB monovalente e aos 2, 4 e 6 meses com a vacina penta. Se menor de 31 semanas e/ou 1000gr a primeira dose pode ser feita com a vacina DTPa + Hib monovalente, desde que solicitadas ao CRIE;
- **Transplantado de TMO:** aplicar esquema de 03 doses (0,30,180) com volume normal para a faixa etária.