

CARTILHA MÃE JOINVILENSE



CONSULTA DE PRÉ-NATAL E PUERICULTURA

As consultas de rotina são fundamentais para a saúde da gestante e do bebê, por isso é importante:

- ✓ Comparecer à todas as consultas agendadas na Unidade de Saúde, levando a carteira de vacina e caderneta da gestante pré-natal;
- ✓ Realizar todos os exames solicitados pelo profissional de saúde;
- ✓ Manter uma alimentação saudável, com pelo menos 3 refeições completas (café da manhã, almoço e jantar);
- ✓ Não usar medicamentos sem prescrição;
- ✓ Não usar drogas e álcool.

COVID-19 NA GESTAÇÃO

É importante que todas as gestantes recebam a **Vacina da COVID-19**, pois as mulheres grávidas, em comparação com as mulheres não grávidas, têm maior risco de apresentar formas graves da doença.

Em caso de sintomas gripais (coriza, dor de garganta, tosse, febre, perda de olfato, perda de paladar, cansaço, falta de ar, etc) procurar a Unidade de Saúde ou Pronto Atendimento.

Atenção: A Maternidade Darcy Vargas não realiza atendimento para sintomas gripais.

SINTOMAS DE ALERTA NA GESTAÇÃO

Procurar a **Unidade de Saúde** ou a **Maternidade** imediatamente no caso de:

- ✓ Sangramento ou corrimento vaginal com odor fétido;
- ✓ Dor abdominal;
- ✓ Ardência ao urinar;
- ✓ Febre;
- ✓ Vômitos contínuos;
- ✓ Dores de cabeça forte e contínua;
- ✓ Inchaço anormal;
- ✓ Quedas com impacto abdominal;
- ✓ Diminuição dos movimentos do bebê (A partir da 34ª semana de gestação o bebê não pode ficar mais de 6h sem movimentação).

TRABALHO DE PARTO

Procurar a **Maternidade** quando sentir:

- ✓ **Contrações uterinas:** Endurecimento da barriga a cada 5 minutos, com duração de 30 segundos ou mais e em torno de 2 a 3 contrações a cada 10 minutos;
- ✓ **Rompimento da bolsa:** perda de líquido vaginal. Nesse caso, mesmo que não sinta contrações, procurar a maternidade.



Lembre-se: toda gestante tem direito a 1 (um) acompanhante durante os atendimentos nos Serviços de Saúde.

VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA

Considera-se violência obstétrica todo ato praticado pelo médico, pela equipe do hospital, por um familiar ou acompanhante que ofenda, de forma verbal ou física, as mulheres gestantes, em trabalho de parto, ou, ainda, no período pós-parto (**Lei Estadual nº 18.322, de 05/01/2022**).

CUIDADOS COM BEBÊ

- ✓ Na primeira semana integral (primeiros 7 dias): Realizar o **Teste do Pezinho** (de 48 horas até o 5º dia de vida) e nesta mesma data, agendar a primeira consulta do bebê e da mamãe;
- ✓ Limpar o coto umbilical a cada troca de fralda com álcool 70% e cotonete;
- ✓ O coto umbilical geralmente cai em até 10 dias após o nascimento, caso observe, **vermelhidão, mal cheiro ou secreção no local**, procure a Unidade de Saúde;
- ✓ Realizar banho diário na criança com sabonete neutro;
- ✓ Evitar o uso de talco;
- ✓ Deixar o ambiente sempre arejado;
- ✓ Comparecer regularmente nas consultas para avaliação do crescimento e desenvolvimento conforme calendário;
- ✓ Manter a Caderneta de Vacina atualizada.

PROCURAR ATENDIMENTO IMEDIATO NA UNIDADE DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO OU HOSPITAL

1 – Quando o bebê apresentar:

- ✓ Dificuldade para respirar;
- ✓ Choro contínuo (dor);
- ✓ Sem fazer cocô ou barriga muito estufada;
- ✓ Sangue nas fezes;
- ✓ Vômito em jato persistente;
- ✓ Dificuldades em mamar ou recusa;
- ✓ Febre;
- ✓ Alteração na cor da pele, “amarelão”;
- ✓ Sinais de infecção em coto umbilical (pus, vermelhidão e calor local).

2 – Quando a mãe apresentar:

- ✓ Dificuldade para amamentar, pouco leite, feridas nas mamas;
- ✓ Mama empedrada (mamas cheias, duras, quentes e doloridas);
- ✓ Febre;
- ✓ Sangramento vaginal intenso;
- ✓ Infecção, caracterizada por dor, vermelhidão, secreção e calor na região dos pontos;
- ✓ Queixas relacionadas à saúde mental (tristeza intensa e frequente e alterações bruscas de humor).

AMAMENTAÇÃO

- ✓ Amamente seu bebê exclusivamente até o 6º mês de vida, preferencialmente, até os 2 anos de vida;
- ✓ Até os 6 meses de vida não é necessário fornecer mamadeira com suco, chá ou água para os bebês que só mamam no peito. O **Leite Materno tem nutrientes e água que o bebê precisa**;
- ✓ Quanto mais o bebê mama no peito, mais leite será produzido;
- ✓ Amamentar o bebê sempre que ele quiser, não deixar sem amamentar por mais de 3 horas;
- ✓ Verificar se o bebê está mamando corretamente, pois ele deve abocanhar toda a aréola (parte escura ao redor do bico);
- ✓ Se observar que seu bebê está com dificuldades de amamentação e aparentemente não há ganho de peso, procurar a Unidade de Saúde para controle do peso, **o baixo ganho de peso pode acarretar no comprometimento da saúde e desenvolvimento do bebê**;
- ✓ Evite oferecer bicos (chupetas) para o seu bebê, pois pode atrapalhar a amamentação;
- ✓ Não dê outros leites sem o conhecimento e orientação de um profissional de saúde;
- ✓ Se o médico prescrever complemento (leite em pó), oferecer ao bebê de preferência em copinho, colher ou seringa e evitar mamadeira, pois também pode atrapalhar a amamentação;
- ✓ Não deixe outra pessoa amamentar seu bebê, a amamentação por outras mulheres pode transmitir doenças;

- ✓ Após a amamentação, sempre coloque o bebê na posição em pé no colo, no mínimo 20 minutos, para que ele arroto. Você nem sempre vai ouvir o arroto;
- ✓ Em caso de infecção por Covid-19, a amamentação não deve ser interrompida, solicitar informações a um profissional de saúde de como amamentar nessa situação.



ENGASGO

Um **engasgo** é o bloqueio da traqueia por algum objeto estranho, podendo ser leite, alimentos, utensílios e até mesmo fluidos como saliva, vômito e sangue.

Em caso de engasgo ligar para um Serviço de Emergência: **SAMU (192)** ou **Corpo de Bombeiros (193)**.

Realizar a Manobra de Heimlich, desengasgo, para tentar desafogar a criança de **até 1 ano de idade** conforme orientação a seguir, enquanto aguarda o socorro:

- ✓ Apoiar o bebê sobre o braço com a barriga para baixo e com a cabeça mais baixa em relação ao corpo, cerca de 45°;
- ✓ Abrir a boca da criança com uma mão e com a outra mão, em forma de concha, bater com força mediana nas costas do bebê;

- ✓ Mesmo com êxito no desengasgo, levar o bebê a Unidade de Saúde ou Pronto Atendimento ou Hospital para os devidos cuidados.



PREVENINDO MORTE SÚBITA

- ✓ Os pais podem prevenir a morte súbita colocando o recém-nascido na posição correta na hora de dormir: **de costas e com a barriga para cima, para evitar que ele mude de posição**;
- ✓ Não deixe o bebê no carrinho ou no bebê conforto por um longo período;
- ✓ Tirar objetos do berço que possam ser puxados por ele e sufocá-lo, como panos, lençóis, travesseiros, brinquedos e cobertores;
- ✓ Não é recomendado a criança dormir na cama com os pais, pois ao movimentar-se podem acabar sufocando a criança.

Diretoria de Assistência à Saúde
Gerência de Enfermagem
Núcleo de Gestão Assistencial

Telefones Úteis:

SAMU: **192**

Corpo de Bombeiros: **193**

Maternidade Darcy Vargas: **3461-5700**

Banco de Leite (MDV): **3461-5704**

Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria:
3145-1600

Ligue Web Saúde/Joinville: **3481-5165**

Delegacia da Mulher: **3481-3628**