


FLUXOGRAMA - Avaliação de Icterícia Neonatal na Atenção Primária na primeira semana de vida (RN entre 2º e 5º dia de vida)



Zona 1. Icterícia de cabeça e pescoço (BT = 6mg/dl)


Zona 2. Icterícia até no umbigo (BT = 9mg/dl)

Zona 3. Icterícia até os joelhos (BT = 12mg/dl)

Zona 4. Icterícia até os tornozelos e/ou antebraço (BT = 15mg/dl)

Zona 5. Icterícia até região plantar e palmar (BT = 18mg/dl ou mais)

Obs.: Os níveis de bilirrubina se elevam para 18 mg/dL (308 mcmmol/L), até o 3º ou 4º dia de vida (7 dias nos recém-nascidos asiáticos), e diminuem a seguir. Sugere-se uma avaliação criteriosa neste período.



**** Agendamento de Bilirrubina Total (urgente) :** contato telefônico, preferencialmente até às 11:00h, com Laboratório Municipal (3489-7050) para vaga no dia. Agendar via olostech após disponibilização da vaga - **somente para médicos.**

NOTA: Considera-se que a exposição solar com intuito de reduzir a icterícia, que é orientada culturalmente, pode não ser efetiva e, ainda, é prejudicial pelo risco de exposição solar desprotegida. A melhora observada em alguns pacientes é ocasionada pelo equilíbrio obtido pela maturidade do Rn e não pela exposição por 5 a 10 minutos. Importante enfatizar que mesmo sendo filtrado, os raios violetas e infravermelho, foram necessários pelo menos 5 horas de exposição ao sol para as crianças de baixo risco para kernicterus. O uso da luz solar filtrada no tratamento da hiperbilirrubinemia não possui evidências para uso no Brasil. É totalmente contraindicada à exposição do recém nascido à luz solar direta para o tratamento da hiperbilirrubinemia indireta, assim como não há evidências para a colestase (hiperbilirrubinemia direta).

Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria - **Guia de Fotoproteção na Criança e Adolescente**, 2017. <https://www2.isend.com.br/iSend/external/magazine?encrypt=856C7AD3F35DE85DA917FC6D79749975342476CD B528F629880FDD92D0E28577>

É totalmente contraindicado fazer banho de sol para o amarelão, mesmo para a icterícia fisiológica. O sol foi a fonte original para a ideia da fototerapia, porém são necessárias várias horas de exposição ao sol para se conseguir uma efetiva redução da icterícia. Além disso, apenas uma fração da luz solar (a luz azul) é responsável por diminuir os níveis de bilirrubina. Deste modo, não é recomendada a realização de banho de sol para reduzir o amarelão. Se a criança apresenta alterações da cor da pele e do branco dos olhos para amarelo, ela deve ser avaliada pelo pediatra e, quando indicado, colher exames para avaliar se existe a indicação de realizar a fototerapia dentro do hospital, com uma fonte de luz segura.

Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria - Sol na Medida Certa.
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/20243c-Sol_na_medida_certa.pdf

Em sua descrição original de fototerapia, demonstrou que a exposição de recém-nascidos à luz do sol reduziria o nível de bilirrubina sérica. Embora a luz solar forneça irradiância suficiente em a banda de 425 a 475 nm para fornecer fototerapia, as dificuldades práticas envolvidas em expor com segurança um recém-nascido nu para o sol dentro ou fora (e evitando queimaduras solares) impede o uso de luz solar como uma ferramenta terapêutica confiável e, portanto, não é recomendado.

Fonte: American Academy of Pediatrics. **Management of Hyperbilirubinemia in the Newborn Infant 35 or More Weeks of Gestation.** Pediatrics (Official Journal of The American Academy of Pediatrics). Publication in July/2004. DOI: <https://pediatrics.aappublications.org/content/114/1/297>

O uso de protetores solares com FPS superiores a 30 devem ser recomendados para todos os pacientes, acima de 6 meses, expostos ao sol. Não se deve realizar exposição ao SOL sem o uso adequado de protetores solares. Crianças abaixo de 06 meses não devem se expor diretamente ao sol e não devem fazer uso regular de fotoprotetores.

Fonte: Consenso Brasileiro de Dermatologia - **Fotoproteção no Brasil: Recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria.** 2012/2013.
<https://issuu.com/sbd.br/docs/consensob.fotoproteoleigo-web?e=0/6449812>