

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

Emissão 2013	Próxima Revisão 31/08/2028	POP.SES.RAS.001	Versão nº 05	Página 1/17	Anexos 00
Revisão 31/08/2026					

Procedimento: Higiene das mãos

Gerências responsáveis pelos serviços executantes: Gerências de Distritos Sanitário, Gerência de Enfermagem, Gerência de Serviços Especiais, Gerência de Urgência e Emergência, Gerência de Vigilância em Saúde, Gerência de Vigilância Sanitária, Gerência Técnica de Odontologia.

Serviços executantes: Todas as Unidades e Serviços de Saúde

Profissionais executantes: Enfermeiros(as), técnicos(as) e auxiliares de enfermagem, cirurgiões-dentistas, auxiliares e técnicos(as) em saúde bucal, médicos(as) e demais profissionais de saúde com atuação assistencial, conforme competências legais, atribuições funcionais e etapas previstas neste POP.

Objetivo: Padronizar as técnicas de higiene das mãos e fricção antisséptica para promover a remoção da microbiota transitória e a redução da microbiota residente.

Recursos necessários:

- Lavatório: pia exclusiva para higiene das mãos dotada de torneira com acionamento que dispense o contato manual (automática, pedal ou cotovelo);
- Sabonete Líquido: dispenser abastecido com sabonete ou detergente líquido neutro;
- Preparações Alcoólicas: dispenser com álcool a 70% em gel ou solução com emoliente;
- Papel Toalha: suporte abastecido com papel toalha descartável de fibra virgem;
- Antissépticos Degermantes: soluções para higiene antisséptica (ex: Clorexidina ou PVPI degermante);
- Escovas de Unhas: escovas de uso único com cerdas macias ou esponjas impregnadas;
- Gestão de Resíduos: lixeira com tampa e acionamento obrigatório por pedal para descarte de material comum;
- Sinalização Técnica: fluxogramas educativos ilustrando a técnica correta de higiene afixados junto ao lavatório.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP					
Emissão 2013	Próxima Revisão 31/08/2028	POP.SES.RAS.001	Versão nº 05	Página 2/17	Anexos 00
Revisão 31/08/2026					

1. DEFINIÇÃO

A higiene das mãos define-se como o conjunto de procedimentos técnicos destinados a remover a sujidade, o suor e a oleosidade da pele, bem como a eliminar a microbiota transitória e reduzir a microbiota residente. Este processo compreende tanto a higiene simples (uso de água e sabonete comum) quanto a higiene antisséptica (uso de água e sabonete degermante) e a fricção de preparações alcoólicas a 70%.

Constitui-se como a medida isolada mais eficaz e obrigatória para a prevenção e o controle das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), visando interromper a cadeia de transmissão cruzada de microrganismos entre o profissional, o usuário e o ambiente assistencial, em estrita observância às Boas Práticas de Funcionamento em Saúde (RDC 1002/2025).

Ressalta-se que o uso de luvas não substitui a necessidade da higiene das mãos, devendo o procedimento ser realizado antes e após o uso deste Equipamento de Proteção Individual (EPI).

2. INDICAÇÕES DE USO (QUANDO HIGIENIZAR AS MÃOS)

As indicações abaixo visam interromper a cadeia de transmissão e garantir a segurança biológica nos ambientes dos serviços em saúde.

2.1 USO OBRIGATÓRIO DE ÁGUA E SABONETE LÍQUIDO

- Sempre que houver sujidade visível ou risco de resíduos químicos/biológicos.
- Sujidade Visível: quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas por sangue, saliva, secreções, excreções, outros fluidos corporais, matéria orgânica ou qualquer outra substância perceptível sobre a pele;
- Início e Término: ao iniciar e encerrar o turno de trabalho;
- Fisiologia: antes e após utilizar o banheiro, após tossir, espirrar ou assoar o nariz;
- Alimentação: antes e após as refeições ou preparo de alimentos;
- Medicamentos: antes do preparo e manipulação de medicamentos;
- Saturação: após várias aplicações consecutivas de álcool 70% (sentir as mãos



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP					
Emissão 2013	Próxima Revisão 31/08/2028	POP.SES.RAS.001	Versão nº 05	Página 3/17	Anexos 00
Revisão 31/08/2026					

"pegajosas").

2.2 USO DE ÁLCOOL 70% OU ÁGUA E SABONETE LÍQUIDO

- Para higiene de rotina quando as mãos não apresentarem sujidade visível.
- Antes do Contato: antes de tocar o usuário e iniciar o atendimento clínico;
- Procedimentos: antes de realizar procedimentos assépticos (ex: anestesia, abertura de pacotes estéreis);
- Pós-Exposição: após risco de exposição a fluidos corporais (mesmo sem sujidade visível nas luvas);
- Pós-Contato: após tocar o usuário ou superfícies próximas a ele (equipo, refletor, mocho);
- Desparamentação: imediatamente após a remoção das luvas (estéreis ou não estéreis).

Figura 01. Meus 5 momentos para a higiene das mãos



Fonte: Anvisa, 2026.



Prefeitura de
Joinville

SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP					
Emissão 2013	Próxima Revisão 31/08/2028	POP.SES.RAS.001	Versão nº 05	Página 4/17	Anexos 00
Revisão 31/08/2026					

3. TÉCNICA DE HIGIENE SIMPLES

Passo 1. Retirar obrigatoriamente todos os adornos (anéis, relógios, alianças e pulseiras) antes de iniciar o procedimento, visando eliminar reservatórios de microrganismos que impedem a eficácia da lavagem;

Passo 2. Abrir a torneira (utilizando o acionamento que dispense o contato manual, sempre que disponível) e molhar as mãos, evitando o contato direto com a cuba da pia ou com a estrutura da torneira;

Passo 3. Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido neutro para cobrir toda a superfície das mãos e punhos;

Passo 4. Ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as vigorosamente entre si para garantir a cobertura total do sabonete;

Passo 5. Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos para limpar os espaços interdigitais, e repetir o processo com a mão oposta;

Passo 6. Entrelaçar os dedos frontalmente e friccionar os espaços interdigitais (região entre os dedos) com movimentos para cima e para baixo;

Passo 7. Esfregar o dorso dos dedos de uma mão contra a palma da mão oposta, mantendo os dedos entrelaçados e realizando movimentos de vai-e-vem;

Passo 8. Friccionar o polegar direito com o auxílio da palma da mão esquerda, utilizando movimentos circulares, e repetir a manobra no polegar esquerdo.

Passo 9. Friccionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita (posicionada em concha), realizando movimentos circulares, e repetir o processo com a mão oposta.

Passo 10. Esfregar o punho esquerdo com o auxílio da palma da mão direita, realizando



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP					
Emissão 2013	Próxima Revisão 31/08/2028	POP.SES.RAS.001	Versão nº 05	Página 5/17	Anexos 00
Revisão 31/08/2026					

movimentos circulares, e repetir a ação no punho direito;

Passo 11. Enxaguar as mãos e punhos abundantemente, removendo todos os resíduos de sabonete no sentido dos dedos para os punhos, evitando tocar na torneira ou na pia;

Passo 12. Secar as mãos com papel-toalha descartável, iniciando pelas mãos e finalizando pelos punhos. No caso de torneiras com contato manual, utilizar obrigatoriamente o papel-toalha para realizar o fechamento do fluxo de água;

Passo 13. Garantir que todo o procedimento de higiene simples tenha duração mínima de 40 a 60 segundos para assegurar a eficácia microbiológica.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP					
Emissão 2013	Próxima Revisão 31/08/2028	POP.SES.RAS.001	Versão nº 05	Página 6/17	Anexos 00
Revisão 31/08/2026					

Figura 02. Como higienizar as mãos com água e sabonete



Fonte: Anvisa, 2012.

Nota (RDC 1002/2025):

O uso de preparação alcoólica a 70% substitui a lavagem das mãos com água e sabonete líquido quando estas não estiverem visivelmente sujas. Sua aplicação é obrigatória antes e após o contato com o paciente, antes de calçar luvas e após retirá-las, e após o contato com superfícies e equipamentos diagnósticos/clínicos próximos ao paciente.



Prefeitura de
Joinville

SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP					
Emissão 2013	Próxima Revisão 31/08/2028	POP.SES.RAS.001	Versão nº 05	Página 7/17	Anexos 00
Revisão 31/08/2026					

4. TÉCNICA DE FRICÇÃO ANTISSEPTICA

Passo 1. Certificar-se de que as mãos não apresentam sujidade visível (matéria orgânica, pó ou secreções) antes de iniciar o procedimento. Caso haja sujidade, realizar obrigatoriamente a higiene simples com água e sabonete líquido, conforme o item anterior;

Passo 2. Aplicar uma quantidade suficiente de preparação alcoólica a 70% (gel ou solução com emoliente) na palma da mão, em concha, de modo que cubra toda a superfície das mãos e punhos;

Passo 3. Seguir rigorosamente a mesma sequência de movimentos descrita na Higiene Simples (Palmas → Dorsos → Interdigitais → Articulações → Polegares → Polpas Digitais/Unhas → Punhos), friccionando as mãos até que o produto evapore totalmente;

Passo 4. Aguardar a secagem natural das mãos sem a utilização de papel toalha ou fontes de calor. Garantir que o procedimento dure entre 20 a 30 segundos, considerando que a segurança microbiológica só é atingida quando as mãos estiverem completamente secas após a fricção.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP					
Emissão 2013	Próxima Revisão 31/08/2028	POP.SES.RAS.001	Versão nº 05	Página 8/17	Anexos 00
Revisão 31/08/2026					

Figura 03. Como fazer a fricção antisséptica das mãos com preparações alcoólicas



Fonte: Anvisa, 2026.



Prefeitura de
Joinville

SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP					
Emissão 2013	Próxima Revisão 31/08/2028	POP.SES.RAS.001	Versão nº 05	Página 9/17	Anexos 00
Revisão 31/08/2026					

5. TÉCNICA DE DEGERMAÇÃO CIRÚRGICA

Realizar a degermação cirúrgica com o objetivo de eliminar a microbiota transitória e reduzir a microbiota residente, assegurando efeito residual na pele. Este procedimento é obrigatório para prevenir a contaminação do sítio cirúrgico em intervenções que exijam barreira estéril e técnica asséptica rigorosa.

5.1 INDICAÇÕES E CAMPO DE APLICAÇÃO NA REDE MUNICIPAL

Na rede de saúde de Joinville, este procedimento aplica-se especificamente nos seguintes cenários:

- **Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs):** antes de cirurgias parendodônticas, cirurgias bucomaxilofaciais ambulatoriais, procedimentos de implantodontia e biópsias complexas.
- **Serviço de Reabilitação Estética de Deformidades Craniofaciais (Centrinho):** antes de procedimentos cirúrgicos de correção e intervenções reabilitadoras invasivas.
- **Unidades de Pronto Atendimento (UPAs):** nas salas de sutura e pequenos procedimentos, obrigatoriamente antes de realizar suturas extensas/profundas, acessos venosos centrais, disseções venosas ou desbridamentos cirúrgicos complexos. Na Odontologia de Urgência da UPA, aplica-se antes da realização de exodontias de urgência, drenagens de abscessos faciais/periapicais e estabilização de traumas alvéolo dentários.
- **Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs):** restrito às salas de pequenos procedimentos, exclusivamente antes da realização de pequenas cirurgias ambulatoriais padronizadas no município (como exéreses de cistos/lipomas, biópsias cutâneas e vasectomias ambulatoriais). Na saúde bucal das UBSF, é obrigatório antes de exodontias eletivas, frenectomias, biópsias em cavidade oral e drenagens de abscessos intra orais.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP					
Emissão 2013	Próxima Revisão 31/08/2028	POP.SES.RAS.001	Versão nº 05	Página 10/17	Anexos 00
Revisão 31/08/2026					

Nota:

Para atendimentos de rotina, consultas, exames clínicos, curativos convencionais ou procedimentos odontológicos não cirúrgicos (como restaurações e profilaxias) em qualquer ponto da rede, deve-se realizar apenas a higiene simples (água e sabonete) ou a fricção antisséptica com álcool a 70%.

5.2 ATIVIDADES SEQUENCIAIS

Passo 1. Retirar obrigatoriamente todos os adornos pessoais (anéis, relógios, alianças e pulseiras) antes de se aproximar da pia de degermação;

Passo 2. Proceder ao ajuste correto do gorro (garantindo que cubra totalmente o cabelo e as orelhas) e da máscara cirúrgica antes de iniciar qualquer contato com a água;

Passo 3. Abrir a torneira e regular o fluxo de água de forma a evitar salpicos, molhando completamente as mãos, os antebraços e os cotovelos;

Passo 4. Manter as mãos sempre em nível superior aos cotovelos durante este passo e ao longo de todo o processo de lavagem e enxágue;

Passo 5. Aplicar o antisséptico degermante padronizado (Clorexidina 2% ou PVPI degermante) nas mãos, espalhando o produto de forma homogênea até a altura dos cotovelos. (Nota: no caso de utilização de esponjas descartáveis impregnadas, pressionar a face porosa contra a pele para libertar o antisséptico);

Passo 6. Limpar minuciosamente a região subungueal (sob as unhas) utilizando o limpador de unhas ou as cerdas macias da escova descartável sob a água corrente. (Nota: O uso das cerdas da escova deve ser estritamente restrito às unhas e pontas dos dedos, sendo terminantemente proibido o seu uso na pele das mãos e braços para evitar microlesões e riscos de colonização bacteriana).



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP					
Emissão 2013	Próxima Revisão 31/08/2028	POP.SES.RAS.001	Versão nº 05	Página 11/17	Anexos 00
Revisão 31/08/2026					

Passo 7. Friccionar sistematicamente todas as faces das mãos (palmas e dorsos), os espaços interdigitais, os punhos e os antebraços até o cotovelo;

Passo 8. Garantir o tempo de contato ideal do produto na pele conforme a cronologia cirúrgica: despender de 5 minutos para a primeira antissepsia para a cirurgia do dia e de 2 a 3 minutos para as cirurgias subsequentes;

Passo 9. Enxaguar os membros em água corrente unidirecional, sempre no sentido das mãos para os cotovelos, garantindo a remoção total de toda a espuma e resíduos;

Passo 10. Evitar estritamente que a água que escorreu ou entrou em contato com a região do cotovelo retorne para as mãos já higienizadas;

Passo 11. Fechar a torneira utilizando o dispositivo de acionamento não manual disponível na unidade (comando por cotovelo, joelho, pedal ou sensor fotocélula);

Passo 12. Realizar a secagem dos membros utilizando uma compressa ou toalha estéril, aplicando movimentos puramente compressivos (por pressão), sem friccionar ou esfregar o tecido na pele;

Passo 13. Iniciar a secagem obrigatoriamente pelas mãos e progredir em direção ao antebraço e ao cotovelo, utilizando faces distintas da compressa para cada segmento do membro de forma a evitar a recontaminação das áreas limpas;

Passo 14. Manter os braços flexionados e as mãos elevadas acima da linha da cintura após o término da secagem, aguardando nesta posição até a paramentação definitiva (vestimenta do avental estéril);

Passo 15. Abster-se de tocar em qualquer superfície ou objeto não estéril após o procedimento. (Nota: Caso ocorra qualquer contato ou contaminação acidental, o profissional deve reiniciar todo o processo desde o Passo 1).



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP					
Emissão 2013	Próxima Revisão 31/08/2028	POP.SES.RAS.001	Versão nº 05	Página 12/17	Anexos 00
Revisão 31/08/2026					

Figura 04. Antissepsia ou preparo pré-operatório das mãos



Fonte: Anvisa. Organização Pan-Americana da Saúde. Cartaz “Antissepsia Cirúrgica das Mãos e Antebraços com Produto Degermante (Clorexidina ou PVP-I), 2025.



Prefeitura de
Joinville

SAÚDE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

Emissão 2013	Próxima Revisão 31/08/2028	POP.SES.RAS.001	Versão nº 05	Página 13/17	Anexos 00
Revisão 31/08/2026					

Observações Importantes (Conformidade RDC 1002/2025):

- Luvas vs. Higiene: o uso de luvas não substitui a higiene das mãos. Esta deve ser realizada obrigatoriamente antes do calçamento e imediatamente após a remoção das luvas, para eliminar a carga microbiana decorrente do suor e de possíveis microperfurações.
- Limitação do Álcool 70%: a fricção com álcool gel ou solução alcoólica não remove sujidade. É indicada exclusivamente para mãos visivelmente limpas. Se houver contaminação por sangue, saliva ou fluidos, a lavagem com água e sabonete líquido é obrigatória.
- Barreira Biológica (Unhas): manter as unhas curtas, limpas e sem extensões/unhas artificiais. O espaço sob unhas longas ou artificiais serve como reservatório para patógenos resistentes a antissépticos.
- Adorno Zero (Exigência Normativa): é terminantemente proibido o uso de adornos (anéis, alianças, relógios de pulso e pulseiras) durante o turno de trabalho e procedimentos. Adornos impedem a higiene correta e podem danificar a integridade das luvas.
- Integridade da Pele: O uso frequente de sabonetes degermantes deve ser monitorado. Em caso de lesões ou dermatites, o profissional deve comunicar a coordenação, pois a pele íntegra é a primeira barreira de defesa do trabalhador.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

Emissão 2013	Próxima Revisão 31/08/2028	POP.SES.RAS.001	Versão nº 05	Página 14/17	Anexos 00
Revisão 31/08/2026					

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

CEO: Centro de Especialidades Odontológicas
EPI: Equipamento de Proteção Individual
IRAS: Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde
NGQ: Núcleo de Gestão da Qualidade e Processos
PVP-I: Polivinilpirrolidona-iodo
RDC: Resolução da Diretoria Colegiada
UBSF: Unidade Básica de Saúde da Família
UPA: Unidade de Pronto Atendimento

REFERÊNCIAS

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Folder: higiene das mãos – quando e como fazer**. Brasília: Anvisa, 2012. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/higiene-dasm-aos/cartazes/hm_quandoecomo.pdf/view. Acesso em: 28 nov. 2023.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 42, de 25 de outubro de 2010**. Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de preparação alcoólica para fricção antisséptica das mãos, pelos serviços de saúde do País. Brasília: Anvisa, 2010.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 1002, de 20 de março de 2025**. Dispõe sobre as Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde e de Odontologia. Brasília: Anvisa, 2025.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). **Segurança do paciente em serviços de saúde: higiene das mãos**. 2. ed. Brasília: Anvisa, 2026. (Série Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde). Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br>. Acesso em: 13 ago. 2026.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária; ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **Cartaz: antissepsia cirúrgica das mãos e antebraços com produto degermante (clorexidina ou PVP-I)**. Arte do cartaz: R. V. da Silva. Brasília: Anvisa, 2025.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **Portaria nº 485, de 11 de novembro de 2005**. Aprova a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32) sobre a Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde. Brasília: MTE, 2005.

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. **Resolução CFO nº 277, de 2025**. Dispõe sobre



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP					
Emissão 2013	Próxima Revisão 31/08/2028	POP.SES.RAS.001	Versão nº 05	Página 15/17	Anexos 00
Revisão 31/08/2026					

os parâmetros de biossegurança e infraestrutura nos serviços odontológicos. Brasília: CFO, 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Manual para observadores**: estratégia multimodal da OMS para a melhoria da higienização das mãos. Brasília: OPAS; Anvisa, 2008.

os parâmetros de biossegurança e infraestrutura nos serviços odontológicos. Brasília: CFO, 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Manual para observadores**: estratégia multimodal da OMS para a melhoria da higienização das mãos. Brasília: OPAS; Anvisa, 2008.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:
2013 Comissão de Cirurgões Dentistas e Enfermeiros da Atenção Básica.	2020 Andressa Backes Cristiane Fabris Dissenha Cristiane Soares Giovana da Rosa Goulart Renata Andrade Teixeira Heil Viviane Karina Korovsky	2020 Renata Andrade Teixeira Heil
	2023 Fabiane Cherobin Manuelle Hölscher Belz	2023 Vanessa Cardoso Pacheco
	2026 Juliana Antunes Safanelli; Michelli Ap. Rosin; Roxanne Caroline Alves Lisboa.	2026 Gabriela Neves Buch

Disponível em:
Sistema Eletrônico de Informação (SEI): Processo nº 23.0.177095-2
Site da Prefeitura: <i>Protocolos, POPs e outros documentos da Saúde - Prefeitura de Joinville</i>

Disponível em:
Sistema Eletrônico de Informação (SEI): Processo nº 23.0.177095-2
Site da Prefeitura: <i>Protocolos, POPs e outros documentos da Saúde - Prefeitura de Joinville</i>

Disponível em:
Sistema Eletrônico de Informação (SEI): Processo nº 23.0.177095-2
Site da Prefeitura: <i>Protocolos, POPs e outros documentos da Saúde - Prefeitura de Joinville</i>

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP					
Emissão 2013	Próxima Revisão 31/08/2028	POP.SES.RAS.001	Versão nº 05	Página 16/17	Anexos 00
Revisão 31/08/2026					

ALTERAÇÕES DO DOCUMENTO POP.SES.RAS.001 (VERSÃO 2024 PARA 2026)

Quadro 01. Alterações das versões 2024 para 2026

ÁREA/TEMA	VERSÃO 2024	VERSÃO 2026
Identificação do procedimento	"Higienização das mãos".	Alterado para "Higiene das mãos", conforme novo documento da Anvisa, de 2026.
Base normativa e legal	Baseava-se em legislações e manuais antigos da ANVISA (como a RDC 42/2010) e em referências focadas estritamente na Atenção Básica.	Atualizado e alinhado com a nova RDC ANVISA nº 1002/2025 (Boas Práticas de Funcionamento para Serviços de Saúde e Odontologia). Foram removidos links obsoletos e blogs comerciais, mantendo apenas portarias federais e municipais vigentes.
Objetivo do Procedimento	O foco do objetivo limitava-se a remover a microbiota transitória da pele para prevenção e controle de infecção no contato direto com o usuário.	O objetivo foi ampliado para padronizar tanto a higiene simples quanto a fricção antisséptica e a redução da microbiota residente, com foco explícito no estabelecimento de barreiras microbiológicas severas para a segurança do usuário, do profissional e do ambiente assistencial.
Definições e Regra de Uso de Luvas (EPI)	Trazia uma definição puramente conceitual da higiene das mãos, sem correlacioná-la diretamente com o uso de barreiras físicas descartáveis.	Foi inserida ressalva determinando que o uso subsequente de luvas de procedimento ou cirúrgicas nunca substitui a obrigatoriedade da higiene das mãos, a qual deve ocorrer antes de calçá-las e imediatamente após sua retirada.
Especificação de Recursos e infraestrutura	Exigia recursos básicos descritos de forma simples: pia com água, dispenser com sabonete líquido, papel toalha e álcool gel.	Elevou o critério técnico exigindo "Lavatório: Pia exclusiva para higiene das mãos" (com proibição expressa de descarte de outras substâncias), além de detalhar insumos específicos como soluções antissépticas degermantes (Clorexidina 2% e PVP-I) e álcool em gel a 70% com registro na ANVISA.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP					
Emissão 2013	Próxima Revisão 31/08/2028	POP.SES.RAS.001	Versão nº 05	Página 17/17	Anexos 00
Revisão 31/08/2026					

ÁREA/TEMA	VERSÃO 2024	VERSÃO 2026
Técnica de Degermação Cirúrgica	Inexistente. Não havia nenhuma instrução, menção ou detalhamento sobre o processo de escovação/degermação cirúrgica de mãos e antebraços.	Inclusão completa do Item 5 (Técnica de Degermação Cirúrgica - Descrição das Etapas) , estruturado em um formato prático de atividades sequenciais e contínuas (Passos 01 ao 15) utilizando verbos no infinitivo para padronizar o ato cirúrgico ambulatorial.
Indicações e Campo de Aplicação na Rede Municipal	Tratava a aplicação de forma generalista para "Todas as Unidades de Saúde", sem especificar cenários complexos ou diferenciar os níveis de atenção.	Criação do subitem 5.1 , mapeando cirurgicamente onde e quando aplicar a degermação na rede de Joinville: • CEOs e Centrinho: Obrigatório antes de cirurgias complexas, implantes e biópsias. • UPAs e UBSFs (Medicina/Enfermagem): Obrigatório em salas de pequenos procedimentos antes de suturas profundas, acessos centrais e biópsias. • UPAs e UBSFs (Odontologia): Explicitada a obrigatoriedade antes de exodontias (eletivas ou de urgência), frenectomias e drenagens de abscessos.

Elaborado: NGQ, 2026.

