

Procedimento Operacional Padrão – POP				
Data da Aprovação	Próxima Revisão	Versão	Rotina	Página
10/07/2023	10/07/2025	nº 03	nº 25	01 à 04
Nome do Procedimento: Precaução padrão				
Diretoria: Diretoria de Assistência à Saúde, Diretoria de Políticas de Saúde, Diretoria Técnica				
Gerência: Gerências de Distritos Sanitário, Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial, Gerência de Serviços Especiais, Gerência de Urgência e Emergência, Gerência de Vigilância em Saúde, Gerência de Vigilância Sanitária, Gerência Técnica de Odontologia				
Serviço: Todas as Unidades de Saúde				
Executantes: Todos os profissionais que prestam assistência direta ao usuário, ou profissionais que realizam atividades junto aos usuários				
Objetivo: Reduzir os riscos à saúde ocupacional e à saúde do usuário				
Recursos necessários: • Pia com água para lavagem das mãos; • Dispenser de sabão; • Dispenser de papel toalha; • Sabonete ou detergente líquidos; • Papel toalha; • Álcool 70%; • Lixeira com pedal para descarte de material comum; • Lixeira com pedal para descarte de material infectante; • Caixa de descarte para material perfuro cortantes; • Equipamento individual de proteção (EPI): avental descartável, máscara cirúrgica, luva de procedimento, óculos de proteção ou protetor facial, calçado fechado.				

INDICAÇÃO

Deve ser seguido para todos os usuários e servidores independentemente da suspeita ou não de infecções, conforme indicação descrita abaixo (Figura 01).

Figura 01 – Precaução padrão




Fonte: Anvisa, 2007

DESCRIÇÃO

- **Higienizar as mãos:** lave com água e sabão ou fricção as mãos com álcool a 70% (se as mãos não estiverem visivelmente sujas) antes e após o contato com qualquer usuário (ver POP – Rotina nº 23: Higienização das Mãos) e após a remoção de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) (conforme Figura 02);

Figura 02: Colocação e retirada de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)



Fonte: Cofen, 2020

- **Luvas:** use luvas apenas quando houver risco de contato com sangue, secreções ou mucosas. Calce-as imediatamente antes do contato com o usuário e retire-as logo após o uso, higienizando as mãos em seguida.
 - Sempre que possível, escolha o tamanho de luva adequado para você;
 - Retire anéis, pulseiras ou outras joias de suas mãos. Isso pode danificar as luvas ou dificultar o processo de vesti-las;
 - Verifique a integridade das luvas cuidadosamente. Se você notar rasgos ou outros problemas visíveis, retire-as, lave novamente as mãos e vista luvas novas;
 - Não tocar superfícies e materiais não relacionados a assistência durante o uso de luvas;
 - O uso de luvas não substitui a lavagem das mãos.
- **Óculos e protetor facial:** use óculos e protetor facial quando houver risco de respingos ou contato com sangue ou secreções, para proteção da mucosa de olhos, boca, nariz.
- **Máscara:** use máscara quando houver risco de respingos ou contato com sangue ou secreções, para proteção da mucosa de olhos, boca, nariz.
 - Não utilizar máscara de tecido durante o turno de trabalho, sob nenhuma circunstância;
 - Não reutilize máscaras descartáveis;
 - Troque de máscara quando estiver úmida ou com sujeira aparente;
 - Não toque na frente da máscara durante o uso.
- **Avental:** use avental descartável, de manga longa, quando houver risco de contato de sangue ou secreções nas roupas e superfícies corporais.
 - Certificar-se que o tronco esteja totalmente coberto, incluindo braços e punhos;
 - Vista o avental com a abertura para trás.
- **Calçados fechados:** sempre utilize calçados fechados durante o expediente de trabalho.

Observações:

- Exceto pela máscara, remova o EPI dentro, ou próximo à saída do quarto ou Unidade do usuário. Remova a máscara somente após deixar o quarto do usuário e fechar a porta;
- Caixa perfuro cortante: descarte de seringas, agulhas, lâminas e objetos cortos contusos, sem desconectá-las ou reencapá-las;
- Faz-se necessária a utilização de calça ou roupa que cubra as pernas, para proteção contra respingos, resíduos, etc.;
- Desinfecção de artigos de uso comum: sempre realize assepsia com álcool 70% nos instrumentais utilizados para o exame físico (estetoscópio, termômetro, etc.);
- Realize desinfecção concorrente ou, quando necessário terminal, conforme rotina de limpeza e desinfecção de superfícies (POP Rotina nº 36 – Limpeza e Desinfecção de Superfície);
- Desinfecção dos óculos e protetor facial (EPI): após o uso deve ser lavado com água e sabão, não pode ser substituído pelos óculos para correção da visão, com indicação oftálmica, devem ser associados durante o atendimento. No caso da não adaptação dos óculos de correção com os óculos de proteção, preferir o uso do protetor facial.
- Não se deve circular pelo serviço de saúde utilizando os EPIS;
- Não acumular materiais dentro dos quartos ou à beira do leito, pois esses terão que ser descartados após a saída do usuário.



Referências

1. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde. Gerência de Vigilância e Monitoramento em Serviços de Saúde. **Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020**. Orientações para Serviços de Saúde: Medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). Brasília – SC: 2020.
2. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). **Segurança do Paciente: Higienização das mãos**. Brasília – DF: 2020. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/servicosade/manuais/paciente_hig_maos.pdf>. Acessado em: 17 de março de 2020.
3. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). **Cartaz Precauções**. Brasília – DF: 2007. 21/11/2007. Disponível em: <<http://www.anvisa.gov.br/servicosade/controle/publicacoes.htm>>. Acessado em: 17 de março de 2020.
4. Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). Covid-19. **Orientações sobre a colocação e retirada dos equipamentos de proteção individual (EPIs)**. São Paulo – SP: 2020.
5. World Health Organization (WHO). **Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease (Covid-19): Interim guidance**. 27 Feb. 2020.

Elaborado por	Revisado por	Aprovado por
2013 Comissão de Cirurgiões Dentistas e Enfermeiros da Atenção Básica	2020 Giovana da Rosa Goulart Renata Andrade Teixeira Heil 2023 Fabiane Cherobin Manuelle Hölscher Belz	2023 Vanessa Cardoso Pacheco

Disponível em:

Sistema Eletrônico de Informação (SEI) 23.0.177095-2

Wiki da Prefeitura – https://wiki.joinville.sc.gov.br/index.php/Área:_Saúde

Alteração após Revisão

Versão	Data	Responsável	Alteração
02	2020	Giovana da Rosa Goulart Renata Andrade Teixeira Heil	
03	2023	Manuelle Hölscher Belz	• Inclusão e atualização do texto; • Inclusão da figura 2; • Inclusão da descrição dos EPIs; • Inclusão do quadro de observações.

