

Procedimento Operacional Padrão – POP				
Data da Aprovação	Próxima Revisão	Versão	Rotina	Página
10/07/2023	10/07/2025	nº 03	nº 27	01 à 05
Nome do Procedimento: Prevenção de gotícula				
Diretoria: Diretoria de Assistência à Saúde, Diretoria de Políticas de Saúde, Diretoria Técnica				
Gerência: Gerências de Distritos Sanitário, Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial, Gerência de Serviços Especiais, Gerência de Urgência e Emergência, Gerência de Vigilância em Saúde, Gerência de Vigilância Sanitária, Gerência Técnica de Odontologia				
Serviço: Todas as Unidades de Saúde				
Executantes: Todos os profissionais que prestam assistência direta ao usuário ou profissionais que realizam atividades junto aos usuários, como também, profissionais em contato com acompanhantes que tiverem proximidade menor de dois metros do usuário, com suspeita ou confirmação de infecção com transmissão por gotículas				
Objetivo: Reduzir os riscos à saúde ocupacional e à saúde do usuário por meio de propagação de gotículas maiores que 5µm eliminado por meio de tosse, espirro ou fala				
Recursos necessários: ✓ Pia com água para lavagem das mãos; ✓ Dispenser de sabão; ✓ Dispenser de papel toalha; ✓ Sabonete ou detergente líquidos; ✓ Papel toalha; ✓ Álcool 70%; ✓ Lixeira com pedal para descarte de material comum; ✓ Lixeira com pedal para descarte de material infectante; ✓ Caixa de descarte para material perfuro cortantes; ✓ Equipamento individual de proteção (EPI): avental descartável, máscara cirúrgica, luva de procedimento, óculos de proteção ou protetor facial, calçado fechado.				

INDICAÇÃO


Contato com gotículas eliminadas por via aérea ou por meio de fala, tosse ou espirro. Dentre as doenças que possuem esse modo de transmissão estão: influenza, meningite, coqueluche, difteria, rubéola, caxumba, Covid-19.

DESCRIÇÃO

- ✓ **Higienizar as mãos:** lave as mãos com água e sabonete, antes e após o contato com o usuário (POP Rotina 23 – Higienização das Mãos) e após a remoção de EPIs (Figura 01).



Figura 01 – Colocação e retirada de Equipamento de Proteção Individual (EPI)



Fonte: Cofen, 2020.

- ✓ **Óculos e protetor facial:** use óculos e protetor facial quando houver risco de respingos ou contato com sangue ou secreções, para proteção da mucosa de olhos, boca, nariz.
- ✓ **Máscara:** use máscara sempre que for prestar assistência direta ao paciente, realizar higiene e troca de lençóis, manuseios de equipamentos junto ao leito, ao realizar curativos e sempre que estiver junto ao leito. A máscara poderá ser dispensada se o profissional se mantiver há mais de 1 metro do usuário. As orientações devem ser seguidas pelos acompanhantes.
 - O transporte do usuário deve ser evitado, mas, quando necessário, ele deverá usar máscara cirúrgica durante toda a sua permanência fora do quarto;
 - Não utilizar máscara de tecido durante o turno de trabalho, sob nenhuma circunstância;
 - Não reutilize máscaras descartáveis;
 - Troque quando estiver úmida ou com sujidade aparente;

- Não toque na frente da máscara durante o uso.
- ✓ **Avental:** use avental descartável, quando houver risco de contato com sangue e secreções, ou no manuseio de equipamentos ventilatórios. Coloque-os imediatamente antes do contato com usuário ou com as superfícies e retire-os logo após o uso higienizando as mãos em seguida;
 - Certificar-se que o tronco esteja totalmente coberto, incluindo braços e punhos;
 - Vista o avental com a abertura para trás.
- ✓ **Luvax:** use luvas quando houver risco de contato com sangue e secreções, ou no manuseio de equipamentos ventilatórios. Coloque-os imediatamente antes do contato com usuário ou com as superfícies e retire-os logo após o uso higienizando as mãos em seguida;
 - Sempre que possível, escolha o tamanho de luva adequado para você;
 - Retire anéis, pulseiras ou outras joias de suas mãos. Isso pode danificar as luvas ou dificultar o processo de vesti-las;
 - Verifique a integridade das luvas cuidadosamente. Se você notar rasgos ou outros problemas visíveis, retire-as, lave novamente as mãos e vista luvas novas;
 - Não tocar superfícies e materiais não relacionados a assistência durante o uso de luvas;
 - O uso de luvas não substitui a lavagem das mãos.
- ✓ **Calçados fechados:** sempre utilizar calçados fechados durante o expediente de trabalho.
- ✓ **Quarto privativo:** Manter o paciente em quarto privativo, e, quando não houver disponibilidade, a distância mínima entre dois leitos deve ser de um metro (Anexo 1).

Observações:

- ✓ Exceto pela máscara, remova o EPI dentro, ou próximo à saída do quarto ou unidade do paciente. Remova a máscara somente após deixar o quarto do paciente e fechar a porta;
- ✓ Caixa perfuro cortante: descarte seringas, agulhas, lâminas e objetos corto contusos, sem desconectá-las ou reencapá-las;
- ✓ Faz-se necessária a utilização de calça ou roupa que cubra as pernas, para proteção contra respingos, resíduos;
- ✓ Desinfecção de artigos de uso comum: sempre realize assepsia com álcool 70% nos instrumentais utilizados para o exame físico (estetoscópio, termômetro);
- ✓ Realize desinfecção concorrente ou, quando necessário terminal, conforme rotina de limpeza e desinfecção de superfícies (POP Rotina nº 36 – Limpeza e Desinfecção de Superfície);
- ✓ Desinfecção dos óculos e protetor facial (EPI): após o uso deve ser lavado com água e sabão, não pode ser substituído pelos óculos para correção da visão, com indicação oftálmica, devem ser associados durante o atendimento. No caso da não adaptação dos óculos de correção com os óculos de proteção, preferir o uso do protetor facial;
- ✓ Não se deve circular pelo serviço de saúde utilizando os EPIs;
- ✓ Não acumular materiais dentro dos quartos ou à beira do leito, pois esses terão que ser descartados após a saída do usuário;
- ✓ Realize desinfecção concorrente ou, quando necessário terminal (POP Rotina nº 36 – Limpeza e desinfecção de superfície).



Referências

1. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde. Gerência de Vigilância e Monitoramento em Serviços de Saúde. **Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020**. Orientações para Serviços de Saúde: Medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). Brasília – SC: 2020.
2. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). **Segurança do Paciente: Higienização das mãos**. Brasília – DF: 2020. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/servicosade/manuais/paciente_hig_maos.pdf>. Acessado em: 17 de março de 2020.
3. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). **Cartaz Precauções**. Brasília – DF: 2007. 21/11/2007. Disponível em: <<http://www.anvisa.gov.br/servicosade/controle/publicacoes.htm>>. Acessado em: 17 de março de 2020.
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. **Guia de Vigilância em Saúde**: volume único. 3ª. ed. Brasília – DF: 2019. 740 p.:il. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_saude_3ed.pdf Acessado em: 17 de março de 2020.
5. Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). Covid-19. **Orientações sobre a colocação e retirada dos equipamentos de proteção individual (EPIs)**. São Paulo – SP: 2020.
6. World Health Organization (WHO). **Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease (Covid-19)**: Interim guidance. 27 Feb. 2020

Elaborado por	Revisado por	Aprovado por
2013 Comissão de Cirurgiões Dentistas e Enfermeiros da Atenção Básica	2020 Giovana da Rosa Goulart Renata Andrade Teixeira Heil 2023 Fabiane Cherobin Manuelle Hölscher Belz	2023 Vanessa Cardoso Pacheco

Disponível em:

Sistema Eletrônico de Informação (SEI) 23.0.177095-2

Wiki da Prefeitura – https://wiki.joinville.sc.gov.br/index.php/Área:_Saúde

Alteração após Revisão

Versão	Data	Responsável	Alteração
02	2020	Giovana da Rosa Goulart Renata Andrade Teixeira Heil	
03	2023	Manuelle Hölscher Belz	• Inclusão e atualização do texto; • Inclusão de figura; • Descrição de EPIs.



Precaução para Gotículas



Higienização das mãos



Máscara Cirúrgica
(profissional)



Máscara Cirúrgica
(paciente durante o
transporte)



Quarto privativo

- Higienize as mãos antes e após o contato com o paciente; use óculos, máscara cirúrgica e avental quando houver risco de contato com sangue ou secreções; e descarte adequadamente os perfuro-cortantes.

- Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, o paciente

pode ser internado com outros infectados pelo mesmo microrganismo. A distância mínima entre dois leitos deve ser de um metro.

- O transporte do paciente deve ser evitado, mas, quando necessário, ele deverá usar máscara cirúrgica durante toda sua permanência fora do quarto.