

Procedimento Operacional Padrão – POP				
Data da Aprovação 10/07/2023	Próxima Revisão 10/07/2025	Versão nº 02	Rotina nº 35	Página 01 à 10
Nome do Procedimento: Equipamentos de proteção individual e medidas pessoais de biossegurança				
Diretoria: Diretoria de Assistência à Saúde, Diretoria de Políticas de Saúde, Direção Técnica				
Gerência: Gerências de Distritos Sanitário, Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial, Gerência de Serviços Especiais, Gerência de Urgência e Emergência, Gerência de Vigilância em Saúde, Gerência de Vigilância Sanitária, Gerência Técnica de Odontologia				
Serviço: Todas as Unidades de Saúde				
Executantes: Profissionais das áreas críticas, semicríticas e não críticas e equipe de higienização				
Objetivo: Orientar sobre a correta utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI)				
Recursos necessários: ✓ Luvas; ✓ Máscara; ✓ Avental; ✓ Gorro; ✓ Botas; ✓ Óculos de proteção; ✓ Uniforme; ✓ Protetor auricular; ✓ Protetor solar.				

CONCEITO

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento de Proteção Individual (EPI), conforme a Norma Regulamentadora nº 6, é todo dispositivo de uso individual, destinado a prevenir riscos que podem ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador.

No âmbito dos serviços de saúde, estes equipamentos são barreiras contra a exposição a sangues, excretas, fluídos, patógenos e microrganismos. Devem ser utilizadas por profissionais que prestam assistência direta ao paciente ou realizam alguma atividade em áreas de circulação e permanência de pacientes.

Os EPI's devem ser utilizados pelos profissionais sempre que a sua atividade possa provocar contaminação do sistema ventilatório, roupa, pele e anexos. São compostos por avental ou jaleco, gorro, luva, máscara, óculos de proteção, calça comprida, sapato fechado, sendo recomendado pela NR-06 o sapato de proteção. Além destes itens, fazem parte também dos EPI's o protetor solar para os profissionais que se expõem ao sol e o protetor auricular para os profissionais expostos a ruídos.

Cada profissional deve usar os EPI's conforme a normativa da sua categoria profissional, local de atividade laboral e atividade realizada.

É cabível de exoneração do cargo público, conforme o estatuto dos Servidores Públicos de Joinville, o servidor que não utilizar os equipamentos de proteção individual fornecidos pelo município quando a atividade a ser realizada o exigir.

DESCRIÇÃO

Quadro 01 – Modelos equipamentos de proteção individual e indicação de uso

EPI	Modelos	Indicação de Uso
Avental de chumbo		• Reutilizável e compartilhado após higienização; • Deve ser acondicionado sem dobras; • Utilizar quando houver exposição à radiação; • Deve ser utilizado em conjunto com protetor de tireóide se o avental não contar com esta peça já em anexo; • Substituir quando houver sinais de rasgos, perfurações, ou armazenamento incorreto; • Higienizar semanalmente com água e sabão ou quando houver sujeira; • Em unidades de exames de imagem, pode ser compartilhado com pacientes e acompanhantes quando houver necessidade, sempre após higienização adequada.
Avental descartável		• Uso único e individual; • Utilizar em atividades que possam gerar sujeiras ou riscos de respingos em pequena quantidade, e durante procedimentos não estéreis; • Preferencialmente de manga longa, é indicado para proteger o profissional quando não houver risco de contato com contaminantes ou produtos tóxicos; • Descartar ao final da atividade; • Utilizar em unidades de isolamento protetor com pacientes imunossuprimidos.
Avental descartável impermeável		• Uso único e individual; • Pode ser esterilizado e utilizado em procedimentos assépticos, nesses casos, utilizar técnica de vestir asséptica; • Possui gramatura maior, obrigatoriamente de mangas longas e com elástico ou punhos nas extremidades; • Utilizar em atividades que possam gerar contato com produtos químicos e tóxicos e procedimentos com grande risco de respingos; • Utilizar quando houver risco de contato com contaminantes e em situações de isolamento por patologias transmissíveis por contato e gotículas; • Em setores de coorte, manter o uso ininterrupto durante todo o turno de trabalho, exceto em horários de alimentação e uso do sanitário; • Pode ser utilizado para higienização de materiais e instrumentos contaminados; • Obrigatório em unidades de quimioterapia, durante o manuseio dos quimioterápicos; • Durante o período de 48 horas pós quimioterapia, o profissional que prestar assistência direta ao paciente deverá utilizar avental; • Remover sem tocar a parte externa, dobrando pelo avesso, e descartar com mínimo contato.

Avental impermeável frontal		• Uso compartilhado, reutilizável após higienização adequada; • Utilizar em atividades com grande risco de respingos e contato com líquidos; • Utilizar para limpeza e higienização de instrumentais e materiais na ausência de avental fechado, ou na rotina de materiais de expurgo; • Pode ser utilizado sob avental cirúrgico de pano nos procedimentos que geram grande quantidade de líquidos como partos e cirurgias de grande porte; • Utilizar para limpeza pesada e áreas externas quando houver risco de exposição a produtos químicos ou grande quantidade de líquidos; • Utilizar para diluição de saneantes e manejo de produtos químicos, em conjunto com outros EPI's conforme a atividades específica; • Substituir se rasgos, perfurações, sujidade aparente não removível; • Higienizar com água e sabão e desinfetar com álcool 70% ao final das atividades.
Bota		• Reutilizável e compartilhado após higienização; • Uso recomendado para limpeza pesada ou de áreas externas; • Utilizar em atividades que geram risco alto de lesões perfurante, contundentes ou cortantes nos MMII; • Utilizar em situações em que estará exposto a grande quantidade de líquidos, de qualquer espécie; • Devem ser de material plástico, lavável e totalmente impermeável; • Devem ser limpas com água e sabão e desinfetadas com hipoclorito 1% regularmente ou quando em contato com meio contaminado.
Calça comprida		• Reutilizável e compartilhado após higienização; • Utilizar em atividades que possam gerar respingos ou risco de contato com fluídos orgânicos; • Para situações de risco químico, devem ser de material impermeável, ou seu uso deve ser em conjunto com avental impermeável; • Reduz risco de perfurações em acidentes com material perfuro cortantes; • Substituir quando molhada, rasgada ou com sinais de que o tecido ou material está desgastado, causando maior permeabilidade; • Se o item for de uso pessoal, deve ser higienizado diariamente.
Gorro		• Uso Individual; • Uso único quando descartável, podendo ser reutilizado quando confeccionado em tecido, após higienização adequada; • Utilizar em unidades de coorte de pacientes em isolamento por patologias que gerem aerossóis ou imunossuprimidos durante todo o turno de trabalho; • Uso obrigatório em centro cirúrgico e obstétrico, serviços de nutrição e dietética (preparo, porcionamento e distribuição de refeições), consultório odontológicos e unidades de diálise, durante todo o turno de trabalho; • Utilizar durante ato cirúrgico ou procedimento asséptico de qualquer porte; • Substituir quando molhada, rasgada ou perfurada ou com sinais de sujidade; • O gorro não pode ser substituído por chapéu ou outro item de vestuário.
Jaleco		• Uso individual durante o turno de trabalho, compartilhado se higienizado adequadamente, reutilizável; • Substituir diariamente, ou quando molhado, rasgado, com sujidade visível, ou em situações de urgência em que houver contato com contaminantes; • Preferencialmente de mangas longas;

		• Unidade de laboratório, banco de sangue e serviços de patologia, utilizar mangas longas obrigatoriamente e com punhos ajustados; • Remover sem tocar a parte externa, dobrando-o pelo avesso, e encaminhar para higienização; • Não acondicionar sujo junto a objetos pessoais; • Uso restrito durante a realização de atividades laborais no seu turno de trabalho, sendo seu uso proibido ao acessar refeitórios, banheiros, deslocamento do profissional ou atividades não relacionadas a sua atividade profissional; • Se higienizado em casa, deve ser higienizado separadamente das roupas de uso pessoal.
Luva de limpeza geral		• Reutilizável após higienização; • Indicada para limpeza e descontaminação de instrumentos, equipamentos e superfícies; • Descartar quando rasgadas ou perfuradas; • Após o seu uso, deve-se realizar a lavagem das luvas com água e sabão conforme técnica de lavagem das mãos e desinfetar com solução de hipoclorito de sódio a 1% por 30 minutos, lavar novamente com água e sabão e secar ao ar de ponta cabeça, durante 12 horas; • Devem ser utilizadas luvas com cores diferentes, uma para limpeza e desinfecção das superfícies e outra para os instrumentais.
Luva de vinil		• Indicada para profissionais que têm alergia a látex ou talco; • Uso único e individual; • Utilizar como barreira para prevenir o contato direto das mãos e antebraços com material contaminado e fluídos corporais; • Ao manipular membranas mucosas ou pele não íntegra de todos os pacientes; • Ao realizar procedimentos em equipamentos ou superfícies contaminadas com sangue ou outros fluídos corporais; • Ao realizar procedimentos invasivos não estéreis e exame físico; • Ao manusear itens de uso do paciente, como lençol, papagaio, comadre; • Não se locomover ou deslocar-se pela unidade utilizando luvas, exceto ao transportar paciente quando haja risco de sangramento, estiver entubado, agitado ou em isolamento.
Luva descartável de látex		• Uso único e individual; • Realizar a troca da luva sempre que finalizar uma atividade ou procedimento, utilizando uma luva para cada atividade ou procedimento, bem como para cada paciente; • Utilizar como barreira para prevenir o contato direto das mãos e antebraços com material contaminado e fluídos corporais; • Ao manipular membranas mucosas ou pele não íntegra de todos os pacientes; • Ao realizar procedimentos em equipamentos ou superfícies contaminadas com sangue ou outros fluídos corporais; • Ao realizar procedimentos invasivos não estéreis e exame físico; • Ao manusear itens de uso do paciente, como lençol, papagaio, comadre; • Não se locomover ou deslocar-se pela unidade utilizando luvas, exceto ao transportar paciente quando haja risco de sangramento, estiver entubado, agitado ou em isolamento;
Luva plástica descartável		• Uso único e individual; • Luva esterilizada, quando embalada individualmente, realizar técnica asséptica para calçar; • Ao realizar exames ginecológico;

		• Utilizar para aspiração de via aérea; • Pode ser utilizada sob a luva de látex para minimizar surgimento de alergias, quando não houver luvas antialérgicas.
Luvax estéril		• Uso único e individual; • Utilizar para procedimentos cirúrgicos e procedimentos estéreis/críticos/invasivos; • Utilizar técnica asséptica para calçar; • Realizar troca se rasgos, perfurações ou a cada 120 minutos durante ato cirúrgico; • Utilizar somente se dentro do prazo de validade da esterilização.
Máscara cirúrgica descartável		• Uso único e individual; • Sempre que houver possibilidade de respingos de material biológico ou produtos químicos em mucosas do nariz e boca; • Sempre que o profissional entrar em quarto de paciente com patologias de transmissão por gotículas (exemplos: meningites bacterianas, coqueluche, difteria, caxumba, influenza). • Ambientes com odor fétido; • Limpeza e desinfecção de superfícies em áreas de construção e reformas para evitar a inalação do pó; • Utilizar por no máximo quatro horas e descartar; • Substituir quando molhada ou com sujidade visível; • Cobrir sempre boca e nariz; • A máscara não deve ficar pendurada no pescoço ou dobrada no bolso. • Indicada para uso do paciente durante transporte, ou em situações em que não seja possível manter isolamento em casos de doenças transmitidas por aerossóis.
Máscara N95 – PFF2		• Uso individual; • Sempre que houver risco de inalação de aerossóis químicos ou orgânicos; • Utilizar sempre que prestar assistência a paciente em isolamento respiratório (Tuberculose, Varicela Zoster, Sarampo, Covid 19 e H1N1, intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais, broncoscopias); • Sempre que manipular quimioterápicos, imunoterápicos e medicamentos que possam gerar aerossóis ou toxicidade (Ganciclovir); • Descartar quando danificadas, molhadas, quando a respiração do profissional se tornar difícil ou quando contaminadas por sangue ou fluidos corpóreos; • Utilizar em atividade clínica e/ou manipulando instrumentos e materiais ou substâncias tóxicas; • Não dobrar a máscara, pois reduz sua eficácia, quebrando as fibras filtrantes; • Evitar o uso de barba e bigode, pois reduz a eficácia da máscara, porque impede o correto ajuste e vedação da máscara no rosto.

Óculos de proteção		• Reutilizável e compartilhado após higienização; • Preparo e diluição de saneantes e produtos químicos; • Limpeza de áreas que estejam acima do nível da cabeça, que possam gerar queda de partículas, líquidos ou poeira; • Sempre que realizar uma atividade onde houver risco de respingos, poeira e geração de fragmentos e partículas; • Utilizar quando houver risco de contaminação por matéria orgânica e/ou produtos tóxicos; • Higienizar com água e sabão após o uso; • Substituir quando apresentar rachaduras, manchas não removíveis ou riscos que impeçam a visão; • Não pode ser substituído por óculos de correção da visão.
Pijama cirúrgico/profissional		• Uso individual durante o turno de trabalho, compartilhado se higienizado adequadamente, reutilizável; • Uso restrito durante a realização de atividades laborais no seu turno de trabalho, sendo seu uso proibido no deslocamento do profissional fora da unidade de trabalho ou atividades não relacionadas a sua atividade profissional; • Seu uso deve ser em conjunto com avental descartável ou cirúrgico quando necessário; • Substituir diariamente, ou quando molhado, rasgado, com sujidade visível, ou em situações de urgência em que houver contato com contaminantes; • Unidade de laboratório, banco de sangue e serviços de patologia, utilizar mangas longas obrigatoriamente e com punhos ajustados; • Remover sem tocar a parte externa, dobrando-o pelo avesso, e encaminhar para higienização; • Não acondicionar sujo junto a objetos pessoais; • Em unidades limpas (centro cirúrgico e obstétrico, UTI, CME), deve ser de uso exclusivo durante o turno de trabalho, e restrito às áreas fechadas, sendo obrigatório a troca ao sair do setor, ou no retorno ao setor quando em situações de transporte de pacientes; • Utilizar cores distintas para unidades limpas.
Propés		• Uso único e individual; • Utilizar em unidades limpas, quando não houver sapato de uso exclusivo para o local (centro cirúrgico e obstétrico, CME); • Utilizar quando houver restrição de uso de sapato fechado; • Substituir quando apresentar rasgos, perfurações, estiver molhado ou com sujidade visível; • Remover ao sair das áreas limpas, ir ao banheiro ou circular em área de descarte de resíduos e copas internas.
Protetor auricular		• Uso único e reutilizável; • Existem vários modelos, devendo ser condizente com o nível de ruído (seguir orientação do setor de medicina do trabalho); • Utilizar em locais de geração de ruídos, e durante atividades como reformas e obras das unidades de saúde; • Centrais de esterilização de materiais podem ter indicação de uso, consultar medicina do trabalho.

Protetor de tireoide de chumbo		• Reutilizável e compartilhado após higienização; • Deve ser acondicionado sem dobras; • Utilizar quando houver exposição à radiação; • Deve ser utilizado em conjunto com avental de chumbo, se o avental não contar com esta peça já em anexo; • Substituir quando houver sinais de rasgos, perfurações, ou armazenamento incorreto; • Higienizar com água e sabão regularmente e com água e sabão semanalmente; • Em unidades de exames de imagem, pode ser compartilhado com pacientes e acompanhantes quando houver necessidade, sempre após higienização adequada.
Protetor facial		• Reutilizável e compartilhado após higienização; • Preparo e diluição de saneantes e produtos químicos, em conjunto com máscara PFF2; • Limpeza de áreas que estejam acima do nível da cabeça, que possam gerar queda de partículas, líquidos ou poeira; • Sempre que realizar uma atividade onde houver grande risco de respingos, poeira e geração de fragmentos e partículas; • Recomendado para unidades de diálise e cirurgias de grande porte; • Higienizar com água e sabão após o uso; • Substituir quando apresentar rachaduras, manchas não removíveis ou riscos que impeçam a visão.
Protetor solar		• Uso compartilhado; • Aplicar sempre que realizar atividades externas, independente de incidência solar ou não; • Observar validade do produto; • Preferencialmente utilizar em conjunto com medidas físicas de proteção como roupas de manga longa (preferencialmente claras) e chapéu.
Sapatos		• Uso individual e reutilizável; • Uso recomendado para profissionais que prestam assistência direta ao paciente; • Deve ser fechado minimamente cobrindo o peito do pé e laterais; • Utilizar em atividades que possam gerar respingos ou risco de contato com fluídos orgânicos, bem como acidentes com perfuro cortantes; • Para situações de risco químico, devem ser de material impermeável; • Em unidades limpas (centro cirúrgico e obstétrico, UTI, CME...), preferencialmente, deve ser de uso exclusivo durante o turno de trabalho, e restrito as áreas fechadas.

Notas

- Utilização de máscaras cirúrgicas sobrepostas: é **contraindicado**, pois não há garantia de melhor eficácia;
- Utilização de máscara PFF2 sobreposta a máscara cirúrgica: é comprovado que o ajuste e vedação da máscara PFF2 fica prejudicado, permitindo maior permeabilidade nas bordas na máscara, por falta de contato adequado com a pele, podendo aumentar o risco de contágio.



Orientações conforme a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde

A Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32) tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Dentre as medidas básicas de proteção constantes na NR-32, podem ser citados:

- ✓ Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação médica obrigatória no ambulatório do servidor com emissão de documento de liberação para o trabalho;
- ✓ O empregador deve vedar o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho, bem como o consumo de alimento nos postos de trabalho (exceto copa), a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim e o uso de calçados abertos;
- ✓ Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos, químicos, tóxicos ou físicos, devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto.
- ✓ Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual;
- ✓ Os equipamentos de proteção individual, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição.

Quadro 02 – Medidas pessoais de biossegurança

Medidas	Indicação e Recomendação
Cabelo	• Manter cabelos presos ou curtos, durante todo o turno de trabalho; • Quando não houver comprimento para prendê-lo, é recomendado o uso de gorro durante realização de procedimentos; • Cabelos com grande comprimento, devem ser presos de modo a evitar que as pontas caiam para frente durante as atividades.
Barba/ Bigode	• É recomendado que a barba, se mantida, seja curta permitindo ser totalmente coberta por máscara cirúrgica; • Em caso de utilização de máscara PFF2, é recomendado a remoção, pois os fios da barba impedem o contato com a pele e a adequada vedação da entrada de aerossóis pelas bordas da máscara.
Brincos	• Utilizar brincos pequenos, que não ultrapassem o tamanho do lóbulo da orelha; • Evitar o uso de brincos em unidades de coorte e centro cirúrgicos e obstétricos; • Quando em uso de gorro, cobrir os brincos mesmo que pequenos.
Anéis e pulseiras	• Evitar o uso de anéis e pulseiras durante o turno de trabalho para atividades assistenciais ou de limpeza do ambiente; • Aconselhável o uso de alianças sem ranhuras ou pedras incrustadas; • Remover anéis e pulseiras sempre que for realizar a técnica cirúrgica de higienização das mãos; • Durante a higienização simples das mãos com sabão ou solução alcoólica, garantir que a aliança permita a limpeza abaixo do adorno, e realizar a secagem completa do mesmo ao final da higienização; • Remover anéis e pulseiras sempre que calçar luvas, por risco de rasgos e perfurações nas luvas; • Uso permitido com parcimônia para atividades administrativas sem contato com paciente.



Relógio	• Permitido para profissionais das áreas administrativas; • Deve ser material de bolso para profissionais que realizam cuidados e assistência ao paciente; • Evitar relógios com múltiplos encaixes, detalhes e incrustações.
Mãos	• Manter unhas curtas e com esmalte íntegro; • Evitar uso de unhas postiças, prolongamentos, alongamentos ou outros meios de extensão de unhas; • Utilizar camada simples de esmalte, e evitar o uso de adereços afixados nas unhas; • Em caso de lesões abertas nas mãos, manter curativo limpo e seco, preferencialmente impermeável, e proteger o local durante todo o turno de trabalho quando tratar-se de profissional da saúde ou agente de higienização da unidade (após liberação médica); • O uso de álcool gel e afins, não substitui a lavagem das mãos, e deve ser realizada somente quando não houver sujidade visível ou pia disponível para higienização simples das mãos com água e sabão.
Sapatos abertos	• É contraindicado para profissionais atuantes nas unidades de saúde, em qualquer categoria profissional (agente de saúde, técnicos de laboratório, radiologia, enfermagem, enfermeiros, médicos, zelador, copeira, agente administrativos, etc.); • Em situações que se faz necessário o uso, por lesões em MMII ou problemas com o sapato fechado, recomenda-se utilizar propés descartáveis.

REFERÊNCIAS

1. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). **Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies**. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: Anvisa, 2012.
2. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). **Segurança do Paciente em Serviços de Saúde: Higienização das Mãos**. Brasília – DF: Anvisa, 2009. 105p.
3. BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo para prática de higiene das mãos em serviços de saúde**. Elaborado pela Equipe técnica da ANVISA. Brasília – DF: 2013.
4. BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **Norma Regulamentadora nº 06 (NR 06): Equipamento de Proteção Individual – EPI**. Brasília – DF: 2015.
5. BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **Portaria nº 485, de 11 de novembro de 2005**. Aprova a Norma Regulamentadora nº 32 (NR 32): Segurança e saúde no trabalho em estabelecimentos de saúde. Brasília – DF: 2005.
6. JOINVILLE. Gabinete do Prefeito. **Lei Complementar nº 266, de 05 de abril de 2008**. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Joinville, das autarquias e das fundações públicas municipais. Joinville-SC: 2008.
7. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). [Tradução de Sátia Marine]. Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). **Manual para Observadores: Estratégia multimodal da OMS para a melhoria da higienização das mãos**. Brasília – DF: 2008.

Elaborado por	Revisado por	Aprovado por
2013 Comissão de Cirurgiões Dentistas e Enfermeiros da Atenção Básica	2023 Fabiane Cherobin Manuelle Hölscher Belz	2023 Vanessa Cardoso Pacheco

Disponível em:
Sistema Eletrônico de Informação (SEI) 23.0.177095-2
Wiki da Prefeitura – https://wiki.joinville.sc.gov.br/index.php/P%C3%A1gina_principal

Alteração após Revisão			
Versão	Data	Responsável	Alteração
02	2023	Manuelle Hölscher Belz	• Correção e atualização do texto; • Inserção de figuras; • Inclusão de EPI's; • Inclusão de medidas pessoais de biossegurança.