

Procedimento Operacional Padrão – POP				
Aprovação 30/04/2025	Revisão 30/04/2027	Versão nº 05	Rotina SES.DAS/DPS/DT nº 51	Páginas 7
Nome do Procedimento: Como Realizar Teste Rápido para Detecção de Gravidez (TRG)				
Gerência(s) Responsável(eis) pelo(s) Serviço(s) Executante(s): Gerência da Atenção Primária Distrito Centro, Gerência da Atenção Primária Distrito Norte, Gerência da Atenção Primária Distrito Sul (SES.DSU), Gerência de Serviços Especiais, Gerência de Urgência e Emergência e Articulação Hospitalar, Gerência de Assistência Farmacêutica e Laboratório, Gerência Técnica de Odontologia, Gerência de Vigilância em Saúde.				
Serviço(s) Responsável(eis) Pela Execução do POP: Todas as Unidades de Saúde				
Cargo(s) Responsável(eis) Pela Execução das Tarefas: Enfermeiros, Farmacêuticos, Médicos, Odontólogos e Técnicos de Enfermagem sob supervisão do Enfermeiro, com curso e certificação pela Plataforma TeleLab do Ministério da Saúde				
Objetivo: Orientar quanto a realização do teste para detecção de gravidez nos casos de suspeita, violência sexual, início de método anticoncepcional de efeito prolongado injetável, inserção de DIU ou dispositivo contraceptivo subcutâneo				
Recursos necessários: → Computador; → Acesso à Internet; → Equipamento e material para higienização das mãos, conforme Manual de Biossegurança atualizado; → Luvas de procedimento; → Kit diagnóstico para testagem de β-HCG urinário; → Frasco para coleta da urina; → Lixeiras para descarte de acordo com o Manual de Biossegurança.				

CONCEITO

O Teste Rápido de Gravidez (TRG) detecta a presença do Hormônio Gonadotrofina Coriônica humana (HCG) na urina da mulher, o qual é liberado pelo saco embrionário e dobra seus níveis em média a cada 2 ou 3 dias durante as primeiras semanas da gestação. O Teste é de uso único e pode ser realizado e avaliado pela usuária e/ou avaliado pelo profissional na Unidade de Saúde.

Público alvo: Mulheres em idade fértil

Realização em Criança e Adolescentes

Crianças e adolescentes com idade até 13 anos, 11 meses e 29 dias, é necessário que o profissional esteja atento para uma abordagem adequada, considerando qualquer relato de atividade sexual como uma violência sexual. Confirmada ou não a gravidez nesta faixa etária, é obrigatório notificar o caso como suspeita de violência sexual em formulário específico, realizar boletim de ocorrência *on-line* e comunicar ao Conselho Tutelar, independente de sexo consensual ou não, vida sexual ativa prévia, ou relacionamento estável, conforme Protocolo Aconchegar (Processo SEI Nº 21.0.023924-9), sendo a criança ou adolescente liberado apenas mediante a presença de responsável legal, e se possível, questionando a criança sobre o possível abusador, com a intenção de excluir que o abuso possa ter sido causado por pai, padrasto, ou outro responsável legal próximo a criança.

Apesar da Circular nº 0014504984/2022 – SES.UGE.NARAS (Processo SEI Nº 22.0.334927-6), que estabelece que adolescentes de 12 a 17 anos, 11 meses e 29 dias tem direito a receber qualquer atendimento em unidade de saúde sem a presença de um responsável, no caso de relações sexuais, deve-se considerar o seguinte, a depender da faixa etária:

- até 13 anos 11 meses e 29 dias: conforme orientações disponíveis no SEI mencionado acima, deve garantir-se a realização do Teste Rápido independente da presença do responsável legal, e a liberação do menor SOMENTE com a presença do responsável legal, independente do resultado do exame (incluem-se aqui todos os exames para detecção de ISTs)
- de 14 anos até 17 anos 11 meses e 29 dias: conforme orientações disponíveis no SEI mencionado acima, deve garantir-se a realização do Teste Rápido independente da presença do responsável legal, se teste reagente, a liberação do menor SOMENTE com a presença do responsável legal, (incluem-se aqui todos os exames para detecção de ISTs).

Indicação

- Atraso menstrual igual ou maior a sete dias;
- Inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU), implante anticoncepcional (Implanon®) ou início de qualquer outro método contraceptivo sistêmico de efeito prolongado (anticoncepcional injetável) para usuárias com ou sem atraso menstrual;

- Qualquer suspeita de violência ou abuso sexual, em que houver suspeita de gravidez ou atraso menstrual como descrito acima.

Nota: Para situações em que o resultado for negativo e a usuária permanecer com suspeita de gravidez, realizar novo teste em sete dias.

Contraindicação

- Esquecimento da pílula anticoncepcional;
- Atraso na administração de anticoncepcional injetável; ou
- Imediatamente após relação sexual desprotegida.

Nestes casos, deve ser orientado o uso de preservativo ou evitar relações sexuais até a finalização da cartela de anticoncepcional ou nova injeção, aguardando o atraso menstrual de sete dias, que por ventura possa ocorrer (conforme SEI 23.0.293817-2 Fluxogramas sugestivos de manejo no atraso da aplicação dos anticoncepcionais injetáveis).

Profissionais aptos a realizarem o teste rápido e o laudo

Estão aptos a realizar o teste rápido para detecção de gravidez, os profissionais Enfermeiros, Farmacêuticos, Médicos, Odontólogos e Técnicos de Enfermagem, estes últimos sob supervisão do Enfermeiro.


Salienta-se que o técnico de enfermagem apenas realiza o exame, sendo a avaliação do resultado e emissão do laudo (reagente ou não) atividade privativa do Enfermeiro que o supervisiona.

Além da emissão do laudo, a realização e o resultado do teste rápido para detecção de gravidez devem ser registrados em prontuário eletrônico e, quando realizado pelo técnico de enfermagem, deve-se registrar o nome do enfermeiro que avaliou e laudou o exame.

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

- Orientar previamente, se possível, que a usuária colete a primeira amostra de urina pela manhã, porém, não é obrigatório que o teste seja realizado com a primeira amostra, podendo ser realizado em qualquer hora do dia, desde que a usuária permaneça pelo menos duas horas sem urinar;
- Higienizar as mãos, conforme Manual de Biossegurança;

- Reunir o material necessário e orientar a usuária como proceder para coleta;
- Entregar o frasco para a usuária para coletar uma pequena amostra da urina;
- Calçar as luvas de procedimento;
- Após receber o frasco com a urina, imergir a tira no coletor até a linha “*mark line*” e retirá-la após 10-15 segundos;
- Colocar a tira sob material ou superfície plana não absorvente;
- Aguardar a reação na tira e o aparecimento das linhas controle;
- Aguardar o tempo da reação completa de 5 minutos ou conforme recomendação do fabricante, ou as duas linhas aparecerem (para exames reagentes).



Resultado

- Não **reagente (negativo)**: aparece apenas uma faixa na área controle – Linha Controle;
- Reagente (**positivo**): aparece uma faixa na área controle e uma faixa na área teste – Linha Controle e uma Linha Teste;
- Inválido: não aparece a Linha Controle na área controle, o exame deve ser repetido com novo kit teste.

Nota: O Teste Rápido para ser considerado válido deve sempre apresentar a **Linha Controle** visível ao final do Teste, caso contrário, deverá repetir o Teste com outra tira.

Resultado Reagente/Positivo

Para o teste rápido com o resultado positivo, para qualquer faixa etária, recomenda-se o início do Pré-natal no mesmo dia, caso não seja possível, o

agendamento deve ser o mais breve possível, a fim de garantir o pré-natal adequado, e preferencialmente iniciando o pré-natal antes da 12ª semana de gestação.

Recomendações de acordo com o resultado

- Resultado **Positivo**: iniciar o pré-natal o mais breve possível;
- Resultado **Positivo - gravidez indesejada**: encaminhar para atendimento da equipe de referência e de IMEDIATO com o enfermeiro ou médico;
- Resultado **Negativo com manifestação de desejo de engravidar**: agendar consulta para orientações;
- Resultado **Negativo sem manifestação de desejo de engravidar**: agendar consulta de planejamento reprodutivo para escolha e indicação de método contraceptivo;
- Resultado **Negativo, mas a mulher tem quase certeza que está grávida**: repetir o TRG em uma semana.

Registro do Procedimento e Laudo no Sistema Integrado de Gestão (SIG – Saúde Tech)

Evoluir o Procedimento no prontuário eletrônico, emitir o laudo (profissionais de nível superior), seja o resultado negativo ou positivo, inclusive lote e validade do Teste Rápido e registrar conforme Códigos de Procedimento da Tabela SIGTAP descritos no Quadro 01.

O auxiliar/técnico de enfermagem deve registrar o procedimento no prontuário eletrônico, incluindo o nome do profissional enfermeiro que emitiu o laudo, e utilizar os códigos específicos para sua categoria.

Quadro 01. Códigos de Procedimento da Tabela SIGTAP

PROFISSIONAL	CÓDIGO	PROCEDIMENTO
Todos de nível superior, exceto médico	03.01.01.003-0	Consulta de Profissionais de Nível Superior na Atenção Primária (Exceto Médico)
Técnico de enfermagem	99980422	Coleta de teste rápido por técnico de enfermagem
Médico	03.01.01.006-4	Consulta Médica em Atenção Primária
Todos os profissionais	02.14.01.006-6	Teste Rápido de Gravidez



Nota: Todos os profissionais de nível superior devem registrar os dois códigos: Consulta e Teste Rápido de Gravidez. O Técnico de Enfermagem deve apenas registrar o código do Teste Rápido.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva**. Cadernos da Atenção Básica, nº 26. Brasília – DF: 2013;

PREFEITURA DE JOINVILLE. Secretaria da Saúde. Gerência de Gestão Estratégica. Coordenação de Enfermagem. **Protocolo de atendimento às pessoas em situação de violência sexual do município de Joinville / SC**: 2019. Processo SEI 21.0.023924-9, anexo 8226492;

PREFEITURA DE JOINVILLE. Secretaria da Saúde. Gerência de Gestão Estratégica. Núcleo de Apoio à Rede de Atenção à Saúde. **Protocolo para inserção do Dispositivo Intrauterino (DIU)**. Joinville – SC: 2019. Processo SEI 19.0.065839-6, anexo 3700187;

PREFEITURA DE CAMPINAS. Secretaria da Saúde. Manual de Procedimentos Operacionais Padrão (POP). Enfermagem. **POP nº 65: Teste de Gravidez**. Campinas – SP: 2020. Disponível em https://saude.campinas.sp.gov.br/enfermagem/POP_Enfermagem_2020.pdf;

PREFEITURA DE LONDRINA. Secretaria da Saúde. **Procedimento Operacional Padrão nº 27**. Teste Rápido de Gravidez. Londrina – PR: 2021;

PREFEITURA DE JOINVILLE. Secretaria da Saúde. Gerência de Enfermagem, Gestão Assistencial e Núcleo de Gestão Assistencial. Circular nº 0014504984/2022 – **Orientação e esclarecimento sobre os Atendimentos de Saúde no Município de Joinville, incluindo Crianças e Adolescentes desacompanhados e Usuários sem documento de identificação oficial**. Joinville – SC: 2022. Processo SEI 22.0.334927-6;

PREFEITURA DE JOINVILLE. Secretaria da Saúde. Gerência de Gestão Estratégica. Coordenação de Enfermagem. **POP – Rotina nº 18-IST: Testes Rápidos**. Joinville – SC: 2023. Processo SEI 20.0.183593-5;

PREFEITURA DE JOINVILLE. Secretaria da Saúde. Gerência de Gestão Estratégica. Coordenação de Enfermagem. **POP – Rotina nº 23 – Higienização das mãos**. Joinville – SC: 2023. Processo SEI 23.0.177095-2, anexo 0017638831;

PREFEITURA DE JOINVILLE. Secretaria da Saúde. Gerência de Gestão Estratégica. Coordenação de Enfermagem. **POP – Rotina nº 38 – Segregação e acondicionamento de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)**. Joinville – SC: 2023. Processo SEI 23.0.177095-2, anexo 0017639380.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:
2015 Comissão de Enfermeiros da Atenção Básica	2025 NGA Manuelle Hölscher Belz; Willian Waldelino Custódio da Silva.	2025 Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial Vanessa Cardoso Pacheco

Disponível em:
Sistema Eletrônico de Informação (SEI) 20.0.183593-5
Wiki da Prefeitura – https://wiki.joinville.sc.gov.br/index.php/Área:_Saúde