

Procedimento Operacional Padrão – POP				
Publicação	Versão	Numeração	Páginas	Anexos
26/06/2025	nº 01	SES.DAS/DPS nº 54	5	1
Nome do Procedimento: Como Realizar a Notificação de Exposição de Imunobiológicos à Temperatura Inadequada				
Gerência(s) Responsável(eis) pelo(s) Serviço(s) Executante(s): Gerência da Atenção Primária Distrito Centro, Gerência da Atenção Primária Distrito Norte, Gerência da Atenção Primária Distrito Sul, Gerência de Vigilância em Saúde e Gerência de Urgência e Emergência e Articulação Hospitalar				
Serviço(s) Responsável(eis) Pela Execução do POP: Todos que ofereçam serviços em imunização, como Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF), Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Hospitais, Sala central de imunização				
Cargo(s) Responsável(eis) Pela Execução das Tarefas: Equipe de Enfermagem				
Objetivo(s): Orientar a Equipe de Enfermagem Notificação de Exposição de Imunobiológicos a Temperatura Inadequada.				
Recursos necessários: → Computador; → Acesso à internet; → Acesso a Planilha online de notificação; → Acesso ao e-mail (Gmail); → Caneta marca texto e/ou etiqueta adesiva colorida.				

DEFINIÇÃO

O controle diário de temperatura é um procedimento imprescindível para que os produtos termolábeis, sejam de origem farmacêutica ou imunobiológica, que ficam armazenados na rede de frio, não sofram alterações de temperatura durante seu armazenamento. O manuseio inadequado, algum equipamento com defeito ou a falta de energia elétrica interrompem o processo de refrigeração, comprometendo a eficácia dos imunobiológicos, ou seja, comprometendo sua capacidade de ação ou resposta imune adequada.

1. EM CASO DE ALTERAÇÃO DE TEMPERATURA (MOMENTO)

- O profissional deve realizar o controle de temperatura da conservadora de imunobiológicos e anotar no mapa os resultados obtidos, conforme POP SES.DAS/DPS nº 53 - Como Realizar o Controle Diário de Temperatura na Rede de Frio (disponível no Processo SEI Nº 21.0.147752-6).
- Se a temperatura **MOMENTO** estiver inadequada, realizar a ambientação

- Colocar frascos de imunobiológicos lacrados em uma embalagem (pacote plástico transparente) com a seguinte informação:

VACINAS INDISPONÍVEIS PARA USO - AGUARDANDO AVALIAÇÃO		
Nome do profissional:	Data:	Hora:

- Armazenar a embalagem com os imunobiológicos na caixa térmica ambientada (temperatura +2°C a +8°C).
- Comunicar o serviço de Imunização, através dos telefones 3417-1380/3417-1363/3417-1374, que a planilha foi encaminhada por email.
- Conforme o problema apresentado pela conservadora, ocasionalmente será necessário o remanejamento dos imunobiológicos expostos à temperatura inadequada, para a UBSF mais próxima (**a conduta adequada será orientada pelo Serviço de Imunização, via e-mail**).

2. EM CASO DE ALTERAÇÃO DE TEMPERATURA (MÍNIMA E/OU MÁXIMA) - E TEMPERATURA MOMENTO ADEQUADA

- Anotar no mapa de controle diário de temperatura, se a temperatura mínima e/ou máxima estiver inadequada, e comunicar imediatamente ao enfermeiro supervisor e também o Serviço de Imunização, através dos telefones 3417-1380/3417-1363/3417-1374.
- O serviço de imunização orientará a realização do inventário dos imunobiológicos expostos, conforme dados solicitados na planilha (disponível no link [+ Notificação de Exposição Temperatura](#), conforme indicado no item 1)
- Colocar frascos de imunobiológicos lacrados em uma embalagem (pacote plástico transparente) com a seguinte identificação:

VACINAS INDISPONÍVEIS PARA USO - AGUARDANDO AVALIAÇÃO		
Nome do profissional:	Data:	Hora:

- Manter a embalagem com os imunobiológicos na conservadora.
- Realizar a digitação dos dados na planilha online (disponível pelo link: [+ Notificação de Exposição Temperatura](#) conforme indicado no item 1) e comunicar o Serviço de Imunização, através dos telefones 3417-1380/3417-1363/3417-1374, que a planilha foi preenchida.

IMPORTANTE: A avaliação da notificação é realizada pela Rede de Frio Estadual por meio de sistema próprio. Oportunamente, a resposta será encaminhada por email para o estabelecimento notificante.

3. CONDUITAS DA UNIDADE NOTIFICADORA APÓS A RESPOSTA

3.1. Imunobiológicos com recomendação de desprezo imediato:

- Realizar o descarte dos frascos na caixa coletora de perfurocortantes.
- Realizar a baixa dos frascos no sistema SIES e Olostech conforme o tipo de ocorrência, por exemplo: perda por falha no equipamento (seguir orientações fornecidas pelo setor de imunização).

3.2. Imunobiológicos com recomendação de uso até o prazo de validade:

- Identificar todos os frascos com caneta marca texto ou etiqueta adesiva colorida, com o objetivo de sinalizar que aqueles frascos já passaram por uma oscilação de temperatura.
- Retornar os imunobiológicos para o estoque, priorizando-os na aplicação.

3.3. Imunobiológicos com recomendação de uso em até 30 dias:

- Identificar os frascos com a nova validade, contando 30 dias a partir da data de ocorrência da exposição à temperatura inadequada.
- Imunobiológicos com validade do fabricante inferior a 30 dias, não substituir a validade.
- Retornar os imunobiológicos para o estoque, priorizando-os na aplicação.

Neste documento, consideram-se como imunobiológicos as vacinas, os soros heterólogos e as imunoglobulinas fornecidas pelo Programa Nacional de Imunização.

REFERÊNCIA

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. **Manual de Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações**. – 5. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2017. Acesso em: 14 de março de 2025.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:
2024 Área Central de Imunização Georgia Carina Sepka Cani; Miriam F. S. Brikalski de Souza.	2025 Núcleo de Gestão Assistencial Manuelle Hölscher Belz; Willian W. Custódio da Silva	2025 Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial Vanessa Cardoso Pacheco

Disponível em:
Sistema Eletrônico de Informação (SEI): Processo nº 21.0.147752-6
Wiki da Prefeitura: https://wiki.joinville.sc.gov.br/index.php/Área: Saúde



[illegible]