

Procedimento Operacional Padrão – POP				
Aprovação	Revisão	Versão	Rotina	Páginas
03/04/2025	03/04//2027	01	SES.DAS nº 12	18
Nome do Procedimento: Como Aferir e Interpretar os Valores da Pressão Arterial em Criança e Adolescente				
Gerência(s) Responsável(eis) pelo(s) Serviço(s) Executante(s): Gerência da Atenção Primária Distrito Centro, Gerência da Atenção Primária Distrito Norte, Gerência da Atenção Primária Distrito Sul, Gerência de Serviços Especiais e Gerência de Urgência e Emergência e Articulação Hospitalar				
Serviço(s) Responsável(eis) pela Execução do POP: Atenção Primária à Saúde, Atenção Secundária Especializada, Unidades de Pronto Atendimento e SAMU				
Cargo(s) Responsável(eis) pela Execução das Tarefas: Equipe de enfermagem, Educadores Físicos, Fisioterapeutas, Odontólogos, Farmacêuticos e Médicos				
Objetivo(s): Orientar a equipe de saúde no procedimento de aferição de Pressão Arterial (PA) em crianças e adolescentes para reconhecer achados normais esperados para a idade, bem como as anormalidades, servindo de suporte no planejamento do cuidado à criança				
Recursos necessários: → Computador; → Acesso à internet; → Acesso ao Sistema Integrado de Gestão (SIG-SaudeTech); → Estetoscópio; → Esfigmomanômetro infantil e adulto; → Fita métrica; → Régua Antropométrica Infantil (estadiômetro); → Balança pediátrica; → Balança digital antropométrica; → Álcool 70%; → Algodão ou gaze; → Tabela de Percentil de Pressão Arterial Sistêmica; → Caderneta da Criança e Adolescente.				

1. DEFINIÇÃO

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um problema de saúde pública, com um aumento da prevalência mundial também de casos pediátricos, principalmente associada ao sobrepeso e obesidade nessa faixa etária. Pressão Arterial (PA) elevada na infância é um importante fator de risco para doenças crônicas na vida adulta.

A Hipertensão na infância e na adolescência ocorre quando os valores de pressão arterial na aferição são iguais ou maiores que o percentil de 95 (ver item 9). Quando, na primeira aferição, o valor for sugestivo de alteração, deve-se repetir o procedimento por

mais 2 vezes (na mesma consulta) para confirmação da suspeita de hipertensão.

Habitualmente as crianças e os adolescentes hipertensos são assintomáticos, alguns podem apresentar quadro de cefaleia, irritabilidade e alterações do sono.

A hipertensão arterial em crianças e adolescentes pode ser classificada como:

- **Hipertensão primária**, onde a causa é desconhecida, como no caso de obesidade, diabetes, prematuridade, etc; e
- **Hipertensão secundária**, quando se tem uma causa identificável, como doença renal, cardiopatias, hipertireoidismo, etc.

2. FAIXA ETÁRIA RECOMENDADA PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

A aferição da PA deve ser realizada anualmente em crianças com idade ≥ 3 anos e, em **crianças com idade < 3 anos**, deve-se aferir em toda consulta nos casos em que houver obesidade ou algum fator de risco, conforme descritos abaixo:

- História de prematuridade com < 32 semanas ou pequeno para idade gestacional (PIG), muito baixo peso ao nascer, outras complicações neonatais que necessitaram de Unidade de Terapia Intensiva (UTI);
- Cardiopatia congênita;
- Infecção do trato urinário de repetição, hematúria ou proteinúria;
- Malformação urológica, doença renal conhecida ou histórico familiar de doença renal congênita;
- Transplante de órgão sólido;
- Tumor ou transplante de medula óssea;
- Tratamento com medicamentos que aumentam a PA;
- Doenças sistêmicas que costumam causar elevação da pressão arterial (neurofibromatose, esclerose tuberosa, anemia falciforme);
- Evidência de elevação da pressão intracraniana.

3. ORIENTAÇÕES PARA AFERIÇÃO DA PA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

- Conferir se os materiais (manguito e estetoscópio) estão higienizados, caso não estejam, higienizar com auxílio de uma gaze ou algodão e álcool 70%;
- Lavar as mãos;
- Explicar o procedimento ao usuário e a família (quando for atendimento de

crianças);

- Orientar que a bexiga deve estar vazia;
- O usuário deverá realizar descanso prévio de 5 a 10 minutos e sem ter praticado exercícios físicos há pelo menos 60 minutos;
- Avaliar o membro que será aferido a PA, se possui alguma contraindicação, como:
 - Presença de fístula endovenosa;
 - Realização recente de cateterismo;
 - Com plegias;
 - Com punção venosa;
 - Com infusão de líquidos.

A aferição em membros inferiores pode ser realizada através da artéria tibial posterior e é utilizada nas seguintes situações:

- Nas contra indicações para aferição em membros superiores (MMSS), conforme referido acima;
- Sempre que houver impossibilidade de mensuração nos MMSS;
- Quando a PA estiver elevada nos membros superiores, para uma complementação mais acurada do exame;
- Em casos de suspeita clínica de coarctação (estreitamento) da artéria aorta e obstruções vasculares.


Em caso de uso de **esfigmomanômetro oscilométrico automático**, deve-se verificar se o mesmo está calibrado e seguir recomendações do fabricante para aferição correta da PA.

4. ESCOLHA DO MANGUITO CORRETO PARA AFERIÇÃO DA PA EM MMSS


Para escolha do manguito adequado, é preciso primeiramente definir o tamanho do manguito, cujas medidas deverão estar de acordo com a circunferência braquial da criança. Abaixo está descrito como verificar a circunferência correta do braço:

Passo 01. Medir a distância do acrômio ao olécrano com auxílio de uma fita métrica;

Passo 02. Identificar o ponto médio da distância entre o acrômio e o olécrano;



Passo 03. Medir, com auxílio da fita métrica, a circunferência do braço no ponto médio, identificado no Passo 2;




Passo 04. A medida da circunferência do braço no ponto médio entre o acrômio e o olécrano, serve para determinação precisa do tamanho do manguito, cujo **comprimento deve corresponder a cerca de 80% a 100% da circunferência braquial** e sua **largura deve ser de pelo menos 40% da circunferência braquial**.

Exemplo: Criança com circunferência braquial de 20 cm, o comprimento do manguito deverá ter entre 16 e 20 cm e largura de pelo menos 8 cm.



O manguito deverá cobrir pelo menos 2 terços do comprimento do braço.



Observação: No manguito estão descritas as dimensões do produto.



4.1. Tamanho Adequado do Manguito para Aferição da PA

Quadro 01. Tamanhos dos manguitos para medida da Pressão Arterial

Faixa etária	Largura (cm)	Comprimento (cm)	Circunferência máx. do braço (cm)*
Recém nascido	4	8	10
Lactente	6	12	15
Criança	9	18	22
Adulto pequeno	10	24	26
Adulto	13	30	34

IMPORTANTE: Na indisponibilidade do tamanho de manguito exato para aferição da pressão arterial, deve-se escolher sempre o mais próximo da medida adequada, preferencialmente o tamanho um pouco maior do adequado.

5. POSICIONAMENTO DO USUÁRIO PARA AFERIÇÃO DA PA EM MMSS

5.1. Em crianças até 2 anos, 11 meses e 29 dias, recomenda-se verificar a pressão arterial nos MMSS na posição deitada em decúbito dorsal.

Para aferição da PA com o usuário em decúbito dorsal:

- Posicionar o braço para que fique no nível do coração, caso necessário, pode-se usar um travesseiro para apoio;
- O braço deve estar despido;
- Palma da mão voltada para cima;
- Pernas descruzadas.



5.2. Em crianças a partir de 3 anos de idade, aferir a PA na posição sentada.


Para aferição da PA com o usuário sentado, deve-se atentar para:

- Pernas devem ficar descruzadas;
- Pés apoiados no chão, se necessário utilizar uma “escadinha” como apoio para os pés;
- Dorso recostado na cadeira e relaxado;
- Aferir preferencialmente no braço direito;
- O braço deve estar despido e na altura do coração, deve estar apoiado e com a palma da mão voltada para cima.

6. TÉCNICA DA AFERIÇÃO DA PA EM MEMBROS SUPERIORES

Passo 01. Colocar o manguito 2 a 3 cm acima da fossa cubital, sem deixar folgas;

Passo 02. Centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial com a braçadeira desinflada;



Passo 03. Palpar o pulso radial para verificar a Pressão Arterial Sistólica (PAS);



Passo 04. Insuflar o manguito 20-30 mmHg acima do valor correspondente ao desaparecimento do pulso. (ex: pulso desapareceu 110 mmHg, insuflar até 140 mmHg);

Passo 05. Desinsuflar o manguito até voltar a sentir a pulsação, anotar o valor, pois esse será o valor da PAS;

O nível de pressão em que o pulso desaparece e subsequentemente retorna durante a desinflação corresponde a PAS. Recomenda-se aguardar 30 segundos antes de dar continuidade na aferição auscultatória.

Passo 06. Após, palpar a artéria braquial na fossa cubital e colocar a campânula ou o diafragma do estetoscópio, sem compressão excessiva;



Passo 07. Inflar o manguito até ultrapassar no manômetro 20 a 30 mmHg do nível estimado da PAS obtido pela palpação do pulso radial (ex: PAS 140 mmHg, insuflar até

170 mmHg);

Passo 08. Desinflar o manguito lentamente. Após um período de silêncio na ausculta ocorrerá o som inicial, (primeiro som ou fase I de Korotkoff, conforme “Quadro 02. Sons de Korotkoff”) seguido de batimentos regulares, nesse momento verifica-se no manômetro o valor da pressão arterial, este é o pico da pressão arterial (pressão arterial máxima) que ocorre durante a contração cardíaca (sístole). **Assim, determina-se a PAS ou PA máxima;**

Passo 09. Quando ocorre o desaparecimento do som dos batimentos cardíacos na ausculta (fase V de Korotkoff), deve-se verificar a qual valor corresponde no manômetro, o valor encontrado no desaparecimento dos sons determina a **Pressão Arterial Diastólica (PAD) ou PA mínima**. Se os batimentos persistirem até o nível zero, determine a PAD no abafamento dos sons (fase IV de Korotkoff);

Quadro 02. Sons de Korotkoff

SONS DE KOROTKOFF	
Os sons de de Korotkoff são os sons ouvidos (batimentos cardíacos) durante a aferição da pressão arterial através do estetoscópio, conforme as fases descritas abaixo:	
FASE I	Surgimento dos primeiros sons dos batimentos cardíacos (pressão sistólica)
FASE II	São auscultados sons suaves e prolongados. Podem ser inaudíveis
FASE III	São os sons mais intensos e nítidos (pulsação)
FASE IV	São os sons de baixa intensidade e abafados
FASE V	Acontece o desaparecimento dos sons dos batimentos cardíacos (pressão diastólica)

Passo 10. Acompanhar o ponteiro e, após 10 a 20 mmHg do último som auscultado, abrir a válvula completamente para desinflar todo manguito.

Considerações:

- Havendo necessidade de conferir o resultado, deve-se respeitar o intervalo de 1 minuto para repetir o procedimento;
- Nos casos em que o usuário não apresenta histórico de níveis pressóricos anteriores, deve-se aferir a pressão em ambos os braços na primeira consulta e considerar o valor do braço onde se obteve o maior valor da pressão arterial.

7. ERROS NA AFERIÇÃO DA PA DEVIDO A PROBLEMAS NO ESFIGMOMANÔMETRO

- Sistemas inadequadamente calibrados ou testados;
- Defeitos do esfigmomanômetro aneróide ou de coluna de mercúrio: orifício de ar obstruído, calibração alterada, manguito incompletamente vazio, tubulação defeituosa, válvula de deflação com vazamento, mercúrio insuficiente no reservatório ou indicador zero errado;
- Escolha do manguito em desacordo com as medidas do membro.

8. ERROS NA TÉCNICA DA AFERIÇÃO DA PA

- Membro sem apoio correto na aferição;
- Posicionar o manguito em cima ou abaixo do coração ou compressão excessiva do estetoscópio sobre o vaso sanguíneo;
- Mãos do profissional responsável pela aferição da PA e equipamento em temperatura fria, geralmente provocam aumento da pressão sanguínea;
- Sistema acústico danificado;
- Criança agitada ou chorosa durante o procedimento.

9. INTERPRETAÇÃO DOS VALORES DA PA EM PERCENTIL

As tabelas de percentil de PA são usadas atualmente para classificar os valores da PA sistólica e diastólica. **Baseiam-se no sexo, na idade e no percentil de altura da criança** e são adotadas universalmente.

Para a interpretação do percentil da PA em crianças e adolescentes, deve-se utilizar como instrumento a “Tabela Pressão Arterial Sistêmica para MENINOS por Idade e Percentil de Estatura, 1-17 anos” (Anexo 01) ou a “Tabela Pressão Arterial Sistêmica para MENINAS por Idade e Percentil de Estatura, 1-17 anos” (Anexo 02).

Para encontrar o percentil, seguir os seguintes passos com auxílio da tabela abaixo (Anexo 1. Tabela Pressão Arterial Sistêmica para MENINOS por Idade e Percentil de Estatura, 1-17 anos):

Idade (anos)	Percentis da PA	Pressão Arterial Sistólica (mmHg) Percentis da Estatura ou Medida da Estatura (cm)								Pressão Arterial Diastólica (mmHg) Percentis da Estatura ou Medida da Estatura (cm)							
		5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%		5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	
1	Estatura (cm)	77,2	78,3	80,2	82,4	84,6	86,7	87,9		77,2	78,3	80,2	82,4	84,6	86,7	87,9	
	P50	85	85	86	86	87	88	88		40	40	40	41	41	42	42	
	P90	98	99	99	100	100	101	101		52	52	53	53	54	54	54	
	P95	102	102	103	103	104	105	105		.54	.54	.55	.55	56	57	57	
	P95 + 12 mmHg	114	114	115	115	116	117	117		66	66	67	67	.68	.69	.69	
2	Estatura (cm)	86,1	87,4	89,6	92,1	94,7	.97,1	98,5		86,1	87,4	89,6	92,1	94,7	.97,1	98,5	
	P50	87	87	88	89	89	90	91		43	43	44	44	45	46	46	
	P90	100	100	101	102	103	.103	104		55	55	56	56	57	58	58	
	P95	104	105	105	106	107	107	108		57	58	58	59	60	61	61	
	P95 + 12 mmHg	116	117	117	118	119	119	120		69	70	70	71	72	73	73	
3	Estatura (cm)	92,5	93,9	96,3	99	101,8	.104,3	105,8		92,5	93,9	96,3	99	101,8	.104,3	105,8	
	P50	88	89	89	90	91	92	92		45	46	46	47	48	49	49	
	P90	101	102	102	.103	104	.105	.105		58	58	59	59	60	61	61	
	P95	106	106	107	107	108	109	109		60	61	61	62	63	64	64	
	P95 + 12 mmHg	118	118	119	119	120	121	121		72	73	73	74	75	76	76	

Passo 01. Localizar a idade da criança na primeira coluna.

Exemplo: Menino com 1 ano de idade, 80cm de estatura e PA 85x55mmHg.

Idade (anos)	Percentis da PA	Pressão Arterial Sistólica (mmHg) Percentis da Estatura ou Medida da Estatura (cm)								Pressão Arterial Diastólica (mmHg) Percentis da Estatura ou Medida da Estatura (cm)							
		5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%		5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	
1	Estatura (cm)	77,2	78,3	80,2	82,4	84,6	86,7	87,9		77,2	78,3	80,2	82,4	84,6	86,7	87,9	
	P50	85	85	86	86	87	88	88		40	40	40	41	41	42	42	
	P90	98	99	99	100	100	101	101		52	52	53	53	54	54	54	
	P95	102	102	103	103	104	105	105		.54	.54	.55	.55	56	57	57	
	P95 + 12 mmHg	114	114	115	115	116	117	117		66	66	67	67	.68	.69	.69	

Passo 02. Na linha “Estatura (cm)”, localizar o valor mais próximo da estatura da criança:

Idade (anos)	Percentis da PA	Pressão Arterial Sistólica (mmHg) Percentis da Estatura ou Medida da Estatura (cm)								Pressão Arterial Diastólica (mmHg) Percentis da Estatura ou Medida da Estatura (cm)							
		5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%		5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	
1	Estatura (cm)	77,2	78,3	80,2	82,4	84,6	86,7	87,9		77,2	78,3	80,2	82,4	84,6	86,7	87,9	
	P50	85	85	86	86	87	88	88		40	40	40	41	41	42	42	
	P90	98	99	99	100	100	101	101		52	52	53	53	54	54	54	
	P95	102	102	103	103	104	105	105		.54	.54	.55	.55	56	57	57	
	P95 + 12 mmHg	114	114	115	115	116	117	117		66	66	67	67	.68	.69	.69	

Passo 03. Encontrada a coluna correspondente ao percentil da estatura da criança, localizar o valor mais próximo da pressão sistólica e diastólica.

Idade (anos)	Percentis da PA	Pressão Arterial Sistólica (mmHg) Percentis da Estatura ou Medida da Estatura (cm)								Pressão Arterial Diastólica (mmHg) Percentis da Estatura ou Medida da Estatura (cm)							
		5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%		5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	
1	Estatura (cm)	77,2	78,3	80,2	82,4	84,6	86,7	87,9		77,2	78,3	80,2	82,4	84,6	86,7	87,9	
	P50	85	85	86	86	87	88	88		40	40	40	41	41	42	42	
	P90	98	99	99	100	100	101	101		52	52	53	53	54	54	54	
	P95	102	102	103	103	104	105	105		.54	.54	.55	.55	56	57	57	
	P95 + 12 mmHg	114	114	115	115	116	117	117		66	66	67	67	.68	.69	.69	

Observação: Neste caso, os valores estão no percentil P50 e P95, sempre considera-se o maior percentil, que no exemplo dado é 95.



Quadro 03. Classificação da PA encontrados para idade, sexo e estatura (percentil) em crianças e adolescentes

CRIANÇAS DE 1 A 13 ANOS DE IDADE	CRIANÇAS COM IDADE ≥ 13 ANOS
Normotensão: PA < P90	Normotensão: PA < 120/80 mmHg
Pressão arterial elevada: PA ≥ P90 e < P95	Pressão arterial elevada: PA 120/80 mmHg a PA 129/80 mmHg
Hipertensão estágio 1: PA ≥ P95 e + 12 mmHg ou PA entre 130/80 até 139/89 (o que for menor)	Hipertensão estágio 1: PA 130/80 ou até 139/89 mmHg
Hipertensão estágio 2: PA ≥ P95 + 12 mmHg ou PA ≥ entre 140/90 (o que for menor)	Hipertensão estágio 2: PA ≥ 140/90 mmHg

Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria, 2019

Observação: Se percentil ≥ P90 e ≥ P95 encaminhar para avaliação médica (médico ESF ou pediatra)

10. REGISTRO DA AFERIÇÃO DA PA EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO

A aferição da pressão arterial deve ser registrada em prontuário eletrônico do usuário, em campo específico.

Passo 01. No prontuário do usuário, acessar o campo “Pré-Consulta/Aferições”, em destaque na imagem abaixo:

Atendimento Data: 17/09/2024 Hora 07:53
 Profissional: Enfermeira(o)
 Paciente: 11 - Ôlostech Olotech
 Nascimento: 01/08/1989 - 35 ano(s) Sexo: Feminino
 Endereço: Rua Valentim
 Município: JOINVILLE - SC

Pré-Consulta/Aferições

Passo 02. Registrar, nos campos destinados, os dados de Peso, Estatura e Pressão:

Ocorrências em Saúde Resultados de exames Dados Históricos

Aferições

Peso* 35 Kg Estatura* 125 cm (IMC = 22,40 kg/m²)
 Temperatura °C Pressão 98 / 55 mmHg
 Nível de Glicemia mg/Dl Tipo de Glicemia Seleccione...
 Vacinação em Dia* Seleccione...
 Condição (Informe dados importantes p/ conhecimento do Médico.)
 Frequência Respiratória irpm Saturação de Oximetria %

Procedimentos Realizados

0301100039 - Afericao De Pressao Arterial	☒
0301100250 - Afericao De Temperatura	☐
0214010015 - Glicemia Capilar	☐
0101040075 - Medicao De Altura	☒

Passo 03. No campo “**Evolução**”, deve-se registrar:

Evolução	 
Clique para Editar	

- Posição em que foi aferida a PA da criança (sentada ou deitada);
- Estado geral que a criança estava durante a aferição (agitada, calma, etc.);
- Tempo de repouso antes da aferição;
- Tamanho do manguito utilizado para aferição;
- Membro em que a PA foi aferida.

REFERÊNCIAS

PARANÁ. Prefeitura Municipal de Londrina. **POP-16 - Aferição Da Pressão Arterial**, 2021 Disponível em: [procedimento operacional padrão- aferição da pressão arterial](#). Acesso em 16/09/2024;

RIO DE JANEIRO. **Quando verificar a pressão arterial em crianças, como fazer e avaliar os valores?** Marins, Mariana; Schuengue, Nathalia. 2022. Disponível em <https://pebmed.com.br/quando-verificar-a-pressao-arterial-em-criancas-como-fazer-e-avaliar-os-valores>. Acesso em 12/09/2024;

SÃO PAULO. Sociedade Brasileira de Pediatria. **Hipertensão arterial na infância e adolescência**, Manual de Orientação, 2019. Disponível em [Hipertensão arterial na infância e adolescência](#). Acesso em 16/09/2024;

SÃO PAULO. Sociedade de Pediatria de São Paulo, Recomendações. **Atualização de Condutas em Pediatria**. Departamento Científicos da SPSP, nº 34. Disponível em: [Medida da pressão arterial sistêmica](#). Acesso em 11/09/2024;

SÃO PAULO. **Hipertensão na infância e adolescência é comum?**, 2022. Disponível em: <https://deciomion.com.br/hipertensao-na-infancia/>, Acesso em 11/09/2024;

SÃO PAULO. Universidade de São Paulo. **Medida indireta da pressão arterial sistêmica em Pediatria**, 2019 Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/8101926/mod_resource/content/2/Medida%20de%20PA%20em%20Pediatria%202019.pdf. Acesso em 16/09/2024;

Como medir a pressão arterial em criança? Disponível em: [Como medir a pressão arterial na criança? | Nefropediatria Cascavel](#). Dra Mariana Tanaka. Acesso em 15/09/2024;

Hipertensão na infância e adolescência é comum? Dr Decio Mion, 2022. Disponível em: <https://deciomion.com.br/hipertensao-na-infancia/>, Acesso em 15/09/2024;

Kreuning EB, Graube SL, Meneghete MC, Fontana RT, Rodrigues FCP, Bittencourt VLL. **Protocolo de aferição da pressão arterial em membros inferiores**. Rev baiana enferm. 2018. Disponível em: https://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2178-86502018000100601. Acesso em 01/10/2024;

Técnicas de Medição Arterial. Alexandre, Ricardo Alexandre. 2013. Disponível em <https://pt.slideshare.net/slideshow/tcnicas-de-medio-arterial-25460766/25460766#7>. Acesso em 18/09/2024.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:
2025 NGA Fernanda Cristina Spiller	2025 NGA Natiane Kaiut Schemberger Garcia; Vivianne Samara Conzatti; Willian Waldelino Custódio da Silva.	2025 NGA Maristela Mello de Aguiar; Indianara da Silva. Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial Vanessa Cardoso Pacheco.

Disponível em:
Sistema Eletrônico de Informação (SEI): Processo nº 25.0.002158-5
Wiki da Prefeitura: https://wiki.joinville.sc.gov.br/index.php/Área:_Saúde

Anexo 01. Tabela Pressão Arterial Sistêmica para MENINOS por Idade e Percentil de Estatura, 1-17 anos

Tabela 1. Percentis de Pressão Arterial Sistêmica para Meninos por idade e Percentis de Estatura

Idade (anos)	Percentis da PA	Pressão Arterial Sistólica (mmHg) Percentis da Estatura ou Medida da Estatura (cm)							Pressão Arterial Diastólica (mmHg) Percentis da Estatura ou Medida da Estatura (cm)						
		5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%
1	Estatura (cm)	77,2	78,3	80,2	82,4	84,6	86,7	87,9	77,2	78,3	80,2	82,4	84,6	86,7	87,9
	P50	85	85	86	86	87	88	88	40	40	40	41	41	42	42
	P90	98	99	99	100	100	101	101	52	52	53	53	54	54	54
	P95	102	102	103	103	104	105	105	54	54	55	55	56	57	57
	P95 + 12 mmHg	114	114	115	115	116	117	117	66	66	67	67	68	69	69
2	Estatura (cm)	86,1	87,4	89,6	92,1	94,7	97,1	98,5	86,1	87,4	89,6	92,1	94,7	97,1	98,5
	P50	87	87	88	89	89	90	91	43	43	44	44	45	46	46
	P90	100	100	101	102	103	103	104	55	55	56	56	57	58	58
	P95	104	105	105	106	107	107	108	57	58	58	59	60	61	61
	P95 + 12 mmHg	116	117	117	118	119	119	120	69	70	70	71	72	73	73
3	Estatura (cm)	92,5	93,9	96,3	99	101,8	104,3	105,8	92,5	93,9	96,3	99	101,8	104,3	105,8
	P50	88	89	89	90	91	92	92	45	46	46	47	48	49	49
	P90	101	102	102	103	104	105	105	58	58	59	59	60	61	61
	P95	106	106	107	107	108	109	109	60	61	61	62	63	64	64
	P95 + 12 mmHg	118	118	119	119	120	121	121	72	73	73	74	75	76	76
4	Estatura (cm)	98,5	100,2	102,9	105,9	108,9	111,5	113,2	98,5	100,2	102,9	105,9	108,9	111,5	113,2
	P50	90	90	91	92	93	94	94	48	49	49	50	51	52	52
	P90	102	103	104	105	105	106	107	60	61	62	62	63	64	64
	P95	107	107	108	108	109	110	110	63	64	65	66	67	67	68
	P95 + 12 mmHg	119	119	120	120	121	122	122	75	76	77	78	79	79	80
5	Estatura (cm)	104,4	106,2	109,1	112,4	115,7	118,6	120,3	104,4	106,2	109,1	112,4	115,7	118,6	120,3
	P50	91	92	93	94	95	96	96	51	51	52	53	54	55	55
	P90	103	104	105	106	107	108	108	63	64	65	65	66	67	67
	P95	107	108	109	109	110	111	112	66	67	68	69	70	70	71
	P95 + 12 mmHg	119	120	121	121	122	123	124	78	79	80	81	82	82	83
6	Estatura (cm)	110,3	112,2	115,3	118,9	122,4	125,6	127,5	110,3	112,2	115,3	118,9	122,4	125,6	127,5
	P50	93	93	94	95	96	97	98	54	54	55	56	57	57	58
	P90	105	105	106	107	109	110	110	66	66	67	68	68	69	69
	P95	108	109	110	111	112	113	114	69	70	70	71	72	72	73
	P95 + 12 mmHg	120	121	122	123	124	125	126	81	82	82	83	84	84	85
7	Estatura (cm)	116,1	118	121,4	125,1	128,9	132,4	134,5	116,1	118	121,4	125,1	128,9	132,4	134,5
	P50	94	94	95	97	98	98	99	56	56	57	58	58	59	59
	P90	106	107	108	109	110	111	111	68	68	69	70	70	71	71
	P95	110	110	111	112	114	115	116	71	71	72	73	73	74	74
	P95 + 12 mmHg	122	122	123	124	126	127	128	83	83	84	85	85	86	86
8	Estatura (cm)	121,4	123,5	127	131	135,1	138,8	141	121,4	123,5	127	131	135,1	138,8	141
	P50	95	96	97	98	99	99	100	57	57	58	59	59	60	60
	P90	107	108	109	110	111	112	112	69	70	70	71	72	72	73
	P95	111	112	112	114	115	116	117	72	73	73	74	75	75	75
	P95 + 12 mmHg	123	124	124	126	127	128	129	84	85	85	86	87	87	87
9	Estatura (cm)	126	128,3	132,1	136,3	140,7	144,7	147,1	126	128,3	132,1	136,3	140,7	144,7	147,1
	P50	96	97	98	99	100	101	101	57	58	59	60	61	62	62
	P90	107	108	109	110	112	113	114	70	71	72	73	74	74	74
	P95	112	112	113	115	116	118	119	74	74	75	76	76	77	77
	P95 + 12 mmHg	124	124	125	127	128	130	131	86	86	87	88	88	89	89

continua...



... continuação

Idade (anos)	Percentis da PA	Pressão Arterial Sistólica (mmHg) Percentis da Estatura ou Medida da Estatura (cm)							Pressão Arterial Diastólica (mmHg) Percentis da Estatura ou Medida da Estatura (cm)						
		5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%
10	Estatura (cm)	130,2	132,7	136,7	141,3	145,9	150,1	152,7	130,2	132,7	136,7	141,3	145,9	150,1	152,7
	P50	97	98	99	100	101	102	103	59	60	61	62	63	63	64
	P90	108	109	111	112	113	115	116	72	73	74	74	75	75	76
	P95	112	113	114	116	118	120	121	76	76	77	77	78	78	78
	P95 + 12 mmHg	124	125	126	128	130	132	133	88	88	89	89	90	90	90
11	Estatura (cm)	134,7	137,3	141,5	146,4	151,3	155,8	158,6	134,7	137,3	141,5	146,4	151,3	155,8	158,6
	P50	99	99	101	102	103	104	106	61	61	62	63	63	63	63
	P90	110	111	112	114	116	117	118	74	74	75	75	75	76	76
	P95	114	114	116	118	120	123	124	77	78	78	78	78	78	78
	P95 + 12 mmHg	126	126	128	130	132	135	136	89	90	90	90	90	90	90
12	Estatura (cm)	140,3	143	147,5	152,7	157,9	162,6	165,5	140,3	143	147,5	152,7	157,9	162,6	165,5
	P50	101	101	102	104	106	108	109	61	62	62	62	62	63	63
	P90	113	114	115	117	119	121	122	75	75	75	75	75	76	76
	P95	116	117	118	121	124	126	128	78	78	78	78	78	79	79
	P95 + 12 mmHg	128	129	130	133	136	138	140	90	90	90	90	90	91	91
13	Estatura (cm)	147	150	154,9	160,3	165,7	170,5	173,4	147	150	154,9	160,3	165,7	170,5	173,4
	P50	103	104	105	108	110	111	112	61	60	61	62	63	64	65
	P90	115	116	118	121	124	126	126	74	74	74	75	76	77	77
	P95	119	120	122	125	128	130	131	78	78	78	78	80	81	81
	P95 + 12 mmHg	131	132	134	137	140	142	143	90	90	90	90	92	93	93
14	Estatura (cm)	153,8	156,9	162	167,5	172,7	177,4	180,1	153,8	156,9	162	167,5	172,7	177,4	180,1
	P50	105	106	109	111	112	113	113	60	60	62	64	65	66	67
	P90	119	120	123	126	127	128	129	74	74	75	77	78	79	80
	P95	123	125	127	130	132	133	134	77	78	79	81	82	83	84
	P95 + 12 mmHg	135	137	139	142	144	145	146	89	90	91	93	94	95	96
15	Estatura (cm)	159	162	166,9	172,2	177,2	181,6	184,2	159	162	166,9	172,2	177,2	181,6	184,2
	P50	108	110	112	113	114	114	114	61	62	64	65	66	67	68
	P90	123	124	126	128	129	130	130	75	76	78	79	80	81	81
	P95	127	129	131	132	134	135	135	78	79	81	83	84	85	85
	P95 + 12 mmHg	139	141	143	144	146	147	147	90	91	93	95	96	97	97
16	Estatura (cm)	162,1	165	169,6	174,6	179,5	183,8	186,4	162,1	165	169,6	174,6	179,5	183,8	186,4
	P50	111	112	114	115	115	116	116	63	64	66	67	68	69	69
	P90	126	127	128	129	131	131	132	77	78	79	80	81	82	82
	P95	130	131	133	134	135	136	137	80	81	83	84	85	86	86
	P95 + 12 mmHg	142	143	145	146	147	148	149	92	93	95	96	97	98	98
17	Estatura (cm)	163,8	166,5	170,9	175,8	180,7	184,9	187,5	163,8	166,5	170,9	175,8	180,7	184,9	187,5
	P50	114	115	116	117	117	118	118	65	66	67	68	69	70	70
	P90	128	129	130	131	132	133	134	78	79	80	81	82	82	83
	P95	132	133	134	135	137	138	138	81	82	84	85	86	86	87
	P95 + 12 mmHg	144	145	146	147	149	150	150	93	94	96	97	98	98	99

Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria, 2019

Anexo 02. Tabela Pressão Arterial Sistêmica para MENINAS por Idade e Percentil de Estatura, 1-17 anos

Tabela 2. Percentis de Pressão Arterial Sistêmica para Meninas por idade e Percentis de Estatura

Idade (anos)	Percentis da PA	Pressão Arterial Sistólica (mmHg) Percentis da Estatura ou Medida da Estatura (cm)							Pressão Arterial Diastólica (mmHg) Percentis da Estatura ou Medida da Estatura (cm)						
		5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%
1	Estatura (cm)	75,4	76,6	78,6	80,8	83	84,9	86,1	75,4	76,6	78,6	80,8	83	84,9	86,1
	P50	84	85	86	86	87	88	88	41	42	42	43	44	45	46
	P90	98	99	99	100	101	102	102	54	55	56	56	57	58	58
	P95	101	102	102	103	104	105	105	59	59	60	60	61	62	62
	P95 + 12 mmHg	113	114	114	115	116	117	117	71	71	72	72	73	74	74
2	Estatura (cm)	84,9	86,3	88,6	91,1	93,7	96	97,4	84,9	86,3	88,6	91,1	93,7	96	97,4
	P50	87	87	88	89	90	91	91	45	46	47	48	49	50	51
	P90	101	101	102	103	104	105	106	58	58	59	60	61	62	62
	P95	104	105	106	106	107	108	109	62	63	63	64	65	66	66
	P95 + 12 mmHg	116	117	118	118	119	120	121	74	75	75	76	77	78	78
3	Estatura (cm)	91	92,4	94,9	97,6	100,5	103,1	104,6	91	92,4	94,9	97,6	100,5	103,1	104,6
	P50	88	89	89	90	91	92	93	48	48	49	50	51	53	53
	P90	102	103	104	104	105	106	107	60	61	61	62	63	64	65
	P95	106	106	107	108	109	110	110	64	65	65	66	67	68	69
	P95 + 12 mmHg	118	118	119	120	121	122	122	76	77	77	78	79	80	81
4	Estatura (cm)	97,2	98,8	101,4	104,5	107,6	110,5	112,2	97,2	98,8	101,4	104,5	107,6	110,5	112,2
	P50	89	90	91	92	93	94	94	50	51	51	53	54	55	55
	P90	103	104	105	106	107	108	108	62	63	64	65	66	67	67
	P95	107	108	109	109	110	111	112	66	67	68	69	70	70	71
	P95 + 12 mmHg	119	120	121	121	122	123	124	78	79	80	81	82	82	83
5	Estatura (cm)	103,6	105,3	108,2	111,5	114,9	118,1	120	103,6	105,3	108,2	111,5	114,9	118,1	120
	P50	90	91	92	93	94	95	96	52	52	53	55	56	57	57
	P90	104	105	106	107	108	109	110	64	65	66	67	68	69	70
	P95	108	109	109	110	111	112	113	68	69	70	71	72	73	73
	P95 + 12 mmHg	120	121	121	122	123	124	125	80	81	82	83	84	85	85
6	Estatura (cm)	110	111,8	114,9	118,4	122,1	125,6	127,7	110	111,8	114,9	118,4	122,1	125,6	127,7
	P50	92	92	93	94	96	97	97	54	54	55	56	57	58	59
	P90	105	106	107	108	109	110	111	67	67	68	69	70	71	71
	P95	109	109	110	111	112	113	114	70	71	72	72	73	74	74
	P95 + 12 mmHg	121	121	122	123	124	125	126	82	83	84	84	85	86	86
7	Estatura (cm)	115,9	117,8	121,1	124,9	128,8	132,5	134,7	115,9	117,8	121,1	124,9	128,8	132,5	134,7
	P50	92	93	94	95	97	98	99	55	55	56	57	58	59	60
	P90	106	106	107	109	110	111	112	68	68	69	70	71	72	72
	P95	109	110	111	112	113	114	115	72	72	73	73	74	74	75
	P95 + 12 mmHg	121	122	123	124	125	126	127	84	84	85	85	86	86	87
8	Estatura (cm)	121	123	126,5	130,6	134,7	138,5	140,9	121	123	126,5	130,6	134,7	138,5	140,9
	P50	93	94	95	97	98	99	100	56	56	57	59	60	61	61
	P90	107	107	108	110	111	112	113	69	70	71	72	72	73	73
	P95	110	111	112	113	115	116	117	72	73	74	74	75	75	75
	P95 + 12 mmHg	122	123	124	125	127	128	129	84	85	86	86	87	87	87
9	Estatura (cm)	125,3	127,6	131,3	135,6	140,1	144,1	146,6	125,3	127,6	131,3	135,6	140,1	144,1	146,6
	P50	95	95	97	98	99	100	101	57	58	59	60	60	61	61
	P90	108	108	109	111	112	113	114	71	71	72	73	73	73	73
	P95	112	112	113	114	116	117	118	74	74	75	75	75	75	75
	P95 + 12 mmHg	124	124	125	126	128	129	130	86	86	87	87	87	87	87

continua...

... continuação

Idade (anos)	Percentis da PA	Pressão Arterial Sistólica (mmHg) Percentis da Estatura ou Medida da Estatura (cm)							Pressão Arterial Diastólica (mmHg) Percentis da Estatura ou Medida da Estatura (cm)						
		5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%
10	Estatura (cm)	129,7	132,2	136,3	141	145,8	150,2	152,8	129,7	132,2	136,3	141	145,8	150,2	152,8
	P50	96	97	98	99	101	102	103	58	59	59	60	61	61	61
	P90	109	110	111	112	113	115	116	72	73	73	73	73	73	73
	P95	113	114	114	116	117	119	120	75	75	76	76	76	76	76
	P95 + 12 mmHg	125	126	126	128	129	131	132	87	87	88	88	88	88	88
11	Estatura (cm)	135,6	138,3	142,8	147,8	152,8	157,3	160	135,6	138,3	142,8	147,8	152,8	157,3	160
	P50	98	99	101	102	104	105	106	60	60	60	61	62	63	64
	P90	111	112	113	114	116	118	120	74	74	74	74	74	75	75
	P95	115	116	117	118	120	123	124	76	77	77	77	77	77	77
	P95 + 12 mmHg	127	128	129	130	132	135	136	88	89	89	89	89	89	89
12	Estatura (cm)	142,8	145,5	149,9	154,8	159,6	163,8	166,4	142,8	145,5	149,9	154,8	159,6	163,8	166,4
	P50	102	102	104	105	107	108	108	61	61	61	62	64	65	65
	P90	114	115	116	118	120	122	122	75	75	75	75	76	76	76
	P95	118	119	120	122	124	125	126	78	78	78	78	79	79	79
	P95 + 12 mmHg	130	131	132	134	136	137	138	90	90	90	90	91	91	91
13	Estatura (cm)	148,1	150,6	154,7	159,2	163,7	167,8	170,2	148,1	150,6	154,7	159,2	163,7	167,8	170,2
	P50	104	105	106	107	108	108	109	62	62	63	64	65	65	65
	P90	116	117	119	121	122	123	123	75	75	75	76	76	76	76
	P95	121	122	123	124	126	126	127	79	79	79	79	80	80	81
	P95 + 12 mmHg	133	134	135	136	138	138	139	91	91	91	91	92	92	93
14	Estatura (cm)	150,6	153	156,9	161,3	165,7	169,7	172,1	150,6	153	156,9	161,3	165,7	169,7	172,1
	P50	105	106	107	108	109	109	109	63	63	64	65	66	66	66
	P90	118	118	120	122	123	123	123	76	76	76	76	77	77	77
	P95	123	123	124	125	126	127	127	80	80	80	80	81	81	82
	P95 + 12 mmHg	135	135	136	137	138	139	139	92	92	92	92	93	93	94
15	Estatura (cm)	151,7	154	157,9	162,3	166,7	170,6	173	151,7	154	157,9	162,3	166,7	170,6	173
	P50	105	106	107	108	109	109	109	64	64	64	65	66	67	67
	P90	118	119	121	122	123	123	124	76	76	76	77	77	78	78
	P95	124	124	125	126	127	127	128	80	80	80	81	82	82	82
	P95 + 12 mmHg	136	136	137	138	139	139	140	92	92	92	93	94	94	94
16	Estatura (cm)	152,1	154,5	158,4	162,8	167,1	171,1	173,4	152,1	154,5	158,4	162,8	167,1	171,1	173,4
	P50	106	107	108	109	109	110	110	64	64	65	66	66	67	67
	P90	119	120	122	123	124	124	124	76	76	76	77	78	78	78
	P95	124	125	125	127	127	128	128	80	80	80	81	82	82	82
	P95 + 12 mmHg	136	137	137	139	139	140	140	92	92	92	93	94	94	94
17	Estatura (cm)	152,4	154,7	158,7	163	167,4	171,3	173,7	152,4	154,7	158,7	163	167,4	171,3	173,7
	P50	107	108	109	110	110	110	111	64	64	65	66	66	66	67
	P90	120	121	123	124	124	125	125	76	76	77	77	78	78	78
	P95	125	125	126	127	128	128	128	80	80	80	81	82	82	82
	P95 + 12 mmHg	137	137	138	139	140	140	140	92	92	92	93	94	94	94

Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria, 2019

