

 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO					Nº 22
Data de Emissão 19/11/2019	Data de Aprovação 20/11/2019	Data da Vigência 19/11/2021	Próxima Revisão 19/11/2021	Versão nº 01	Pagina 01 de 02
Nome do procedimento: Vacinação Extramuro					
Área: Diretoria de Atenção Primária à Saúde			Sector: Sala de vacina		
Executantes: - Responsabilidade: Sala de vacinas: equipe de enfermagem. - Execução: Sala de vacinas: profissional da equipe de enfermagem escalado. - Supervisão: Sala de vacinas: enfermeiro supervisor.					
Objetivo: Orientar os servidores envolvidos na atividade de vacinação extramuro.					
Recursos necessários: - Caixas térmicas ambientalizadas e com termômetro com cabo extensor, contendo as vacinas. Uma para acondicionar os frascos de vacina abertos e em uso, e outra para o estoque; - Notebooks para registro dos vacinados no Sistema Integrado de Gestão (SIG – SAUDETTECH), ligados a cabos de internet. Não havendo condições para este registro direto no Sistema, podem ser usados cadernos de registros dos vacinados (<u>casos de bloqueio vacinal</u>); - Ar-condicionado; - Acesso fácil à pia, provida de sabonete líquido e papel toalha.					
Definição: Define-se a vacinação extramuro os casos de bloqueios vacinais em empresas, escolas, universidades ou outras instituições, e no caso de vacinação em salas de uso eventual – VACINAÇÃO DE ROTINA, OU BLOQUEIO DE EVENTUAIS CASOS (shoppings, feiras, etc), aquela realizada fora de uma Sala de Vacina credenciada.					
Descrição do Procedimento Etapa 1: Pré-execução - Definir e escalar a equipe que será necessária para operacionalização da ação, em quantitativo suficiente de profissionais: enfermeiro, técnicos de enfermagem, se necessário: agentes administrativos ou agentes comunitários treinados para a ação. Em ações de bloqueio em grande público, os cursos técnicos e superiores de enfermagem podem realizar as vacinas, com supervisão da equipe responsável pelo bloqueio; - Para realização de bloqueio vacinal, aguardar a orientação da Imunização, que assim que recebe Notificação de caso provável, faz contato com as Gerências de Distrito para organização da ação. - Realizar contato com o local onde ocorrerá a vacinação extramuro para verificar o local onde será a ação e combinar trâmites, como data da ação e envio do Termo de Autorização dos pais em casos de menores de 18 anos, e definição do espaço para vacinação; - No caso de ação para grande público, solicitar a limpeza terminal (teto, chão, paredes, luminárias, etc) com hipoclorito de sódio conforme orientações da "Desinfecção Terminal do Manual de Biossegurança"; - Levar as caixas térmicas com as vacinas e demais materiais (insumos, caixa de material perfurocortante, notebooks ou livros) antes de começar a vacinação. Etapa 2: Execução - Organizar os materiais de forma que fique adequadamente disponível no espaço destinado para vacinação;					

- Onde há rede de internet (cabeada), ligar computadores e testar o Sistema;
- Proceder ao atendimento do usuário, realizando avaliação da caderneta de vacinação ou do histórico vacinal no sistema para então **verificar se o mesmo precisa ser vacinado ou não**;
- Realizar triagem das condições que contraindicam ou adiam a vacinação conforme sua especificidade, por exemplo: gestação, doenças ou tratamentos que imunodeprimem o usuário, alergia a componentes da vacina, vigência de febre;
- Registrar a vacina corretamente (Sistema ou cadernos de registros dos vacinados);
- Lavar as mãos ou utilizar álcool a 70% (no máximo a cada 5 usuários atendidos usando álcool, deve-se lavar as mãos);
- Realizar a dose da vacina (se o usuário ainda não tiver as doses necessárias) da forma preconizada (após reconstituição da vacina monodose, o uso é imediato. Multidose: de acordo com fabricante);
- Descartar os resíduos corretamente, podendo agulha, seringa e algodão serem descartados nas caixas coletoras de perfurocortantes;
- Orientar possíveis eventos e condutas;
- Observar as condições de temperatura da vacina que está sendo utilizada durante todo o atendimento e tomar providências, se necessário.

Etapa 3: Pós-Execução

- Recolher materiais e equipamentos e organizar o ambiente;
- Dar baixa no SIG – SAUDETECH, dos frascos utilizados (“Movimento”);
- Devolver os frascos de vacinas para a rede de frio de origem (Unidade de Saúde ou Centro de Vigilância em Saúde – Imunização);
- No caso de bloqueio onde o registro foi em cadernos de registros dos vacinados, transcrever o registro de vacinados no SIG – SAUDETECH assim que possível (com data retroativa à data da vacinação).

Referências:

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. **Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação**. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.
2. ESTADO DE SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Saúde. Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE). **Portaria nº 556, de 14 de julho de 2016**. Diário Oficial – SC – nº 20.341 de 18.07.2016. Florianópolis – SC: 2016.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:
Sandrine Teuber Enfermeira Imunização	Renata Andrade Teixeira Heil Coordenação Técnica de Enfermagem	Mario José Brückheimer Diretor Atenção Primária à Saúde

Acesso	Disponível no caminho
Sistema de Informação vigente, INTRANET	Pub.documentos / Documentos / Imunização / Rotina-Orientações e Lembretes / POP nº 22 – Vacinação Extramuro
Sistema Eletrônico de Informação (SEI)	Processo SEI 19.0.174627-2

Alterações pós Revisão

Nº	Data	Responsável	Alteração