

TERMO DE ESCLARECIMENTO E RESPONSABILIDADE DAPAGLIFLOZINA, GLIBENCLAMIDA, GLICLAZIDA, INSULINA HUMANA NPH, INSULINA HUMANA REGULAR, INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO RÁPIDA, INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO PROLONGADA E CLORIDRATO DE METFORMINA

Eu, \_\_\_\_\_  
(nome do [a] paciente), declaro ter sido informado(a) sobre benefícios, riscos, contraindicações e principais eventos adversos relacionados ao uso de **dapagliflozina, glibenclamida, gliclazida, insulina humana NPH, insulina humana regular, insulina análoga de ação rápida, insulina análoga de ação prolongada e cloridrato de metformina**, indicada para o tratamento do diabetes melito tipo 2.

Os termos médicos foram explicados e todas as dúvidas foram esclarecidas pelo médico \_\_\_\_\_ (nome do médico que prescreve).

Assim, declaro que fui claramente informado (a) de que o medicamento que passo a receber pode trazer os seguintes benefícios:

- Prevenção das complicações da doença;
- Controle da atividade da doença;
- Melhora da capacidade de realizar atividades funcionais; e
- Melhora da qualidade de vida.

Fui também claramente informado (a) a respeito das seguintes contraindicações, potenciais eventos adversos e riscos:

- Eventos adversos da **dapagliflozina**: gravidez e período de lactação; não deve ser usado em pacientes com TFG estimada persistentemente inferior a 25 mL/min/1,73 m<sup>2</sup>.
- Eventos adversos da **glibenclamida e gliclazida**: apresentam risco significativo de hipoglicemia (especialmente a glibenclamida), além de ganho de peso. São contraindicadas se houver TFG < 30 mL/min/1,73 m<sup>2</sup>, insuficiência hepática, sinais de deficiência grave de insulina, infecções graves, gestação. A glibenclamida não é recomendada para pacientes com idade igual ou superior a 60 anos.
- Eventos adversos da **insulina humana NPH, insulina humana regular, insulina análoga de ação rápida (AIAR) e de ação prolongada (AIAP)**: não há contraindicações absolutas. Atentar para hipoglicemias. Reações alérgicas são raras, usualmente cutâneas e passíveis de cuidado com dessensibilização ou troca de apresentação.
- Eventos adversos do **cloridrato de metformina**: é contraindicado se houver doença renal com TFG < 30 mL/min/1,73 m<sup>2</sup>, insuficiência cardíaca congestiva, alcoolismo, sepse ou outros quadros clínicos graves, doença hepática grave ou lactação.

Ressalta-se que o risco de ocorrência de efeitos adversos aos medicamentos aumenta com a superdosagem.

Os eventos adversos mais comuns no local da aplicação de insulinas são:

- Dor associado à administração de insulina gelada e reuso de agulhas, principalmente.

- Lipohipertrofia aumento do tecido adiposo, causado por aplicações frequentes no mesmo lugar e reuso de agulhas, orientar rodízio entre os sítios de aplicação de insulina e reduzir o número de aplicações com a mesma agulha.
- Refluxo de insulina, orientar contar até 10 antes de retirar a agulha do subcutâneo
- Sangramento e hematoma é raro;

Todos esses medicamentos são contraindicados em casos de hipersensibilidade (alergia) aos fármacos ou aos componentes da fórmula.

Estou ciente de que este medicamento somente pode ser utilizado por mim, comprometendo-me a devolvê-lo caso não queira ou não possa utilizá-lo ou se o tratamento for interrompido. Sei também que continuarei a ser atendido (a), inclusive em caso de desistência do uso do medicamento.

Autorizo o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde a fazerem uso de informações relativas ao meu tratamento, desde que assegurado o anonimato.

( ) Sim ( ) Não

Meu tratamento constará do seguinte medicamento:

- |                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| ( ) dapagliflozina      | ( ) insulina humana regular             |
| ( ) glibenclamida       | ( ) insulina análoga de ação rápida     |
| ( ) gliclazida          | ( ) insulina análoga de ação prolongada |
| ( ) insulina humana NPH | ( ) cloridrato de metformina            |

|                                                         |  |       |     |
|---------------------------------------------------------|--|-------|-----|
| Local:                                                  |  | Data: |     |
| Nome do paciente:                                       |  |       |     |
| Cartão Nacional de Saúde:                               |  |       |     |
| Nome do responsável legal:                              |  |       |     |
| Documento de identificação do responsável legal:        |  |       |     |
| _____<br>Assinatura do paciente ou do responsável legal |  |       |     |
| Médico responsável:                                     |  | CRM:  | UF: |
| _____<br>Assinatura e carimbo do médico<br>Data: _____  |  |       |     |

**Nota:** Verificar na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) vigente em qual componente da Assistência Farmacêutica se encontram os medicamentos preconizados neste Protocolo.