


DIABETE MELITO TIPO 2 (DM 2)	
Portaria SCTIE/MS nº 13 - 21/02/26	
Medicamento	DAPAGLIFLOZINA
CID 10	E11.2, E11.3, E11.4, E11.5, E11.6, E11.7, E11.8, E11.9
Apresentação	10 mg (comprimido).
Inclusão	Serão incluídos no PCDT pacientes com diagnóstico confirmado de DM 2; com ou sem complicações micro ou macrovasculares, <u>em uso de metformina ou outros hipoglicemiantes</u> que necessitem de intensificação de tratamento com dapagliflozina; Associado ao critério 1 ou 2: Ter 40 anos ou mais E apresentar uma das seguintes doenças cardiovascular estabelecidas: • Infarto agudo do miocárdio prévio; • Cirurgia de revascularização do miocárdio prévia; • Angioplastia prévia das coronárias; • Angina estável ou instável; • Acidente vascular cerebral isquêmico prévio; • Ataque isquêmico transitório prévio • Insuficiência cardíaca com fração de ejeção abaixo de 40%. Ter acima de 55 anos (homens) ou acima de 60 anos (mulheres) E alto risco de desenvolver doença cardiovascular - definido com ao menos 1 (um) dos fatores de risco cardiovascular: • Hipertensão arterial Sistêmica • Dislipidemia • Tabagismo
Anexos Obrigatórios	• Formulário Médico para DM2 e Termo (atualizado) devidamente preenchidos; • Apresentar ao menos 1 (um) dos exames laboratoriais que comprovem o diagnóstico de DM2: 1. Glicemia de jejum maior ou igual a 126 mg/dL; em duas ocasiões, com um intervalo de 3 meses 2. Glicemia aleatória com valores maior ou igual a 200 mg/dL <u>E</u> sintomas característicos de DM (poliúria, polidipsia, polifagia e perda ponderal) 3. Teste Oral de Tolerância à Glicose (TOTG) maior ou igual a 200 mg/dL; 4. Hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5% (método padronizado - NGSP); • Apresentar o exame laboratorial de creatinina sérica ou a Taxa de Filtração Glomerular (TFG) maior a 25 mL/min/1,73 m², obtida a partir da fórmula para cálculo da CKD-EPI CREATININA 2021 (disponível em: www.sbn.org.br); • Beta-HCG para mulheres < 55 anos (ou declaração médica de que a paciente está na menopausa ou foi submetida a histerectomia ou laqueadura). • Preencher o item 5 do Formulário Médico (completo e legível) <u>para pacientes que já fazem uso de SGLT2</u> (Dapagliflozina ou outros). <i>Sugere-se envio do exame comprobatório realizado na época do diagnóstico de DM2.</i>
Administração	1 comprimido de 10mg, uma vez ao dia.

Prescrição Máxima Mensal	31 comprimidos.
Monitoramento	1. Exames laboratoriais a cada 6 meses: glicemia de jejum e hemoglobina glicada (HbA1c). A cada 12 meses: colesterol total, HDL colesterol, LDL colesterol; 2. Fundoscopia (no momento do diagnóstico e anualmente); 3. Avaliação dos pés com monofilamento e pulsos podais (no momento do diagnóstico e anualmente).
Exclusão	• Pacientes com DM2 em cetoacidose diabética ou coma hiperosmolar; • Pacientes que apresentarem intolerância, hipersensibilidade ou contra indicações absolutas a dapagliflozina; • Pacientes gestantes e em período de lactação; • Pacientes que desenvolvam DM 2 na gestação; • Crianças e adolescentes. • Disfunção renal moderada a grave (TFG estimada persistentemente inferior a 25 mL/min/1,73 m²).
Validade dos Exames laboratoriais	• Glicemia de jejum, Teste Oral de Tolerância à Glicose (TOTG), Hemoglobina glicada (HbA1c), Creatinina sérica ou TFG: 6 meses. • Beta-HCG: 30 dias.
Especialidade Médica	• Endocrinologista (preferencialmente); • Médico clínico com experiência no tratamento de DM.
CID-10: E11.2 Diabetes melito não insulino-dependente - com complicações renais. E11.3 Diabetes melito não insulino-dependente - com complicações oftálmicas. E11.4 Diabetes melito não insulino-dependente - com complicações neurológicas. E11.5 Diabetes melito não insulino-dependente - com complicações circulatórias periféricas. E11.6 Diabetes melito não insulino-dependente - com outras complicações especificadas. E11.7 Diabetes melito não insulino-dependente - com complicações múltiplas. E11.8 Diabetes melito não insulino-dependente - com complicações não especificadas. E11.9 Diabetes melito não insulino-dependente - sem complicações.	


 Diretoria de Assistência
 Farmacêutica