

ESQUEMA DE VACINA CRIANÇA 0 ANOS A 16 ANOS

AO NASCER	BCG	HEPATITE B		
2 MESES	ROTAVÍRUS	PNEUMO 10	VIP	PENTA
3 MESES	MENINGO C			
4 MESES	ROTAVÍRUS	PNEUMO 10	VIP	PENTA
5 MESES	MENINGO C			
6 MESES	COVID	INFLUENZA 1º	VIP	PENTA
7 MESES	COVID	INFLUENZA 2º		
9 MESES	FEBRE AMARELA			
1 ANO	VTV SCR SARAMPO CAXUMBA RUBÉOLA	PNEUMO 10	ACWY (Ref)	
1 ANO E 3 MESES	TETRA VIRAL SARAMPO+CAXUMBA+ RUBÉOLA+VARICELA	HEPATITE A	VIP	DPT (1º REFORÇO)
4 ANOS	DPT (2º REFORÇO)	VARICELA	FEBRE AMARELA REF	VIP S/N
9 A 19 ANOS	HPV			
10 ANOS	DENGUE 1º e 2º c/ 90 dias de intervalo			
11 A 14 ANOS	ACWY (Ref)			
14 ANOS	TÉTANO (Ref)			

ESQUEMA ADULTO

dT (tétano) 3 DOSES (2 MESES DE INTERVALO)	HEPATITE B 30 dias de intervalo entre a 1ª e 2ª dose. 3ª dose -6 meses de intervalo contando da primeira dose	FEBRE AMARELA Após 5 anos 1 dose. Se realizou 1 dose antes dos 5 anos fazer um reforço.	VTV 2 DOSES (ATÉ 29 ANOS)	VTV 1 DOSE (ATÉ 59 ANOS)
---	--	--	--	---

ESQUEMA GESTANTE

***Não fazer vacinas de vírus vivo – VTV / VARICELA / FEBRE AMARELA**

Hepatite B – 3 doses Verificar se já fez durante a infância ou em outro momento.	dT 2 doses (+1 dTpa) Verificar se já fez durante a infância dTp, tetravalente ou penta.	DTpa – dose D 1 dose após 20s até 36 semanas ou 45 dias pós parto.	INFLUENZA Durante campanha ou sobra de doses.	COVID Todas as gestantes.
--	---	--	---	-------------------------------------

ESQUEMA PROFISSIONAL DA SAÚDE

dT (tétano) 3 DOSES (2 MESES DE INTERVALO)	HEPATITE B 1 mês de intervalo entre a 1ª e 2ª dose. 3ª dose -6 meses de intervalo contando da primeira dose	FEBRE AMARELA Após 5 anos 1 dose. Se realizou 1 dose antes dos 5 anos fazer um reforço.	VTV 2 DOSES (independente de idade)	VARICELA 2 DOSES (se já teve a doença não é necessário)	COVID / INFLUENZA ANUAL
---	--	--	--	--	------------------------------------