



PADRONIZAÇÃO DE VACINAS – JOINVILLE / SC – 2026

VACINA	PROTEÇÃO	IDADE / Nº DE DOSES	COMPOSIÇÃO	VOLUME E VIA	LOCAL APLICAÇÃO
BCG	Contra: Tuberculose	Ao Nascer (até 4 a11m29 d de idade)	- Bactéria Viva Atenuada	- 0,1ml ou 0,05ml (conf. fabricante) - Intradérmica	Inserção inferior Deltóide direito
HEPATITE B	Contra: Hepatite B	Esquema criança • 1ª dose (Dose D): ao nascer (esta dose só deve ser aplicada até 30 dias de vida). Esquema adulto/maiores de 7 anos sem registro: D1 – 0 dia D2 – 30 dias após 1ª d. D3 – 180 dias após 1ª d.	- Antígeno de superfície do vírus hepatite B (DNA recombinante)	SERUM - 0,5 ml até 19a11m29d - 1ml após 20 anos. LG e BUTANTAN - 0,5 ml até 15a11m29d - 1ml após 16 anos. Esquema de 4 doses: • 0, 30, 60 e 180 dias – dose dobrada cfme idade IM Profunda	1ª opção: hochstetter E 2ª opção: vasto lateral E
ROTA	Contra: Diarreia por rotavírus	D1 - 2 meses (máx.: 11m29d) D2 - 4 meses (máx.: 23m29d)	Vírus atenuados cepa RIX 4414	1,5 ml Oral	Cavidade oral
PNEUMO 10 E 20 <i>Esquema de transição</i>	- Contra: pneumonia	• D1 – 2 meses - VPC20 • D2 – 4 meses - VPC10 Reforço: 12 meses até 4a11m29d de idade - VPC20	Polissacarídeos capsulares purificados (10 e 20 sorotipos)	0,5ml IM Profunda	1ª opção: Hochstetter E. 2ª opção: Músc. vasto lateral E
PENTA VALENTE	Contra: difteria, hepatite B, coqueluche, tétano, artrite, pneumonia, epigloteite, meningite, osteomielite, sepsis	• D1 - 2 meses • D2 - 4 meses • D3 - 6 meses (até 6a11m29d)	- Bactérias mortas e produtos de bactérias (toxinas). - Polissacarídeo PRP conjugado a uma proteína. - Antígeno de superfície do vírus hepatite B (DNA recombinante).	0,5ml IM Profunda	1ª opção: Hochstetter D. 2ª opção: Músc. vasto lateral D
VIP Vírus Inativado	Contra: Paralisia Infantil	• D1 - 2 meses • D2 - 4 meses • D3 - 6 meses • 1º reforço – 15 meses	Vírus Inativado tipos I, II e III	0,5ml IM Profunda	1ª opção: Hochstetter E. 2ª opção: Músc. vasto lateral E

		ou 6 meses após a 3ª dose da VIP 2º reforço – 4 anos até 4a11m29d			
MENINGO C	Contra: Meningococo <i>Neisseria meningitidis</i> do sorogrupo C	- D1 – 3 meses - D2 – 5 meses	Oligossacarídeo meningocócico conjugado com a proteína CRM 197	0,5 ml IM Profunda	1ª opção Hochstetter D. 2ª opção: vasto lateral D.
MENINGO ACWY	Contra: Meningococo <i>N. meningitidis</i> dos sorogrupos A, C, W e Y	Reforço: 12 meses até 4a11m29d. Dose D ou Reforço p/ adolescentes de 11 a 14a11m29d	Oligossacarídeo meningocócico A, C, W-135 e Y, conjugados com a proteína CRM 197	0,5 ml IM Profunda	Hochstetter
VTV	Contra: Sarampo, Rubéola e Caxumba	- D1: 12 meses - D2: 15 meses (somente na falta da tetraviral). - 2 doses até 29a11m29d, mínimo 30 dias de intervalo - DU: de 30 a 59a11m29d de idade (registrar como D1). - Trabalhadores da saúde: 2 doses da vacina independentemente da idade.	Vírus vivo atenuado	0,5 ml Subcutânea	Face posterior do braço Esquerdo
COVID-19	Contra: Covid-19	PFIZER BABY - D1: 6 meses - D2: 7 meses - D3: 9 meses (4 anos, 11 meses e 29 dias) Acima de 5 anos a vacinação é opcional, exceção grupos prioritários.	RNA mensageiro (mRNA) de cadeia simples, codificando a proteína S (spike) do coronavírus	PFIZER BABY 0,3 ml IM Profunda OBS: para maiores informações sobre dosagem, consultar ESQUEMA DE VACINAÇÃO COVID-19 - DIVE/SC	1ª opção: Hochstetter E. 2ª opção: Músc. vasto lateral E
FEBRE AMARELA	Contra vírus da febre amarela	D1: 9 meses REF: 4 anos. Realizar 2ª dose em indivíduos que	Vírus vivo atenuado	0,5 ml Subcutânea	Face posterior do braço D

		receberam a 1ª antes dos 5 anos de idade Acima de 5 anos nunca vacinados: Dose Única.			
OBS: A Febre Amarela deve ser administrada com intervalo mínimo de 30 dias com as vacinas VTV e TETRAVIRAL em cças menores de 2 anos.					
TETRA VIRAL	Contra: - Sarampo, Rubéola - Caxumba, Varicela	DU – 15 meses até 4a11m29d (temporariamente na falta da varicela até 6a11m29d)	Vírus vivo atenuado	0,5 ml Subcutânea	Face posterior do braço Esquerdo
DTP	Contra: - difteria - tétano - coqueluche	1º reforço – 15 meses ou 6 meses após a 3ª dose da penta. 2º reforço – 4 a 6 Anos até 6a11m29d	Bactérias mortas e produtos de bactérias (toxinas)	0,5ml IM Profunda	Hochstetter D. Nunca glúteo posterior (bumbum)
HEPATITE A	Contra: Hepatite A	DU – 15 meses (até 4a11m29d)	Vírus inativado	0,5 ml IM Profunda	1ª opção: Hochstetter E 2ª opção: vasto lat esquerdo
VARICELA	Contra: varicela	D1 – 15 meses (na ausência da Tetraviral) D2 entre 4 e 6a11m29d Trabalhadores da saúde + ACS que não tiveram a doença (duas doses intervalo de 8 semanas)	Vírus vivo atenuado	0,5 ml Subcutânea	Face posterior do braço
dT	Contra: - difteria - tétano	Acima de 7anos , gestante, acidentados, trab. saúde e toda a população não imunizada. 3 doses. Ref. 10/10 anos.	Produtos de bactérias (toxinas)	0,5ml IM Profunda	Hochstetter D
HPV	Contra: câncer de colo uterino e verrugas genitais	- Meninas e meninos de 09 a 14a11m29d DU (temporariamente até 19a11m29d – registrar como intensificação 15 a 19 anos)	Proteínas semelhantes ao vírus HPV tipo 06,11,16 e 18 (quadrivalente)	0,5 ml IM Profunda	Hochstetter
DENGUE LabTakeda	Contra vírus da dengue	Adolescentes de 10 a 14a11m29d D1 e D2 com intervalo de 3	Vírus vivo atenuado	0,5 ml Subcutânea	Face posterior do braço

		meses entre as doses			
dTpa	Contra: - difteria, tétano - pertussis acelular	Uma dose a cada gestação, a partir da 20ª semana, 45 dias após o parto (não vacinadas durante a gestação) e profissionais de saúde com conselho profissional + ACS+ temporariamente trabalhadores da educação (atendem crianças menores de 5 anos)	Toxoide diftérico, Toxoide tetânico, Bordetella pertussis	0,5 ml IM Profunda	Hochstetter D
VSR gestante	Contra vírus sincial respiratório A e B	Uma dose a cada gestação, a partir da 28ª semana	Proteína recombinante estabilizada da subunidade F do vírus	0,5 ml IM profunda	Hochstetter E
ANTI-RÁBICA	Contra: raiva	Qualquer idade D1 – dia 0 D2 – dia 3 D3 – dia 7 D4 – dia 14 Esquema pós-exposição	Cultivo celular em células vero infectadas com amostras de vírus inativadas pela betapropiolactona.	0,5 ou 1 ml (cfme laboratório produtor) IM Profunda	Hochstetter
INFLUENZA	Contra: gripe	- 6 meses a menores de 9 anos (<u>primovacinação</u>): duas doses com intervalo de 30d. - DU para os demais.	Cepas de mixovírus influenza, inativados fracionados e purificados.	- 6m a 2a11m29d: 0,25 ml - 3 anos e mais: 0,5 ml IM Profunda	Hochstetter
PNEUMO 20	- Contra pneumonia e outras complicações.	DU : a partir de 85 anos de idade	Polissacarídeos capsulares purificados (20 sorotipos)	0,5 ml IM Profunda	Hochstetter

Obs. Ministrar todas as vacinas em atraso no mesmo dia, usando membros ou sítios diferentes.

Setembro/2026