

Diretoria de Assistência à Saúde
Diretoria de Políticas de Saúde
Gerência de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal
Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial

Nota Técnica Conjunta nº 04/2025 – SES.DAS/DPS

Assunto: Prescrição do exame de Glicemia pós-prandial para usuários pós cirurgia bariátrica e alteração do pedido nos casos de solicitação do Teste de Tolerância Oral à Glicose (TTOG)

Considerando a necessidade de realização de jejum para coletas laboratoriais específicas;

Considerando que, usuários pós bariátrica apresentam de forma recorrente sintomatologia relacionadas à ingestão da glicose utilizada no TTOG, e ainda comumente apresentam síndrome de *Dumping*;

Considerando a necessidade de padronização nas solicitações de exames diagnósticos para Diabetes *Mellitus* (DM) nesses usuários;

Considerando que, a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (ABESO) contraindica a administração de glicose para o diagnóstico de DM, por ser prejudicial, associado a morbidade e sintomatologia de *Dumping*;

A Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial e a Gerência de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, em parceria com o corpo médico de endocrinologia do Município de Joinville vem, por meio desta Nota Técnica, orientar, padronizar e validar as orientações a serem seguidas por todos os prescritores de exames para diagnóstico de DM no usuário pós cirurgia bariátrica.

DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS EM USUÁRIOS PÓS BARIÁTRICA

- Solicitar 02 (duas) medidas de glicemia de jejum em dias diferentes. Resultados acima de 126 mg/dL nas 02 (duas) aferições devem ser considerados DM 2;

- Solicitar hemoglobina glicada A1c, quando houver a suspeita diagnóstica de DM 2, e para confirmação nos casos de 02 (duas) aferições em jejum alteradas;
- Solicitar glicemia pós-prandial, 120 minutos após consumo da alimentação regular, para os casos em que houver glicemia alterada em 01 (uma) aferição apenas, ou ainda para análise de pico glicêmico para usuários com diagnóstico já estabelecido;
- Para usuários já diagnosticados com DM 1 ou 2, a hemoglobina glicada deve ser solicitada, conforme padrão estipulado pelo Ministério da Saúde, a cada 06 (seis) meses, conforme protocolos de acompanhamento de doença metabólica e DM na Atenção Primária.

Importante: Na ocasião de solicitação de TTOG para os usuários supracitados, a equipe do Laboratório Municipal de Joinville (LMJ) e postos de coleta deverão realizar a alteração na solicitação para todos os casos, mantendo como padrão o exame de glicemia pós-prandial.



REFERÊNCIAS

BRASIL. Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (ABESO). **Diretrizes Brasileiras de Obesidade/2016. 4ª Edição.** São Paulo - SP: 2016;

BRASIL. Sociedade Brasileira de Diabetes. **Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020. 2021. p. 272.** Disponível em: <https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2021/08/Diretrizes-Sociedade-Brasileira-de-Diabetes-2019-20201.pdf>. Acesso em: 4 dez. 2024.

