

**DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE**  
**DIRETORIA DE POLÍTICAS EM SAÚDE**  
**Gerência de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal**  
**Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial**

**Nota Orientativa Conjunta nº 14/2025 – SES.DAS/DPS**

**Assunto:** Administração de Sais de ferro injetável.

Considerando o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - Anemia por deficiência de ferro, do Ministério da Saúde, aprovado pela Portaria SAS/MS nº 1.247, de 10 de novembro de 2014;

Considerando que o Sacarato de hidróxido férrico (100mg de ferro injetável, frasco-ampola de 5 mL), é um medicamento endovenoso que age como antianêmico em casos de deficiência de ferro.

A Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial, juntamente com a Gerência de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal, vem por meio desta Nota Orientativa Conjunta, atualizar, orientar e padronizar a infusão endovenosa de sais de ferro.

## **DESCRIÇÃO**

A administração de sais de ferro por via endovenosa pode causar reações alérgicas ou anafiláticas, podendo levar ao choque, e ainda óbito em casos raros, e portanto, indica-se que a administração de sais de ferro seja restrita a unidades de saúde com equipe de saúde, equipamento de ressuscitação cardiopulmonar e disponibilidade de atendimento de urgência e manejo de sintomas agudos como hipertensão, hipertermia, náusea, vômitos, hipotensão, broncoespasmo e reações cutâneas.

## **DA ADMINISTRAÇÃO**

A administração endovenosa deve ser realizada exclusivamente nas unidades de pronto atendimento, conforme **Nota Orientativa conjunta nº 11/2025 - SES.DAS.DPS Aplicação de medicamentos imunobiológicos, citotóxicos e/ou de uso restrito a unidades de saúde via Cisnordeste no Município de Joinville**, seguindo o **POP**



### **SES.UUE. nº 03 Como Realizar Atendimento na Recepção em Casos de Usuários que Necessitam Aplicar Medicação Externa na Rede de Urgência e Emergência.**

A administração deve ser realizada conforme prescrição, de 1 a 3 vezes na semana, respeitando preferencialmente a dose máxima de 300 mg de ferro por infusão e o intervalo mínimo de 48 horas entre cada aplicação.

O medicamento a base de sais de ferro deve ser exclusivamente diluído em soro fisiológico estéril, em uma diluição de 20 mL de solução de cloreto de sódio 0,9% para cada 1 mL do medicamento (20 mg de ferro), sendo administrado em **via exclusiva**, com controle de gotejamento conforme a diluição.

Salienta-se que doses acima de 300 mg devem ser administradas com o uso de bomba de infusão para melhor controle do fluxo de infusão.

| CUIDADOS NA ADMINISTRAÇÃO DE SAIS DE FERRO                                                                                                                                                                                                                |                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Concentração                                                                                                                                                                                                                                              | Intervalo mínimo de Infusão | Modo de infusão  |
| 100 mg de Sais de Ferro + 100 ml de SF 0,9%                                                                                                                                                                                                               | 15 min                      | Equipo simples   |
| 200 mg de Sais de Ferro + 200 ml de SF 0,9%                                                                                                                                                                                                               | 30 min                      | Equipo simples   |
| 300 mg de Sais de Ferro + 300 ml SF 0,9%                                                                                                                                                                                                                  | 1,5 h                       | Bomba de infusão |
| 400 mg de Sais de Ferro + 400 ml SF 0,9%                                                                                                                                                                                                                  | 2,5 h                       | Bomba de infusão |
| 500 mg de Sais de Ferro + 400 ml SF 0,9%                                                                                                                                                                                                                  | 3,5 h                       | Bomba de infusão |
| <b>Atenção:</b> Nas situações em que a prescrição não definir a diluição, o intervalo ou o modo de infusão, o profissional deverá seguir a tabela acima, e registrar em prontuário que a administração foi feita conforme a padronização deste documento. |                             |                  |

**Nota:** Usuários em uso recorrente de sais de ferro por doenças ou distúrbios crônicos no metabolismo do ferro devem atualizar a prescrição regularmente. A prescrição tem validade de 03 meses, e cabe ao paciente retornar ao médico ou serviço prescritor para reavaliação, novos exames e/ou atualização da prescrição.

Para fins de compreensão, incluem-se na descrição de sais de ferro: Sacarato Hidróxido Férrico, Sacarato óxido Férrico, Carboximaltose Férrica, Complexo de Dextrano de Ferro, Isomaltosida de Ferro, Gluconato Férrico de Sódio e Sacarose de Ferro.



## REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Programa Nacional de Suplementação de Ferro. Manual de Condutas Gerais**. Brasília, 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - Anemia por Deficiência de Ferro, do Ministério da Saúde**. Portaria SAS/MS n 1.247, de 10 de novembro de 2014. Brasília, 2014.

JOINVILLE. Secretária Municipal da Saúde. **Nota Orientativa Conjunta nº 11/2025 – SES.DAS.DPS. Aplicação de medicamentos imunobiológicos, citotóxicos e/ou de uso restrito a unidades de saúde via Cisnordeste no Município de Joinville**. Disponível no Processo SEI Nº 23.0.273074-1.

JOINVILLE. Secretaria Municipal da Saúde. **POP SES.UUE. nº 03 Como Realizar Atendimento na Recepção em Casos de Usuários que Necessitam Aplicar Medicação Externa na Rede de Urgência e Emergência**.

