

Secretaria da Saúde de Joinville
Gerência de Vigilância Sanitária

Nota Técnica SES/UVI nº 03/2020

Assunto: Orienta quanto ao uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) em atendimento a casos suspeitos do Novo Coronavírus (COVID-19)

Considerando a Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) e pandemia relacionada ao Novo Coronavírus (SARS-CoV-2);

Considerando a organização para assistência aos pacientes suspeitos, com queixas respiratórias dentro da Rede de Atenção à Saúde de Joinville;

A Secretaria da Saúde de Joinville, por meio da Unidade de Vigilância Sanitária, orienta quanto ao uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Público alvo	Orientação
<u>Pacientes com Casos Suspeitos ou Confirmados e Acompanhantes*</u> (*A permanência de acompanhantes nas Unidades segue critério determinado por cada Serviço de Saúde)	• Higiene frequente das mãos com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%; • Máscara cirúrgica.
<u>Profissionais de Saúde</u>	• Higiene frequente das mãos com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%; • Avental; • Máscara cirúrgica; • Óculos de proteção ou protetor facial; • Luvas de procedimento na assistência direta ao paciente.
<u>Profissionais de Saúde em procedimento que geram aerossóis do tipo:</u> • intubação ou aspiração traqueal; • ventilação mecânica invasiva e não invasiva; • ressuscitação cardiopulmonar; • ventilação manual antes da intubação; • coletas de amostras nasotraqueais (SWAB); e	• Higiene frequente das mãos com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%; • Avental; • Máscaras N95/PFF2; • Gorro; • Óculos de proteção ou protetor facial; • Luvas de procedimento na assistência direta ao paciente.

• procedimentos odontológicos em pacientes sintomáticos respiratórios.	
<u>Profissionais de Apoio</u> (Profissionais da higiene e limpeza)	• Higiene frequente das mãos com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%; • Avental; • Máscara cirúrgica; • Óculos de proteção ou protetor facial; • Luvas de borracha com cano longo.
<u>Demais Profissionais de Apoio</u>	• Higiene frequente das mãos com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%; • Máscara cirúrgica.

ATENÇÃO:

- Usar máscara cirúrgica é uma das medidas de prevenção para limitar a propagação de doenças respiratórias, incluindo o Novo Coronavírus (SARS-CoV-2). No entanto, apenas o uso da máscara é insuficiente para fornecer o nível seguro de proteção e outras medidas igualmente relevantes devem ser adotadas, como a higiene das mãos com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%, antes e após a utilização das máscaras. Usar máscaras quando não indicado pode gerar custos desnecessários e criar uma falsa sensação de segurança que pode levar a negligenciar outras medidas como a prática de higiene das mãos;
- ✓ Além disso, a máscara cirúrgica deve estar apropriadamente ajustada à face para garantir sua eficácia e reduzir o risco de transmissão. Todos os profissionais devem ser orientados sobre como usar, remover, descartá-las e na ação de higiene das mãos antes e após o uso. Trocar mediante sujidade e/ou umidade.
- Considerando a disponibilidade de protetor facial (*face shield*), é proibido a utilização de duas ou mais máscaras simultaneamente;
- A máscara N95 deverá ser utilizada somente durante o procedimento que produz aerossóis, podendo ser reutilizada pelo mesmo profissional, desde que cumpridos os passos obrigatórios para a retirada da máscara sem a contaminação do seu interior. Havendo a disponibilidade do protetor facial (*face shield*), recomenda-se seu uso com objetivo de minimizar a contaminação da máscara N95. É possível reutilizar a máscara N95 desde que esteja íntegra **E** seca **E** limpa; Descarte diante de dificuldades para respirar **OU** sujidade visível **OU** danificada; não tocar na face anterior da máscara, caso haja contato higienizar imediatamente as mãos com álcool gel.
- Para remover a máscara, retire-a pelos elásticos, tomando bastante cuidado para não tocar na superfície interna e acondicione em uma embalagem limpa, seca, que proporcione ventilação, exemplos: saco plástico com furos, saco ou envelope de papel, pote plástico com furos na tampa, sempre com os elásticos para fora, para não contaminar a máscara. A embalagem deve ser devidamente identificada;
- Ressaltamos que os EPIs só devem ser utilizados quando o profissional estiver prestando assistência ao paciente, conforme orientações do quadro acima.

REFERÊNCIA:

1. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Gerência de Vigilância e Monitoramento em Serviços de Saúde (GVIMS). Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde (GGTES). **Orientações para Serviços de Saúde:** Medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo Novo Coronavírus (SARV-Cov-2). Brasília – DF: 2020.